

# Kwantowa Teoria Pomiaru i Estymacji

## Seria 3

do oddania na 18.11.2016

**Zadanie 1 (3 pkt)** Rozważ model pomiaru dwóch niezależnych zmiennych losowych  $x_1, x_2$  t.ż.e:

$$x_1 \sim \mathcal{N}(\theta, \sigma^2) \quad (1)$$

$$x_2 \sim \begin{cases} \mathcal{N}(\theta, \sigma^2) & \theta \geq 0 \\ \mathcal{N}(\theta, 2\sigma^2) & \theta < 0 \end{cases} \quad (2)$$

gdzie zapis  $x \sim \mathcal{N}(\theta, \sigma^2)$  oznacza, że rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej  $x$  jest rozkładem gaussowskim o średniej  $\theta$  i wariancji  $\sigma^2$ . Przyjmując, że  $\sigma$  jest znana a estymowanym parametrem jest  $\theta$  postaraj się wykazać korzystając z nierówności Cramera-Rao, że optymalnym estymatorem w obszarze  $\theta \geq 0$  jest  $\tilde{\theta}(x_1, x_2) = \frac{1}{2}(x_1 + x_2)$ , a w obszarze  $\theta < 0$  jest  $\tilde{\theta}(x_1, x_2) = \frac{1}{3}(2x_1 + x_2)$ . Tym samym wykazesz, że nie istnieje jeden estymator gwarantujący minimalną wariancję w całym obszarze parametrów.

**Zadanie 2 (2 pkt)** Rozważ uogólnienie nierówności Cramera-Rao na przypadek estymacji funkcji od parametru  $g(\theta)$ . Wykaż, że jeśli  $p_\theta(x)$  jest rodziną rozkładów prawdopodobieństwa obserwowanych zdarzeń to dla dowolnego nieobciążonego estymatora  $\tilde{g}(x)$  zachodzi:

$$\Delta^2 \tilde{g} \geq \frac{g'(\theta)^2}{F} \quad (3)$$

gdzie  $g'(\theta) = \frac{dg(\theta)}{d\theta}$  a  $F$  jest informacją Fishera dla  $p_\theta(x)$ .

**Zadanie 3 (2 pkt)** Mówimy, że  $p_\theta(x)$  należy do rodziny wykładniczych rozkładów prawdopodobieństwa wtedy i tylko wtedy gdy:

$$p_\theta(x) = e^{a(\theta)+b(x)+c(\theta)d(x)} \quad (4)$$

Wykaż, że w tym przypadku zawsze istnieje funkcja  $g(\theta)$  dla której istnieje estymator efektywny tzn. wysycający nierówność Cramera-Rao. Podaj tę funkcję. Bardzo wiele znanych rozkładów prawdopodobieństwa należy do tej rodziny (patrz [http://en.wikipedia.org/wiki/Exponential\\_family](http://en.wikipedia.org/wiki/Exponential_family)).

**Zadanie 4 (3 pkt)** Rozważ model probabilistyczny, w którym obserwowane jest  $N$  niezależnych zmiennych losowych  $x_n$ , ( $n = 0, \dots, N - 1$ ), gdzie  $x_n \sim \mathcal{N}(an + b, \sigma^2)$  (zależność liniowa + szum gaussowski).

- Zapisz macierz Fishera odpowiadającą zagadnieniu estymacji dwu-parametrowej w której staramy się wyestymować parametry prostej  $a$  i  $b$ .
- Zapisz dolne ograniczenie wynikające z nierówności Cramera-Rao na najmniejszą możliwą niepewność estymacji  $\Delta \tilde{a}$  i  $\Delta \tilde{b}$ . Który z parametrów jest "łatwiejszy" do wyestymowania?
- Podaj estymatory wysycające tę nierówność. Sprawdź czy to te same estymatory, które wynikają z zastosowanie heurystycznej metody najmniejszych kwadratów