

Ćwiczenia z Analizy Funkcjonalnej I.
Semestr Letni, 2017,
Jan Dereziński

0.1 Przestrzenie Banacha

Zadanie 1 Jeśli $t \leq r$, $x \in \mathbb{C}^n$, to

$$\|x\|_t \leq n^{\frac{1}{t}-\frac{1}{r}} \|x\|_r.$$

Zadanie 2 Jeśli $1 \leq q \leq r \leq \infty$, $x \in l^q$, to $\|x\|_q \geq \|x\|_r$. Zatem $l^q \subset l^r$.

Rozwiązanie. Najpierw pokażemy, że $1 \leq p$, to

$$\|x\|_p \leq \|x\|_1. \tag{0.1}$$

Niech $y_i = [0, \dots, x_i, \dots, 0]$. Wtedy $x = y_1 + \dots + y_n$. Stosujemy nierówność Minkowskiego

$$\|x\|_p \leq \|y_1\|_p + \dots + \|y_n\|_p = |x_1| + \dots + |x_n| = \|x\|_1.$$

Następnie stosujemy (0.1) do $y = [x_1^q, \dots, x_n^q]$:

$$\left(\sum |x_i|^r \right)^{\frac{q}{r}} = \|y\|_{\frac{r}{q}} \leq \|y\|_1 = \sum |x_i|^q.$$

Zadanie 3 Jeśli $1 \leq q \leq r \leq \infty$, $f \in L^r[0, 1]$, to

$$\|f\|_q \leq \|f\|_r.$$

Zatem $L^q[0, 1] \supset L^r[0, 1]$.

Zadanie 4 A linear operator from \mathbb{C}^m to \mathbb{C}^n can be defined by a matrix $[a_{ij}]$.

- (1) Jeśli \mathbb{C}^m jest wyposażone w normę $\|\cdot\|_1$ a \mathbb{C}^n w normę $\|\cdot\|_\infty$, wtedy $\|A\| = \max\{|a_{ij}|\}$.
- (2) Jeśli \mathbb{C}^m jest wyposażone w normę $\|\cdot\|_\infty$ a \mathbb{C}^n w normę $\|\cdot\|_1$, wtedy $\|A\| \leq \sum_{i,j} |a_{ij}|$.
- (3) Jeśli \mathbb{C}^m jest wyposażone w normę $\|\cdot\|_1$ a \mathbb{C}^n w normę $\|\cdot\|_1$, wtedy $\|A\| = \max_j \{\sum_i |a_{ij}|\}$.
- (4) Jeśli \mathbb{C}^m jest wyposażone w normę $\|\cdot\|_\infty$ a \mathbb{C}^n w normę $\|\cdot\|_\infty$, wtedy $\|A\| = \max_i \{\sum_j |a_{ij}|\}$.

0.2 Przestrzenie Hilberta

Niech \mathcal{H} będzie przestrzenią Hilberta. Będziemy stosować notację dla iloczynu skalarnego podobną do notacji Diraca:

$$(v|w), \quad v, w \in \mathcal{H}.$$

Jedną z jej zalet jest możliwość "oderwania" $(v|, |w)$, traktując je jako operatory

$$\mathbb{C} \ni z \mapsto |w)z := wz \in \mathcal{H}, \tag{0.2}$$

$$\mathcal{H} \ni h \mapsto (v|h := (v|h) \in \mathbb{C}. \tag{0.3}$$

Na przykład

$$|w)(v|h = w(v|h).$$

Jeśli $(v|w) = 1$, jest to rzut na w wzdłuż $\text{Ker}(v)$. Jeśli $\|v\| = 1$, to $|v)(v|$ jest rzutem ortogonalnym na v . Jeśli e_1, \dots, e_n jest bazą ortonormalną, to

$$A = \sum_{i,j=1}^n A_{ij} |e_i)(e_j|.$$

Zadanie 5 W l^2 definiujemy przestrzenie

$$V := \{(x_n) \in l^2 : x_{2k} = 0, k \in \mathbb{N}\}, \quad (0.4)$$

$$Z := \{(x_n) \in l^2 : x_{2k-1} + \sqrt{k}x_{2k} = 0, k \in \mathbb{N}\}. \quad (0.5)$$

Oczywiście, W i Z są domknięte. Pokazać, że $W + Z$ nie jest domknięta.

Rozwiązanie. Rozważmy $x \in l^2$, $x_i = \frac{1}{n}$. Wtedy Załóżmy, że $x = v + z$, $v \in V$, $z \in Z$. Jedyna możliwość to

$$z_{2k} = \frac{1}{2k}, \quad z_{2k-1} = -\sqrt{k}z_{2k} = -\frac{1}{2\sqrt{k}}.$$

Ale $z \notin l^2$.

Zadanie 6 Niech A będzie operatorem samosprzężonym na \mathbb{C}^n . Pokazać, że

$$\|A\| = \max\{|\lambda| : \lambda \in \text{sp}(A)\}.$$

Rozwiązanie.

$$A = \sum_{\lambda \in \text{sp}(A)} \lambda P_\lambda.$$

$$\|Av\|^2 = \sum \lambda^2 \|P_\lambda v\|^2 \leq \max\{|\lambda| : \lambda \in \text{sp}(A)\} \sum \|P_\lambda v\|^2 \quad (0.6)$$

$$= \max\{|\lambda| : \lambda \in \text{sp}(A)\} \|v\|^2. \quad (0.7)$$

Zadanie 7 $\|B\|^2 = \|B^*B\|$.

Zadanie 8 Znaleźć normę $B = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}$.

Rozwiązanie. Mamy

$$B^*B = \begin{bmatrix} \overline{B_{11}}B_{11} + \overline{B_{21}}B_{21} & \overline{B_{11}}B_{12} + \overline{B_{21}}B_{22} \\ \overline{B_{12}}B_{11} + \overline{B_{22}}B_{21} & \overline{B_{12}}B_{12} + \overline{B_{22}}B_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{bmatrix}$$

$$\det(C - \lambda \mathbb{1}) = (C_{11} - \lambda)(C_{22} - \lambda) - C_{12}C_{21} = 0.$$

$$\|B\|^2 = \frac{C_{11} + C_{22} + \sqrt{(C_{11} - C_{22})^2 + 4C_{12}C_{21}}}{2}.$$

Zadanie 9 Rozważmy \mathbb{C}^n z bazą kanoniczną $(\delta_j : j = 0, 1, \dots, n-1)$. Zdefiniujmy operatory

$$U := \sum_{j=0}^{n-2} |\delta_{j-1}\rangle\langle\delta_j| + |\delta_{n-1}\rangle\langle\delta_0|, \quad R = |\delta_0\rangle\langle\delta_0| + \sum_{j=1}^{n-1} |\delta_{n-j}\rangle\langle\delta_j|.$$

- (i) Pokazać, że U i R są unitarne.
- (ii) Pokazać, że $UR = RU^{-1}$.
- (iii) Znaleźć bazę ortonormalną w której U jest diagonalny.
- (iv) Znaleźć bazę ortonormalną w której $U + U^*$ i R są diagonalne.

Rozwiązanie. Baza

$$e_j = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=0}^{n-1} e^{ijk2\pi/n} \delta_k$$

diagonalizuje U :

$$Ue_j = e^{ij2\pi/n} e_j, \quad U = \sum_{j=0}^{n-1} e^{ij2\pi/n} |e_j\rangle\langle e_j|,$$

Jeśli położymy

$$\mathcal{F}e_j = \delta_j,$$

czyli

$$\mathcal{F} = \sum |\delta_j\rangle\langle e_j| = \sum_{j,k=0}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n}} e^{-ijk2\pi/n} |\delta_j\rangle\langle\delta_k|,$$

to

$$\mathcal{F}U\mathcal{F}^* = \sum_{j=0}^{n-1} e^{ij2\pi/n} |\delta_j\rangle\langle\delta_j|.$$

Mamy $Re_j = e_{-j}$. Baza

$$c_j = \frac{1}{\sqrt{2}}(e_j + e_{-j}), \quad 0 \leq j \leq \left[\frac{n}{2}\right], \quad (0.8)$$

$$s_j = \frac{1}{i\sqrt{2}}(e_j - e_{-j}), \quad 0 < j < \left[\frac{n}{2}\right]. \quad (0.9)$$

diagonalizuje równocześnie $U + U^*$ i R :

$$(U + U^*)c_j = 2 \cos \frac{j2\pi}{n} c_j, \quad Rc_j = c_j \quad (0.10)$$

$$(U + U^*)s_j = 2 \cos \frac{j2\pi}{n} s_j, \quad Rs_j = -s_j. \quad (0.11)$$

Zadanie 10 Niech $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ będzie macierzą rzeczywistą o wyznaczniku 1. Pokazać, że odwzorowanie na $L^2(\mathbb{R})$ zadane przez

$$Uf(x) := \frac{1}{|cx+d|} f\left(\frac{ax+b}{cx+d}\right), \quad x \in \mathbb{R}$$

jest unitarne.

Zadanie 11 Niech A będzie operatorem odwracalnym na \mathbb{C}^n . Wtedy istnieje dokładnie jeden operator dodatni B i unitarny U takie,

$$A = UB.$$

Rozwiązanie. Mamy $A^* = BU^*$, $A^*A = B^2$. Więc $B = \sqrt{A^*A}$. B^2 jest odwracalny. Więc B też. Zatem $U = AB^{-1}$. Następnie sprawdzamy, że U jest unitarny.

Zadanie 12 Niech S^1 oznacza okrąg jednostkowy sparametryzowany kątem $\phi \in [0, 2\pi[$. Niech $S^1 \ni \phi \mapsto \psi(\phi) \in S^1$ będzie bijekcją klasy C^1 taką, że $\frac{d\phi}{d\psi}$ jest ograniczone. Zdefiniujmy operator W na funkcjach na S^1 wzorem

$$Wf(\phi) = f(\psi(\phi)).$$

- (i) Policzyc W^* .
- (ii) Znalezc operator unitarny U i operator dodatni A takie, że $W = BU$.
- (iii) Pokazać, że W jest operatorem ograniczonym na $L^2(S^1)$ i znalezc $\|W\|$.

Rozwiązanie.

$$W^*g(\psi) = \left| \frac{d\phi}{d\psi} \right| g(\phi(\psi)).$$

Zatem

$$W^*Wf(\psi) = \left| \frac{d\phi}{d\psi} \right| f(\psi), \tag{0.12}$$

$$\sqrt{W^*W}f(\psi) = \left| \frac{d\phi}{d\psi} \right|^{\frac{1}{2}} f(\psi), \tag{0.13}$$

$$Uf(\phi) = \left| \frac{d\psi}{d\phi} \right|^{\frac{1}{2}} f(\psi(\phi)). \tag{0.14}$$

Zadanie 13 Rozważmy $l^2(\mathbb{Z})$ z bazą kanoniczną $(\delta_j : j \in \mathbb{Z})$. Zdefiniujmy operatory

$$U := \sum_{j=-\infty}^{\infty} |\delta_{j+1}\rangle \langle \delta_j|, \quad R = \sum_{j=-\infty}^{\infty} |\delta_{-j}\rangle \langle \delta_j|.$$

- (i) Pokazać, że U i R są unitarne.
- (ii) Czy istnieje baza ortonormalna w której U jest diagonalny?
- (iii) Odwrotna transformata Fouriera $\mathcal{F}^* : l^2(\mathbb{Z}) \rightarrow L^2(S^1)$ diagonalizuje U :

$$\frac{1}{2\pi} \mathcal{F}^* U \mathcal{F} = B, \quad (Bf)(\phi) = e^{i\phi} f(\phi), \quad f \in L^2(S^1).$$

- (iv) Podać operator unitarny $V : l^2(\mathbb{Z}) \rightarrow L^2(0, \pi) \oplus L^2(0, \pi)$ taki, że

$$V R V^* = \begin{bmatrix} \mathbb{1} & 0 \\ 0 & -\mathbb{1} \end{bmatrix}, \quad V(U + U^*) V^* = \begin{bmatrix} C & 0 \\ 0 & C \end{bmatrix},$$

gdzie

$$(Cg)(\phi) = 2 \cos \phi g(\phi), \quad g \in L^2(0, \pi).$$

Wskazówka. Najpierw rozwiązać zadanie 14.

0.3 Szeregi Fouriera

Zadanie 14 Rozważmy $L^2[-\pi, \pi]$. Zdefiniujmy operatory

$$U(t)f(\phi) := f(\phi - t), \quad Rf(\phi) := f(-\phi).$$

- (i) Pokazać, że $U(t)$ i R są unitarne.
- (ii) Pokazać, że $U(t)U(s) = U(t+s)$ i $U(t)R = RU(-t)$.
- (iii) Znaleźć bazę ortonormalną w której $U(t)$ są diagonalne.
- (iv) Znaleźć bazę ortonormalną w której $U(t) + U(-t)$ i R są diagonalne.

Rozwiązanie. Baza

$$e_j(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{ij\phi}$$

diagonalizuje $U(t)$:

$$U(t)e_j = e^{ijt} e_j, \quad U(t) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} e^{ijt} |e_j\rangle \langle e_j|,$$

Mamy $Re_j = e_{-j}$. Baza

$$c_j = \frac{1}{\sqrt{2}} (e_j + e_{-j}), \quad j = 0, 1, \dots, \tag{0.15}$$

$$s_j = \frac{1}{i\sqrt{2}} (e_j - e_{-j}), \quad j = 0, 1, 2, \dots \tag{0.16}$$

diagonalizuje równocześnie $U(t) + U(-t)$ i R :

$$(U(t) + U(-t))c_j = 2 \cos(jt)c_j, \quad R c_j = c_j \tag{0.17}$$

$$(U(t) + U(-t))s_j = 2 \cos(jt)s_j, \quad R s_j = -s_j. \tag{0.18}$$

Niech $\{\delta_j : j \in \mathbb{Z}\}$ oznacza bazę kanoniczną w $l^2(\mathbb{Z})$. Definiujemy transformatę Fouriera $\mathcal{F} : L^2[-\pi, \pi] \rightarrow l^2(\mathbb{Z})$ jako

$$\mathcal{F} = \sqrt{2\pi} \sum_{j=-\infty}^{\infty} |\delta_j\rangle\langle e_j|,$$

czyli

$$(\mathcal{F}f)_j = \int e^{-ij\phi} f(\phi) d\phi.$$

Transformata Fouriera diagonalizuje translacje:

$$\frac{1}{2\pi} \mathcal{F}U(t)\mathcal{F}^* = \sum_{j=-\infty}^{\infty} e^{ijt} |\delta_j\rangle\langle \delta_j|.$$

Niech I będzie zbiorem. Definiujemy

$$l^2(I) := \{(f_i)_{i \in I} : \sum |f_i|^2 =: \|f\|^2 < \infty\}.$$

Jeśli \mathcal{H} jest przestrzenią Hilberta z bazą ortonormalną $\{e_i : i \in I\}$, to

$$(\mathcal{F}f)_i := (e_i|f), \quad f \in \mathcal{H}$$

definiuje operator unitarny $\mathcal{F} : \mathcal{H} \rightarrow l^2(I)$. Na przykład, transformata Fouriera

$$L^2[-\pi, \pi] \ni f \mapsto \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \hat{f} \in l^2(\mathbb{Z})$$

jest takim operatorem, gdzie

$$\hat{f}_n := \int_{-\pi}^{\pi} e^{-in\phi} f(\phi) d\phi.$$

Zadanie 15 W $L^2([-\pi, \pi])$, $e_n = e^{in\phi}$, $n \in \mathbb{Z}$, jest bazą ortogonalną i $(e_n|e_n) = 2\pi$.

Zadanie 16 Inną pokrewną bazę ortogonalną w $L^2([-\pi, \pi])$ stanowią $f_n^+ := \cos n\phi$, $f_n^- := \sin n\phi$, $n = 1, 2, \dots$, $(f_n^\pm|f_n^\pm) = \pi$, $f_0 := 1$, $(f_0|f_0) = 2\pi$. Jeśli zdefiniujemy $L^2_\pm[-\pi, \pi] := \{f \in L^2[-\pi, \pi] \mid f(\phi) = \pm f(-\phi)\}$, to f_n^+ , $n = 1, 2, \dots$ i f_0 stanowią bazę ortonormalną w $L^2_+[-\pi, \pi]$ f_n^- , $n = 1, 2, \dots$ w $L^2_-[-\pi, \pi]$.

Zadanie 17 W $L^2([0, \pi])$ mamy bazę ortogonalną $c_n := \cos n\phi$, $n = 1, 2, \dots$, $(c_n|c_n) = \frac{\pi}{2}$, $c_0 = 1$, $(c_0|c_0) = \pi$.

Zadanie 18 W $L^2([0, \pi])$ mamy bazę ortogonalną $s_n := \sin n\phi$, $n = 1, 2, \dots$, $(s_n|s_n) = \frac{\pi}{2}$.

Zauważmy, że

$$L^2_\pm[-\pi, \pi] \ni f \mapsto U_\pm f := \sqrt{2}f \Big|_{[0, \pi]} \in L^2[0, \pi]$$

jest operatorem unitarnym i

$$\begin{aligned}U_+ f_0 &= c_0, \\U_+ f_n^+ &= c_n, \\U_- f_n^- &= s_n.\end{aligned}$$

Zadanie 19 Jedne funkcje lepiej jest rozwijać w szereg kosinusów a inne w szereg sinusów:

$$\begin{aligned}1 &= c_0 \\&= \frac{1}{\pi} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{2}{2m+1} s_{2m+1}, \\ \sin \phi &= s_1 \\&= \frac{1}{\pi} \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2m-1} - \frac{1}{2m+1} \right) c_{2m}.\end{aligned}$$

Można wykorzystać

$$\sin \phi \cos(n\phi) = \frac{1}{2} \left(\sin(n+1)\phi - \sin(n-1)\phi \right).$$

Zadanie 20 $h(\phi) := (a - e^{i\phi})^{-1}$, $a > 1$. Wtedy

$$\hat{h}_n = \begin{cases} 2\pi a^{-n-1}, & n = 0, 1, \dots; \\ 0, & n = -1, -2, \dots \end{cases}$$

Zadanie 21 $h(\phi) := (e^{i\phi} - a)^{-1}$, $a < 1$. Wtedy

$$\hat{h}_n = \begin{cases} 0, & n = 0, 1, 2, \dots; \\ 2\pi a^{-n-1}, & n = -1, -2, \dots \end{cases}$$

Zadanie 22 $h(\phi) := \phi$. Wtedy

$$\hat{h}_n = \begin{cases} \frac{i2\pi(-1)^n}{n}, & n \neq 0 \\ 0, & n = 0. \end{cases}$$

Aby to otrzymać można zauważyć, że możemy napisać

$$\log(1 + e^{\pm i\phi}) = \log \left(e^{\pm \frac{i}{2}\phi} \cos \frac{\phi}{2} \right) = \pm i\phi + \log \left(\cos \frac{\phi}{2} \right). \quad (0.19)$$

(Używamy gałęzi głównej logarytmu). Dlatego,

$$h(\phi) = -i \log(1 + ae^{i\phi}) + i \log(1 + ae^{-i\phi}).$$

$$\log(1 + e^{\pm i\phi}) = \lim_{a \searrow 0} \log(1 + ae^{\pm i\phi}) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} e^{\pm in\phi}}{n}.$$

Z tego wynika (0.19).

Jeśli rozważymy częściową sumę Fouriera

$$h_{(n)}(\phi) := \sum_{|j| \leq n} \frac{\hat{h}_j e^{in\phi}}{2\pi},$$

to zaobserwujemy w otoczeniu $\phi = \pm\pi$ tzw. zjawisko Gibbsa: funkcja $h_{(n)}$ “przeźrzeliwuje” wartość funkcji h . Mamy bowiem

$$h_{(n)}(-\pi + \epsilon) = -2 \sum_{j=1}^n \frac{\sin \epsilon j}{j}.$$

W otoczeniu nieciągłości funkcji h obserwujemy “zafalowanie” funkcji $h_{(n)}$, które w miarę wzrostu n zwięza się, ale nie zmniejsza swej wysokości zachowując swoją wysokość. To zafalowanie ma w granicy ściśle określony kształt (z dokładnością do zwięzania), mamy bowiem

$$\lim_{n \rightarrow \infty} h_{(n)}\left(-\pi + \frac{y}{n}\right) = -2 \int_0^y \frac{\sin x}{x} dx =: -2F(y).$$

Funkcja F jest nieparzysta i ma maksimum dla $y = \pi$ równe

$$G' := \int_0^\pi \frac{\sin x}{x} dx \approx 1,81,$$

zwane stałą Wilbrahama-Gibbsa.

Ta własność sumy częściowej szeregu Fouriera występuje zawsze, kiedy mamy do czynienia z nieciągłą funkcją. Prowadzi ono do tego, że dla funkcji nieciągłej o skoku $a2\pi$ w sumie częściowej szeregu Fouriera będzie skok $4aG' > a2\pi$.

Zadanie 23 Pokazać, że jeśli $f^{(n)}$ istnieje, to

$$|\hat{f}_k| \leq |k|^{-n} \int_{-\pi}^{\pi} |f^{(n)}(x)| dx.$$

Rozwiązanie.

$$k^n \hat{f}_k = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) i^n \partial_x^n e^{ikx} dx \tag{0.20}$$

$$= \int_{-\pi}^{\pi} (-i)^n (\partial_x^n f(x)) e^{ikx} dx. \tag{0.21}$$

Zadanie 24 Pokazać, że jeśli dla $\epsilon > 0$,

$$|\hat{f}_k| \leq \frac{C}{(|k| + 1)^{n+1+\epsilon}},$$

to f jest n -krotnie różniczkowalne.

Rozwiązanie.

$$\partial_x^n f(x) = \frac{1}{2\pi} \sum k^n \hat{f}_k e^{ikx}.$$

Zatem

$$|\partial_x^n f(x)| \leq \frac{1}{2\pi} \sum |k^n \hat{f}_k|.$$

0.4 Falki Haara.

Zdefiniujmy

$$\psi_{k,n}(x) := \begin{cases} 2^{k/2}, & 2^{-k}n \leq x < 2^{-k}n + 2^{-k-1}, \\ -2^{k/2}, & 2^{-k}n + 2^{-k-1} \leq x < 2^{-k}(n+1), \\ 0, & x \notin [2^{-k}n, 2^{-k}(n+1)]; \end{cases}$$

$$\phi_{k,n}(x) := \begin{cases} 2^{k/2}, & 2^{-k}n \leq x < 2^{-k}(n+1), \\ 0, & x \notin [2^{-k}n, 2^{-k}(n+1)]. \end{cases}$$

Czasami nazywa się ψ_{00} “falką matką” a ϕ_{00} “falką ojcem”.

Zadanie 25 Wprowadźmy operatory unitarne translacji i skalowania

$$\begin{aligned} (U_t f)(x) &:= f(x-t), \\ (W_s f)(x) &:= s^{-\frac{1}{2}} f(s^{-1}x). \end{aligned}$$

Zauważmy, że możemy napisać

$$\psi_{k,n} = W_{2^{-k}} U_n \psi_{00}, \quad \psi_{k,n}(x) = 2^{k/2} \psi_{00}(2^k x - n).$$

Pokazać, że $\{\psi_{k,n} \mid k = 0, 1, 2, \dots, \quad n = 0, 1, \dots, 2^k - 1\}$ oraz funkcja ϕ_{00} stanowią bazę ortonormalną $L^2[0, 1]$.

Rozwiązanie. Sprawdzamy najpierw ortonormalność. Oczywiście jest, że $\text{Span}\{\phi_{kn} \mid k \geq 0\}$ jest gęste i zawiera $\{\psi_{k,n} \mid k = 0, 1, 2, \dots, \quad n = 0, 1, \dots, 2^k - 1\}$ oraz ϕ_{00} . Przeciwna inkluzja też jest łatwa.

Zadanie 26 (1) Niech $m \in \mathbb{Z}$. Wtedy

$$\mathcal{V}_m := (\text{Span}\{\psi_{k,n} : k \leq m, n = \cdot\})^{\text{cl}} = (\text{Span}\{\phi_{k,n} : k \geq m+1, n \in \mathbb{Z}\})^{\text{cl}}. \quad (0.22)$$

- (2) $\{\psi_{k,n} \mid k, n \in \mathbb{Z}\}$ stanowią bazę ortonormalną $L^2(\mathbb{R})$.
(3) $\psi_{m,n}, n \in \mathbb{Z}$ stanowią bazę ortonormalną w $\mathcal{V}_m \ominus \mathcal{V}_{m+1}$ (w dopełnieniu ortogonalnym do \mathcal{V}_{m+1} wewnątrz \mathcal{V}_m).

Rozwiązanie. (1): \subset jest oczywiste. Mamy

$$\sum_{j=0}^{\infty} 2^{-\frac{j}{2}} \psi_{-j,0} = \sqrt{2} \phi_{10}.$$

To pokazuje \supset . (2) Najpierw sprawdzamy ortonormalność ψ_{kn} . Oczywiście jest, że $\text{Span}\{\phi_{kn} \mid k, n \in \mathbb{Z}\}$ jest gęste w $L^2(\mathbb{R})$.

0.5 Operatory

Zadanie 27 Pokazać, że $\|A\| = \|A^*\|$ **Rozwiązanie.**

$$\|A\| = \sup_{\|v\| \leq 1} \|Av\| = \sup_{\|v\|, \|w\| \leq 1} |(w|Av)| = \sup_{\|v\|, \|w\| \leq 1} |(A^*w|v)| = \sup_{\|w\| \leq 1} \|A^*w\| = \|A^*\|.$$

Zadanie 28 Rozważmy $L^2(S^1)$ z bazą ortonormalną $e_n(\phi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{in\phi}$, $n \in \mathbb{Z}$. Niech $(c_n : n \in \mathbb{Z})$ będzie ciągiem ograniczonym. Zdefiniujmy operator

$$C = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n |e_n\rangle \langle e_n|.$$

- (i) Pokazać, że C jest ograniczony i ma normę $\sup\{|c_n| : n \in \mathbb{Z}\}$.
- (ii) Pokazać, że jeśli $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |c_n| < \infty$, to C posiada jądro całkowe równe

$$C(\phi, \psi) = \frac{\hat{c}(-\phi + \psi)}{2\pi},$$

$$\text{gdzie } \hat{c}(\psi) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-i\psi n} c_n.$$

Zadanie 29 Na $L^2(S^1)$ rozważyć operator P_ϵ z jądrem całkowym

$$P_\epsilon(\phi, \psi) = \frac{\sinh \epsilon}{\cosh \epsilon - \cos(\phi - \psi)}.$$

Pokazać, że $s\text{-}\lim_{\epsilon \searrow 0} P_\epsilon = \mathbb{1}$ i $\|P_\epsilon\| = 1$.

Wskazówka. Pokazać, używając bazy ortonormalnej z poprzedniego zadanie, że

$$P_\epsilon = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-\epsilon|n|} |e_n\rangle \langle e_n|.$$

Zadanie 30 Niech $f : [0, \infty[\rightarrow [0, 1]$ będzie funkcją ciągłą i malejącą, taką, że $f(0) = 1$ i $\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = 0$. Rozważmy przestrzeń Hilberta l^2 z bazą kanoniczną $(\delta_j : j \in \mathbb{N})$. Zdefiniujmy rodzinę operatorów

$$C_\epsilon := \sum_{j=1}^{\infty} f(\epsilon j) |\delta_j\rangle \langle \delta_j|.$$

- (i) Pokazać, że funkcja $[0, \infty[\ni \epsilon \mapsto C_\epsilon$ jest normowo ciągła na $]0, \infty[$ lecz normowo nieciągła w $\epsilon = 0$.
- (ii) Pokazać, że funkcja $[0, \infty[\ni \epsilon \mapsto C_\epsilon$ jest silnie ciągła.

Zadanie 31 Mówimy, że P jest rzutem, gdy $P^2 = P$.

- (i) Pokazać, że jeśli P jest rzutem niezerowym, to $\|P\| \geq 1$.
- (ii) Pokazać, że dla każdego $c \geq 1$ istnieje rzut na przestrzeni Hilberta taki, że $\|P\| = c$.
Wskazówka. Wystarczy rozważać 2-wymiarowe przestrzenie Hilberta.
- (iii) Pokazać, że jeśli P jest rzutem na przestrzeni Hilberta takim, że $\|P\| = 1$, to jest to rzut ortogonalny.

Zadanie 32 Niech $(U_n : n = 1, 2, \dots)$ będzie ciągiem operatorów unitarnych.

- (i) Pokazać, że jeśli $\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = U$, to U jest unitarny.
- (ii) Pokazać, że jeśli $s\text{-}\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = U$ i $s\text{-}\lim_{n \rightarrow \infty} U_n^* = U^*$, to U jest unitarny.
- (iii) Pokazać, że jeśli $s\text{-}\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = U$, to U jest izometrią. Podać przykład ciągu operatorów unitarnych, którego silna granica nie jest unitarna.
- (iv) Pokazać, że jeśli $w\text{-}\lim_{n \rightarrow \infty} U_n = U$, to $\|U\| \leq 1$. Podać przykład ciągu operatorów unitarnych, którego słaba granica jest zerem.

Zadanie 33 Niech $(P_n : n = 1, 2, \dots)$ będzie ciągiem rzutów. Niech $s\text{-}\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P$. Pokazać, że P jest rzutem.

Wskazówka. Można założyć, że $\sup \|P_n\| < \infty$. (Wynika to z Tw. Banacha-Steinhaus'a i silnej zbieżności ciągu (P_n)).

Zadanie 34 Niech A_n będzie ciągiem samosprzężonych operatorów ograniczonych na przestrzeni Hilberta takich, że $w\text{-}\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A$. Pokazać, że A jest samosprzężony.

Zadanie 35 Niech $(P_n : n = 1, 2, \dots)$ będzie ciągiem rzutów ortogonalnych.

- (i) Niech $s\text{-}\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = P$. Pokazać, że P jest rzutem ortogonalnym.
- (ii) Podać przykład ciągu $(P_n : n = 1, 2, \dots)$ rzutów ortogonalnych takich, że $w\text{-}\lim_{n \rightarrow \infty} P_n = \frac{1}{2} \mathbb{1}$.

Zadanie 36 Dla $f \in L^2([0, \infty[)$ definiujemy

$$(Tf)(x) := x^{-1}f(x^{-1}).$$

Czy T jest operatorem

- (i) ograniczonym,
- (ii) unitarnym,
- (iii) samosprzężonym.

Zadanie 37 Niech $\alpha \in \mathbb{C}$, $\operatorname{Re} \alpha \leq 0$. Niech $(\delta_n : n \in \mathbb{N})$ oznacza bazę kanoniczną w $l^2(\mathbb{N})$. Zdefiniujemy następujący operator na $l^2(\mathbb{N})$:

$$T := \sum_{n=1}^{\infty} e^{n\alpha} |\delta_{n+1}\rangle \langle \delta_n|.$$

- (i) Pokazać, że T jest operatorem ograniczonym i znaleźć jego normę.
- (ii) Dla jakich α operator T jest izometrią?
- (iii) Policzyc T^*T .
- (iv) Policzyc T^2 .
- (v) Dla jakich α istnieje $s - \lim_{n \rightarrow \infty} T^n$?
- (vi) Dla jakich α istnieje $\lim_{n \rightarrow \infty} T^n$?

Zadanie 38 Rozważmy $l^2(\mathbb{Z})$ z bazą kanoniczną $(\delta_n : n \in \mathbb{Z})$. Niech $\theta \in \mathbb{R}$. Zdefiniujmy wektory

$$b_n := \cos(\theta n)\delta_n + \sin(\theta n)\delta_{-n}.$$

Pokazać, że $(b_n : n \in \mathbb{Z})$ jest bazą ortnormalną.

Zadanie 39 Policzyc transformatę Fouriera funkcji

$$f(x) = e^{-\frac{3}{4}x^2} \cos x^2.$$

Zadanie 40 Niech $0 < \alpha < \pi$. Dla $f \in L^2(S^1)$ zdefiniujmy

$$(Tf)(\phi) = \int_{-\alpha}^{\alpha} f(\phi - \psi) d\psi.$$

- (i) Policzyc Te_n , gdzie $e_n(\phi) := e^{in\phi}$.
- (ii) Pokazać, że T jest operatorem ograniczonym i znaleźć jego normę.

Zadanie 41 Niech $1 < p < \infty$ i $f \in L^p(\mathbb{R}^3)$. Niech $|x|$ oznacza normę euklidesową wektora $x \in \mathbb{R}^3$. Dla jakiego m funkcja $(1 + |x|^2)^{-m} f$ należy do $L^1(\mathbb{R}^d)$?

Zadanie 42 Niech d będzie liczbą naturalną. Dla jakiego m następująca funkcja należy do $L^2(\mathbb{R}^d)$:

- (i) $|x|^{-m}$,
- (ii) $(1 + |x|)^{-m}$,
- (iii) $\prod_{i=1}^d (1 + |x_i|)^{-m}$.

Zadanie 43 Dla $t > 0$ kładziemy $g_t(x) := (2\pi t)^{-1/2} e^{-x^2/2t}$. Znaleźć $g_t * g_s$.

Wskazówka. $\hat{g}_t(\xi) = e^{-t\xi^2/2}$.

Zadanie 44 Dla $t \neq 0$ kładziemy $g_t(x) = (ix + t)^{-1}$. Znaleźć $g_t * g_s$.

Wskazówka. $\hat{g}_t(\xi) = 2\pi(\operatorname{sgn} t)\theta(\xi \operatorname{sgn} t)e^{-t\xi}$.

Zadanie 45 Pokazać, że $\operatorname{Span}\{(x + \alpha)^{-1} : \operatorname{Im} \alpha > 0\}$ nie jest podprzestrzenią gęstą w $L^2(\mathbb{R})$.

Zadanie 46 Niech $g \in L^1(\mathbb{R})$. Pokazać, że operator $Tf := f * g$ jest dobrze zdefiniowany dla $f \in L^2(\mathbb{R})$, jest ograniczony i $\|T\| \leq \|g\|_1$. Czy zawsze $\|T\| = \|g\|_1$?

Wskazówka. Zastosować transformację Fouriera.

Zadanie 47 Niech $1 \leq p \leq r \leq q \leq \infty$. Pokazać, że

$$L^p(\mathbb{R}) \cap L^q(\mathbb{R}) \subset L^r(\mathbb{R}) \subset L^p(\mathbb{R}) + L^q(\mathbb{R}).$$

Zadanie 48 Dla $m \in \mathbb{R}$, $1 \leq p \leq \infty$ definiujemy

$$L_m^p(\mathbb{R}) := \{f : \|(1 + |x|)^m f\|_p < \infty\}.$$

Pokazać, że jeśli $r \leq q$, $m > \frac{1}{r} - \frac{1}{q} + k$, to $L_k^r(\mathbb{R}) \supset L_m^q(\mathbb{R})$.

Wskazówka. Wykorzystać uogólnioną nierówność Höldera

$$\|fg\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q, \quad 1 \leq p \leq r \leq q \leq \infty, \quad \frac{1}{r} = \frac{1}{p} + \frac{1}{q}.$$

0.6 Dystrybucje

Odwzorowania z $\mathcal{D}(\mathbb{R}^d) \rightarrow \mathbb{C}$, zwane dystrybucjami, bywają zapisywane w różny sposób, np.:

$$\mathcal{D}(\mathbb{R}^d) \ni \phi \mapsto T(\phi) = \langle T|\phi \rangle = \int T(x)\phi(x)dx.$$

Spełniają one następujący warunek: dla każdego zwarteo $K \subset \mathbb{R}^d$ istnieje N i C takie, że dla $\phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d)$ spełniających $\text{supp}\phi \subset K$,

$$|\langle T|\phi \rangle| \leq C \max_{n \leq N} \sup_x |\partial_x^n \phi(x)|.$$

Przykład: jeśli $T \in L_{\text{loc}}^1(\mathbb{R}^d)$, to dystrybucją regularną związaną z F , nazywamy

$$\langle T_F|\phi \rangle = \int T(x)f(x)dx.$$

A oto delta Diraca w $a \in \mathbb{R}^d$:

$$\langle \delta_a|\phi \rangle = \int \delta(x - a)\phi(x)dx = \phi(a).$$

Zadanie 49 Pokazać, że

$$\mathcal{P} \int \frac{1}{x} \phi(x)dx := \lim_{\epsilon \searrow 0} \left(\int_{-\infty}^{-\epsilon} + \int_{\epsilon}^{\infty} \right) \frac{\phi(x)}{x} dx$$

jest dystrybucją.

Rozwiązanie. Niech $\text{supp}\phi \subset K$.

$$\begin{aligned} & \mathcal{P} \int \frac{1}{x} \phi(x)dx \\ &= \left(\int_{-\infty}^{-1} + \int_1^{\infty} \right) \frac{\phi(x)}{x} dx + \lim_{\epsilon \searrow 0} \left(\int_{-1}^{-\epsilon} + \int_{\epsilon}^1 \right) \frac{\phi(x)}{x} dx = I + II \\ & |II| \leq 2 \sup |\phi'|, \quad |I| \leq |K| \sup |\phi|. \end{aligned}$$

Zadanie 50 Pokazać, że

$$\mathcal{P} \int_0^\infty \frac{1}{x} \phi(x) dx := \lim_{\epsilon \searrow 0} \left(\int_\epsilon^\infty \frac{\phi(x)}{x} dx + \phi(0) \log \epsilon \right)$$

jest dystrybucją.

Rozwiązanie.

$$\begin{aligned} & \mathcal{P} \int_0^\infty \frac{1}{x} \phi(x) dx \\ &= \int_1^\infty \frac{\phi(x)}{x} dx + \int_0^1 \frac{\phi(x) - \phi(0)}{x} dx. \end{aligned}$$

Następnie korzystamy z tego, że funkcja

$$x \mapsto \begin{cases} \frac{\phi(x) - \phi(0)}{x}, & x \in]0, 1], \\ \phi'(0), & x = 0 \end{cases}$$

jest ciągła.

Zadanie 51 Zróżniczkować n -krotnie $\frac{1}{2}\theta(x)x^2$

Zadanie 52 Niech δ_a będzie deltą Diraca w punkcie $a \in \mathbb{R}$. Pokazać, że operator $\mathcal{S}(\mathbb{R}) \ni f \mapsto T_a f := \delta_a * f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ rozszerza się do operatora unitarnego na $L^2(\mathbb{R})$. Czy T_a dla $a \rightarrow \infty$ jest zbieżny normowo, silnie lub słabo? Ewentualnie policzyć granicę.

0.7 Zbieżność dystrybucji

Mówimy, że ciąg dystrybucji T_n jest zbieżny (w sensie dystrybucyjnym) do dystrybucji T , gdy

$$\langle T_n | \phi \rangle \rightarrow \langle T | \phi \rangle, \quad \phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^d).$$

Zadanie 53 Niech $f \in L^1(\mathbb{R})$, $\int f = 1$, $f_\epsilon(x) = \epsilon^{-1} f(x\epsilon^{-1})$. Wtedy

$$\lim_{\epsilon \searrow 0} = \delta.$$

Rozwiązanie. Niech $\delta > 0$.

$$\begin{aligned} \int f_\epsilon(x) \phi(x) dx - \phi(0) &= \int f_\epsilon(x) (\phi(x) - \phi(0)) dx \\ &= \int_{|x| < \delta} f_\epsilon(x) (\phi(x) - \phi(0)) dx + \int_{|x| > \delta} f_\epsilon(x) (\phi(x) - \phi(0)) dx = I + II; \\ |I| &\leq \sup_{|x| < \delta} |\phi(x) - \phi(0)| \int |f(x)| dx \leq \delta \sup_x |\phi'(x)| \int |f(x)| dx; \\ |II| &\leq 2 \sup |\phi(x)| \int_{|x| > \delta/\epsilon} |f(x)| dx. \end{aligned}$$

Ale $\lim_{\epsilon \searrow 0} \int_{|x| > \delta/\epsilon} |f(x)| dx = 0$. Więc

$$\left| \int f_\epsilon(x) \phi(x) dx - \phi(0) \right| \leq A\delta.$$

Ale $\delta > 0$ było dowolne.

Zadanie 54 Pokazać wzór Sochockiego.

$$\lim_{\epsilon \searrow 0} \frac{1}{x + i\epsilon} = \mathcal{P} \frac{1}{x} - i\pi\delta(x).$$

Rozwiązanie. Mamy

$$\frac{1}{x + i\epsilon} = \frac{x}{x^2 + \epsilon^2} - \frac{i\epsilon}{x^2 + \epsilon^2}.$$

Mamy

$$\int \frac{1}{\pi} \int \frac{\epsilon}{x^2 + \epsilon^2} dx = 1.$$

Więc, z poprzedniego zadania mamy

$$\lim_{\epsilon \searrow 0} \frac{i\epsilon}{x^2 + \epsilon^2} = i\pi\delta(x).$$

Podobnie pokazujemy

$$\lim_{\epsilon \searrow 0} \frac{x}{x^2 + \epsilon^2} = \mathcal{P} \frac{1}{x}.$$

0.8 Równania dystrybucyjne

Zadanie 55 Znaleźć wszystkie dystrybucje spełniające

$$k^m T = 0. \tag{0.23}$$

Rozwiązanie. T musi mieć nośnik $\{0\}$. Zatem musi mieć postać

$$\sum_{j=0}^n c_j \delta^{(j)}(k).$$

Wtedy

$$\langle k^m T | \phi \rangle = \sum_{j=m}^n c_j (-1)^j (k^m \phi(k))^{(j)} \Big|_{k=0} = \sum_{j=m}^n c_j (-1)^j j(j-1) \cdots (j-m+1) \phi^{(j-m)}(0).$$

Czyli rozwiązaniem są

$$T = \sum_{j=0}^{m-1} c_j \delta^{(j)}(k).$$

Zadanie 56 Znaleźć wszystkie dystrybucje spełniające

$$kT = 1. \quad (0.24)$$

Rozwiązanie.

$$T = \mathcal{P} \frac{1}{k} + c\delta(k).$$

Zadanie 57 Znaleźć wszystkie dystrybucje spełniające

$$(k^2 - 1)T = 1. \quad (0.25)$$

Rozwiązanie.

$$T = \mathcal{P} \frac{1}{k^2 - 1} + c_+\delta(k - 1) + c_-\delta(k + 1).$$

Zadanie 58 Znaleźć wszystkie dystrybucje spełniające

$$k^2T = 1. \quad (0.26)$$

Rozwiązanie. Zdefiniujmy dystrybucję $\mathcal{P} \frac{1}{k^2}$ wzorem

$$\mathcal{P} \int \frac{\phi(k)}{k^2} dk := \int_{|k|<1} \frac{\phi(k) - \phi(0) - k\phi'(0)}{k^2} dk + \int_{|k|>1} \frac{\phi(k)}{k^2} dk.$$

Rozwiązaniem jest

$$T = \mathcal{P} \frac{1}{k^2} + c_0\delta(k) + c_1\delta^{(1)}(k).$$

0.9 Transformata Fouriera

Zadanie 59 Niech $m > 0$. Pokazać, że

$$\int \frac{e^{-i\xi s}}{(s + im)} d s = -2\pi i \theta(\xi) e^{-m\xi}, \quad (0.27)$$

$$\int \frac{e^{-i\xi s}}{(s - im)} d s = 2\pi i \theta(-\xi) e^{-m|\xi|}, \quad (0.28)$$

$$\int \frac{e^{-i\xi s} s}{(s^2 + m^2)} d s = \pi i \operatorname{sgn}(\xi) e^{-m|\xi|}, \quad (0.29)$$

$$\int \frac{e^{-i\xi s} m}{(s^2 + m^2)} d s = \pi e^{-m|\xi|}. \quad (0.30)$$

Zadanie 60 Przechodząc do granicy z m do zera w poprzednim zadaniu, pokazać, że

$$\int \theta(\pm x)e^{-ixk} dx = \frac{\mp i}{k \mp i0}, \quad (0.31)$$

$$\int \frac{e^{-ikx}}{x \pm i0} dx = \mp 2\pi i \theta(\pm x), \quad (0.32)$$

$$\int \operatorname{sgn}(x)e^{-ixk} dx = -2i\mathcal{P}\left(\frac{1}{k}\right), \quad (0.33)$$

$$\int \mathcal{P} \frac{e^{-ikx}}{x} dx = \pi i \operatorname{sgn}(k), \quad (0.34)$$

Zadanie 61 Pokazać, że dla $\epsilon \geq 0$, $\lambda > -1$, transformata Fouriera funkcji $\theta(x)x^\lambda e^{-\epsilon x}$ jest równa $e^{-i(1+\lambda)\frac{\pi}{2}}\Gamma(\lambda+1)(\xi - i\epsilon)^{-1-\lambda}$.

Zadanie 62 Pokazać, że dla $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$

$$Tf(x) := \mathcal{P} \int \frac{f(y)}{x-y} dy$$

należy do $L^2(\mathbb{R})$ i że T rozszerza się do operatora ograniczonego na $L^2(\mathbb{R})$. Policzyć T^2 .

Wskazówka. Warto zastosować transformatę Fouriera.

Zadanie 63 Pokazać, że

$$\mathbb{1}_{[-1,1]} * \mathbb{1}_{[-1,1]} = (2 - |x|)\mathbb{1}_{[-1,1]}. \quad (0.35)$$

Wiedząc, że transformata Fouriera $\mathbb{1}_{[-1,1]}$ jest równa $\frac{2\sin(\xi)}{\xi}$, policzyć transformatę Fouriera (0.35).

Rozwiązanie. $\frac{4\sin^2(\xi)}{\xi^2}$.

0.10 Funkcje Greena

Zadanie 64 Znaleźć dystrybucje G spełniające

$$(\partial_x + 1)G(x) = \delta(x). \quad (0.36)$$

Pokazać, że

$$f := G * h$$

spełnia

$$(\partial_x + 1)f(x) = h(x). \quad (0.37)$$

Rozwiązanie. Metoda 1. Rozwiązaniem równania jednorodnego

$$(\partial_x + 1)G_0(x) = 0. \quad (0.38)$$

jest $G_0(x) := ce^{-x}$. Uznmienniając stałą c dostajemy równanie

$$\partial_x c(x) = \delta(x).$$

Stąd

$$G(x) = ce^{-x} + \theta(x)e^{-x}.$$

W szczególności, mamy funkcję Greena retardowaną $G_+(x) := \theta(x)e^{-x}$ i adwansowaną $G_- := -\theta(-x)e^{-x}$. Retardowana jest jedyną dystrybucją temperowaną spośród funkcji Greena.

Metoda 2.

$$\hat{G}(k) = \frac{1}{ik + 1}.$$

Więc

$$G(x) = \int \frac{e^{-ikx}}{ik + 1} dk = \theta e^{-x}.$$

Zadanie 65 Znaleźć dystrybucję G spełniającą

$$(\partial_x + x)G(x, y) = \delta(x - y). \quad (0.39)$$

Pokazać, że

$$f(x) := \int G(x, y)h(y)dx$$

spełnia

$$(\partial_x + x)f(x) = h(x). \quad (0.40)$$

Rozwiązanie. Rozwiązaniem równania jednorodnego

$$(\partial_x + x)G_0(x, y) = 0. \quad (0.41)$$

jest $G_0(x) := c(y)e^{-\frac{x^2}{2}}$. Uzmienniając stałą $c(y)$ dostajemy równanie

$$\partial_x c(x, y) = e^{\frac{x^2}{2}} \delta(x - y) = e^{\frac{y^2}{2}} \delta(x - y).$$

Stąd

$$G(x, y) = e^{-\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}} \theta(x - y) + g(y)e^{-\frac{x^2}{2}} e^{-x}.$$

W szczególności, mamy funkcję Greena retardowaną G_+ i adwansowaną G_- :

$$\begin{aligned} G_+(x) &:= e^{-\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}} \theta(x - y), \\ G_-(x) &:= -e^{-\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2}} \theta(y - x). \end{aligned}$$

Zadanie 66 Rozważmy \mathbb{R}^3 . Pokazać, że $G(x) := \frac{e^{-m|x|}}{4\pi|x|}$ jest rozwiązaniem równania

$$(-\Delta + m^2)G(x) = \delta(x).$$

Rozwiązanie. Metoda 1. Niech

$$G(x) = \frac{1}{(2\pi)^3} \int \hat{G}(k)e^{ikx} dk.$$

Wtedy

$$\begin{aligned}
\hat{G}(k) &= \frac{1}{(k^2 + m^2)}, \\
G(x) &= \frac{1}{(2\pi)^3} \int \frac{e^{ikx}}{(k^2 + m^2)} dk \\
&= \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^\infty |k|^2 d|k| \int_0^\pi \sin \theta d\theta \frac{e^{i|k||x| \cos \theta}}{(k^2 + m^2)} \\
&= \frac{1}{(2\pi)^2} \int_0^\infty d|k| \frac{e^{i|k||x|} - e^{-i|k||x|}}{|k||x|i(k^2 + m^2)} \\
&= \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{-\infty}^\infty ds \frac{se^{is|x|}}{|x|i(s^2 + m^2)} = \frac{e^{-m|x|}}{4\pi|x|}.
\end{aligned}$$

Metoda 2. Zastosujemy wzór Greena:

$$\int_{\Omega} (\Delta f g - f \Delta g) = \int_{\partial\Omega} (\nabla f g - f \nabla g) ds.$$

Kładziemy $f = \phi$, $g = \frac{e^{-m|x|}}{4\pi|x|}$, $\Omega = \mathbb{R}^3 \setminus K(r)$. Mamy na $\partial K(r) = r^2 S^2$ z miarą $r^2 d\omega$, gdzie $\omega \in S^2$.

Sprawdzamy, że poza zerem

$$(-\Delta + m^2) \frac{e^{-m|x|}}{4\pi|x|} = 0.$$

$$\int_{\mathbb{R}^3 \setminus K(r)} (-\Delta + m^2) \phi(x) \frac{e^{-m|x|}}{4\pi|x|} dx = \int_{S^2} \left(\partial_r \phi(r, \omega) \frac{e^{-mr}}{4\pi r} - \phi(r, \omega) \partial_r \frac{e^{-mr}}{4\pi r} \right) r^2 d\omega$$

Wreszcie, korzystamy z

$$\partial_r \frac{e^{-mr}}{r} = -\frac{e^{-mr}}{r^2} - \frac{me^{-mr}}{r}, \quad \int_{S^2} d\omega = 4\pi.$$

Zadanie 67 Niech P będzie wielomianem takim, że $P(\xi) \neq 0$, $\xi \in \mathbb{R}$. Niech $g \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Pokazać, że istnieje $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ taka, że

$$P(i\partial_x) f = g.$$

Pokazać, że istnieje G zależne tylko od P takie, że to rozwiązanie może być zapisane jako

$$f = G * g.$$

Znaleźć G dla $P(\xi) = \xi^2 + m^2$