

Zadania domowe z Analizy IR. Seria 4. 16.12.2013

1. Obliczyć całki nieoznaczone:

$$\begin{aligned}
 & \text{(a) } \int (x^2 - 2x + 3)e^x dx; \quad \text{(b) } \int \sin^3 x dx; \quad \text{(c) } \int \frac{x dx}{\cos^2 x}; \quad \text{(d) } \int \sqrt{x}(\log x)^2 dx; \quad \text{(e) } \int \frac{x^4 dx}{x^2+1}; \quad \text{(f) } \int \frac{(x^2+1)dx}{x^4+1}; \quad \text{(g) } \\
 & \int \frac{(x+1)dx}{(x^2+x+2)(x^2+4x+5)}; \quad \text{(h) } \int \frac{x dx}{\sqrt{1+x^4}}; \quad \text{(i) } \int \frac{dx}{x\sqrt{x^n+1}}; \quad \text{(j) } \int \frac{\sqrt{x} dx}{\sqrt{1-x^3}}; \quad \text{(k) } \int \frac{dx}{x\sqrt{x^n-1}}; \quad \text{(l) } \int \frac{x dx}{x^3+1}; \quad \text{(m) } \int \frac{(x^2-1)dx}{x^4+1}; \\
 & \text{(n) } \int \frac{(x^2+1)dx}{x^4+1}; \quad \text{(o) } \int \tan^2 x dx; \quad \text{(p) } \int \frac{1}{x^2} \arcsin x dx; \quad \text{(q) } \int \arcsin \sqrt{\frac{x}{1+x}} dx; \quad \text{(r) } \int x^{-\frac{3}{2}} \log(1 + \sqrt{x}) dx; \quad \text{(s) } \\
 & \int \frac{\log|1-x|}{x^{n+1}} dx; \quad \text{(t) } \int (\frac{x}{\arctan x} - 1)^{-2} dx; \quad \text{(u) } \int \sin(\log x) dx; \quad \text{(w) } \int \frac{\cos x dx}{\sqrt{2+\cos 2x}}; \quad \text{(x) } \int \frac{\tan 2x dx}{2-3\cos^2 x}; \quad \text{(y) } \int \frac{\sin x \cos^3 x dx}{2+\sin^2 x}; \quad \text{(z) } \\
 & \int \sqrt{e^{2x} + 2e^x + 4} dx; \quad \text{(aa) } \int e^{-x} \frac{x^n}{n!} dx; \quad \text{(ab) } \int \frac{dx}{x^3\sqrt{x^2+x}}; \quad \text{(ac) } \int \frac{dx}{1+x+\sqrt{x^2+x}}; \quad \text{(ad) } \int \frac{dx}{x+\sqrt{x-x^2}}; \quad \text{(ae) } \int \frac{dx}{1+\sqrt{x-x^2}};
 \end{aligned}$$

2. Obliczyć całki oznaczone:

$$\begin{aligned}
 & \text{(a) } \int_1^2 \frac{dx}{x^3\sqrt{x^2+1}}; \quad \text{(b) } \int_0^1 \sqrt{\frac{2+x}{2-x}} dx; \quad \text{(c) } \int_2^3 \frac{dx}{x \log x}; \quad \text{(d) } \int_0^1 \sqrt{1+4x^2} dx; \quad \text{(e) } \int_0^{\frac{3}{4}} \frac{dx}{(1+x)\sqrt{1+x^2}}; \quad \text{(f) } \int_1^2 \frac{\sqrt{x^2+x}}{x+1} \quad \text{(g) } \\
 & \int_0^\infty \frac{dx}{x^3+1} \quad \text{(h) } \int_1^\infty \frac{dx}{\sqrt{x^2+1}} \quad \text{(i) } \int_0^1 \log^3 x dx; \quad \text{(j) } \int_0^1 \frac{\arctan \sqrt{x}}{(1+x)\sqrt{x}} dx; \quad \text{(k) } \int_0^\pi \frac{dx}{1+\tan^p x} \text{ dla } p \in \mathbb{R}; \quad \text{(l) } \int_0^\pi \frac{\sin nx}{\sin x} dx, \\
 & n \in \mathbb{N}; \quad \text{(m) } \int_0^\pi \cos^n x \cos nx dx; \quad \text{(n) } \int_0^\pi \frac{dx}{3+2\cos x}; \quad \text{(o) } \int_{-\pi}^\pi \frac{dx}{1+\sin^2 x}; \quad \text{(p) } \int_0^\pi \frac{dx}{1+2\sin x(\sin x+\cos x)}; \quad \text{(q) } \int \frac{x^4 dx}{x^2+1}; \quad \text{(r) } \\
 & \int_a^b (x-a)^m (b-x)^n dx, m, n \in \mathbb{N}, a < b; \quad \text{(s) } \int_0^1 (1-x^2)^n dx, n \in \mathbb{N}; \quad \text{(t) } \int_0^{\log 2} \sqrt{e^x - 1} dx;
 \end{aligned}$$

3. Obliczyć pochodne funkcji:

$$\text{(a) } f(x) := \int_{x^2}^{x^3} \sin(t^2) dt; \quad \text{(b) } g(x) := \int_{\sin x}^{\cos x} \frac{dt}{\sqrt{1+t^4}}.$$

4. Zbadać funkcję $f(x) := \int_0^x \frac{t^2+t}{\sqrt{t^2-2t+2}} dt$

5. Dowieść, że jeśli funkcja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ jest ciągła oraz spełnia warunek $\forall x \in \mathbb{R} : \int_x^{x+1} f(t) dt = 0$, to jest okresowa.

6. Wyrazić $F_{n+1}(x)$ przez $F_n(x)$, jeśli:

$$\begin{aligned}
 & \text{(a) } F_n(x) := \int \left(\frac{x^2}{x^2+1}\right)^n dx \quad \text{(b) } F_n(x) := \int \frac{dx}{x(x^2+1)^n} \text{ (wyliczyć } F_4(x)) \quad \text{(c) } F_n(x) := \int \frac{x^p dx}{\log^n x}, p \in \mathbb{R} \quad \text{(d) } F_n(x) := \\
 & \int x^{p-n} e^x dx, p \in [0, 1[\quad \text{(e) } \int \frac{dx}{x^n(1+x)} \text{ (wyprowadzić wzór na } F_n(x))
 \end{aligned}$$

7. Znaleźć wzór rekurencyjny, wyrażający $F_{n+2}(x)$ przez $F_n(x)$, jeśli:

$$\begin{aligned}
 & \text{(a) } F_n(x) := \int \cos^n x dx \quad \text{(b) } F_n(x) := \int \frac{dx}{\sin^n x} \quad \text{(c) } F_n(x) := \int \frac{dx}{x^n(x^2+1)} \text{ (znaleźć wzory na } F_{2k}(x) \text{ i } F_{2k+1}(x)) \\
 & \text{(d) } F_n(x) := \int \frac{x^n dx}{\sqrt{x^2+1}} \quad \text{(e) } F_n(x) := \int x^n \cos x dx
 \end{aligned}$$

8. Rozważając sumy Riemanna odpowiednio dobranej całki wyliczyć granice:

$$\begin{aligned}
 & \text{(a) } \lim_{n \rightarrow \infty} n \sum_{k=1}^n \frac{1}{n^2+k^2} = \frac{\pi}{4}; \quad \text{(b) } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{kn} \right) = \log k \quad \text{dla } 2 \leq k \in \mathbb{N}; \quad \text{(c) } \\
 & \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{2^{\frac{k}{n}}}{n+\frac{1}{k}} = \frac{1}{\log 2}.
 \end{aligned}$$

9. (C) Dla $k \in \mathbb{Z}_+$ oznaczmy $c_k := \int_0^a x^k \cos x dx$, gdzie $a := \frac{\pi}{2}$. Wykazać, że:

$$\begin{aligned}
 & \text{(a) } c_{2n} = (-1)^n (2n)! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k a^{2k}}{(2k)!}; \quad \text{(b) } c_{2n+1} = (-1)^n (2n+1)! \left(\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k a^{2k+1}}{(2k+1)!} - 1 \right); \\
 & \text{(c) } 0 \leq \frac{a}{(k+1)(k+2)} - \frac{c_k}{a^{k+1}} \leq \frac{k! a^3}{(k+4)!}; \quad \text{(d) } \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k^2}{a^{k+1}} c_k = a = \frac{\pi}{2}.
 \end{aligned}$$