

# Co to jest splątanie kwantowe?



# Sprawy bieżące

1. Esej na temat przyszłości – do 8 stycznia 2021! Jest SZABLON

**UWAGA: Esej jest na oceny 4-5** (czyli testy są na 3-4)

## tematy esejów i sprawozdań

Proszę je traktować przykładowo:

- pandemia i po pandemii
- w czym zastąpi nas sztuczna inteligencja (AI)? A w czym nie ma szans?
- Roboty do roboty!
- zegarek, komputer, komórka, TV, Hi-Fi, samochód, dom za 10-20-30 lat (Wybierając ten temat proszę przeczytać co Państwa koleżanki i koledzy napisali w poprzednich latach! I napisać coś innego, ma się rozumieć.)
- co by było fajnie mieć (wehikuł czasu? tanie źródło energii? antygravitację? działko na komary? ...)
- co by warto zmniejszyć (powiększyć) i dlaczego?
- interface człowiek-maszyna za kilkanaście lat.
- rozrywka w następnych dekadach
- problemy świadomych maszyn i ich relacje z ludźmi
- kuchnia przyszłości (tylko błagam, bez lodówek zamawiających towary prosto ze sklepu!)
- usługi sieciowe przyszłości
- synergie (czyli łączenie produktów/modeli): procesor+pamięć+video+..., komórka+komputer+tablet+... drukarka+kopiarka+fax+..., TV+DVD+konsola+...
- nośniki danych
- łączność i lokalizacja
- id karty - uniwersalny dowód osobisty/prawo jazdy/karta płatnicza/i co jeszcze?
- zagrożenia prywatności
- zagrożenia: piractwo kontra copyright ( "piractwo" = np. wymiana plików, łamanie simlocków; "copyright" = np. patentowanie algorytmów, genów itp.)
- nowe usługi i modele biznesowe
- co można zmieścić w zegarku?
- telefon komórkowy przyszłości - czy to nadal będzie telefon?
- *disruptive technologies* dzisiaj

Jak TO działa? Urządzenia kwantowe. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Imię Nazwisko  
Wydział

Tytuł pracy

Sprawozdanie studenckie 2020/21






1

# Sprawy bieżące

1. Esej na temat przyszłości – do 8 stycznia 2021! Jest SZABLON

**UWAGA: Esej jest na oceny 4-5** (czyli testy są na 3-4)

2. Nowy przedmiot „**Od pomysłu do patentu - Trendy, nowe technologie i zarządzanie innowacjami**” (Jacek Szczytko, Piotr Nieżurawski) – 1100-2`TNT (2 i 3 rok FIZ), 3 ECTS



PAT: Układ czaszy parasola oraz parasol zawierający taki układ czaszy parasola				
	Numer zgłoszenia	P.421346	Numer prawa wyłącznego	Pat.231903
	Data zgłoszenia	2017-04-20	Status	Prawo w mocy
	Nazwa/Tytuł	Układ czaszy parasola oraz parasol zawierający taki układ czaszy parasola	Zgłaszający/Uprawniony	UNIwersytet Warszawski Warszawa, PL
PAT: Układ klucza i zamka ze wskazaniem zamknięcia zamka oraz sposób sygnalizacji zamknięcia zamka				
	Numer zgłoszenia	P.421270	Numer prawa wyłącznego	Pat.232894
	Data zgłoszenia	2017-04-11	Status	Prawo w mocy
	Nazwa/Tytuł	Układ klucza i zamka ze wskazaniem zamknięcia zamka oraz sposób sygnalizacji zam...	Zgłaszający/Uprawniony	UNIwersytet Warszawski Warszawa, PL
PAT: Urządzenie do mocowania rury między dwiema zasadniczo równoległymi do siebie płaszczyznami				
	Numer zgłoszenia	P.418588	Numer prawa wyłącznego	Pat.231433
	Data zgłoszenia	2016-09-07	Status	Prawo w mocy
	Nazwa/Tytuł	Urządzenie do mocowania rury między dwiema zasadniczo równoległymi do siebie pla...	Zgłaszający/Uprawniony	UNIwersytet Warszawski Warszawa, PL
PAT: Sposób wyznaczania wartości namagnesowania nanocząstek magnetycznych oraz urządzenie do wyznaczania wartości namagnesowania nanocząstek magnetycznych				
	Numer zgłoszenia	P.402159	Numer prawa wyłącznego	Pat.222392
	Data zgłoszenia	2012-12-20	Status	Prawo wygasło (brak opłaty za ochronę)
	Nazwa/Tytuł	Sposób wyznaczania wartości namagnesowania nanocząstek magnetycznych oraz urządzt...	Zgłaszający/Uprawniony	UNIwersytet Warszawski Warszawa, PL
PAT: Pojemnik i jego zastosowanie				
	Numer zgłoszenia	P.427375	Numer prawa wyłącznego	
	Data zgłoszenia	2018-10-12	Status	Postępowanie w toku
	Nazwa/Tytuł	Pojemnik i jego zastosowanie	Zgłaszający/Uprawniony	UNIwersytet Warszawski Warszawa, PL
PAT: Zestaw klucza z trzmem o symetrii obrotowej i rdzenia zamka				
	Numer zgłoszenia	P.427214	Numer prawa wyłącznego	
	Data zgłoszenia	2018-09-27	Status	Postępowanie w toku
	Nazwa/Tytuł	Zestaw klucza z trzmem o symetrii obrotowej i rdzenia zamka	Zgłaszający/Uprawniony	UNIwersytet Warszawski Warszawa, PL
PAT: Zestaw klucza i rdzenia zamka				
	Numer zgłoszenia	P.427215	Numer prawa wyłącznego	
	Data zgłoszenia	2018-09-27	Status	Postępowanie w toku
	Nazwa/Tytuł	Zestaw klucza i rdzenia zamka	Zgłaszający/Uprawniony	UNIwersytet Warszawski Warszawa, PL

<https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/search/simple-search?lng=pl>

# Sprawy bieżące

Najnowsze na kanale Uwaga! Naukowy Belkot



## Najciekawsze odkrycia 2020 (feat. Goście)

98 tys. wyświetleń • 1 dzień temu



Uwaga! Naukowy Belkot ✓

Patronite ➤ <https://patronite.pl/NaukowyBelkot> Nasze koszulki ➤ <https://naukowybelkot.shoplo.com/> Moja książka ...

Nowy 4K

<https://www.youtube.com/watch?v=MGafKG3Cf3U>


# Splątane stany - EPR.

Układ cząstek

?

$$\Psi_{n_1, n_2, n_3, \dots}(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \vec{r}_3, \dots, t) = |n_1\rangle |n_2\rangle |n_3\rangle \dots$$


Np. spiny elektronów



# Opis wielu cząstek kwantowych

Jeden elektron:

baza:  $\{|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle\}$




$$\Psi = \alpha_0 |\downarrow\rangle + \alpha_1 |\uparrow\rangle$$

$$\alpha_0^2 + \alpha_1^2 = 1$$

Dla dwóch elektronów:

baza:  $\{|\downarrow\rangle|\downarrow\rangle, |\downarrow\rangle|\uparrow\rangle, |\uparrow\rangle|\downarrow\rangle, |\uparrow\rangle|\uparrow\rangle\}$




$$\Psi = \alpha_{00} |\downarrow\rangle|\downarrow\rangle + \alpha_{01} |\downarrow\rangle|\uparrow\rangle + \alpha_{10} |\uparrow\rangle|\downarrow\rangle + \alpha_{11} |\uparrow\rangle|\uparrow\rangle$$

$$\alpha_{00}^2 + \alpha_{01}^2 + \alpha_{10}^2 + \alpha_{11}^2 = 1$$

Dla trzech elektronów:

baza:  $\{|\downarrow\rangle|\downarrow\rangle|\downarrow\rangle, |\downarrow\rangle|\downarrow\rangle|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle, |\downarrow\rangle|\uparrow\rangle|\uparrow\rangle, |\uparrow\rangle|\downarrow\rangle|\downarrow\rangle, |\uparrow\rangle|\downarrow\rangle|\uparrow\rangle, |\uparrow\rangle|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle, |\uparrow\rangle|\uparrow\rangle|\uparrow\rangle\}$




$$\Psi = \alpha_{000} |\downarrow\rangle|\downarrow\rangle|\downarrow\rangle + \alpha_{001} |\downarrow\rangle|\downarrow\rangle|\uparrow\rangle + \alpha_{010} |\downarrow\rangle|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle + \alpha_{011} |\downarrow\rangle|\uparrow\rangle|\uparrow\rangle + \alpha_{100} |\uparrow\rangle|\downarrow\rangle|\downarrow\rangle + \alpha_{101} |\uparrow\rangle|\downarrow\rangle|\uparrow\rangle + \alpha_{110} |\uparrow\rangle|\uparrow\rangle|\downarrow\rangle + \alpha_{111} |\uparrow\rangle|\uparrow\rangle|\uparrow\rangle$$

itd..

$$\alpha_{000}^2 + \alpha_{001}^2 + \alpha_{010}^2 + \alpha_{011}^2 + \alpha_{100}^2 + \alpha_{101}^2 + \alpha_{110}^2 + \alpha_{111}^2 = 1$$

# Opis wielu cząstek kwantowych




$\{|\downarrow\downarrow\rangle, |\downarrow\uparrow\rangle, |\uparrow\downarrow\rangle, |\uparrow\uparrow\rangle\}$

$$\Psi = \alpha_{00}|\downarrow\downarrow\rangle + \alpha_{01}|\downarrow\uparrow\rangle + \alpha_{10}|\uparrow\downarrow\rangle + \alpha_{11}|\uparrow\uparrow\rangle$$

$$\alpha_{00}^2 + \alpha_{01}^2 + \alpha_{10}^2 + \alpha_{11}^2 = 1$$

# Opis wielu cząstek kwantowych



## Stany Bella

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\downarrow\downarrow\rangle + |\uparrow\uparrow\rangle) \quad |\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\downarrow\uparrow\rangle + |\uparrow\downarrow\rangle)$$
$$|\Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\downarrow\downarrow\rangle - |\uparrow\uparrow\rangle) \quad |\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\downarrow\uparrow\rangle - |\uparrow\downarrow\rangle)$$

Ale stanów Bella nie da się przedstawić w postaci iloczynu dwóch funkcji

jednocząstkowych typu:  $|\Phi\rangle = |\varphi_1\rangle|\varphi_2\rangle$  gdzie  $|\varphi_i\rangle = a_{i1}|\uparrow\rangle + a_{i2}|\downarrow\rangle$

Stany Bella są **SPLĄTANE**

spiny, polaryzacja fotonów, atom + foton, dwa atomy, atom w różnych stanach...



# Opis wielu cząstek kwantowych

Motto na dziś:

**Stany splecione są splecione**

(w każdej bazie)

$$|\downarrow_\theta\rangle = \cos\theta|\downarrow\rangle + \sin\theta|\uparrow\rangle$$

$$|\uparrow_\theta\rangle = -\sin\theta|\downarrow\rangle + \cos\theta|\uparrow\rangle$$

$$|\downarrow\rangle = \cos\theta|\downarrow_\theta\rangle - \sin\theta|\uparrow_\theta\rangle$$


$$|\uparrow\rangle = \sin\theta|\downarrow_\theta\rangle + \cos\theta|\uparrow_\theta\rangle$$

$$|\downarrow_\theta\downarrow_\theta\rangle + |\uparrow_\theta\uparrow_\theta\rangle = |\downarrow\downarrow\rangle + |\uparrow\uparrow\rangle$$


# Splątane stany - EPR

## Einstein:

1. informacja w przyrodzie nie porusza się szybciej niż światło w próżni
2. nie ma absolutnej równoczesności zdarzeń



MQ: ewolucja funkcji falowej jest DETERMINISTYCZNA. Jednak w momencie pomiaru „dowiadujemy” się w jakim stanie jest funkcja (tzw. *redukcja f. falowej*)



# Splątane stany - EPR

A. Einstein, B. Podolsky, N. Rosen – Gedankenexperiment (eksperyment myślowy)

MAY 15, 1935

PHYSICAL REVIEW

VOLUME 47

## Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?

A. EINSTEIN, B. PODOLSKY AND N. ROSEN, *Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey*

(Received March 25, 1935)

In a complete theory there is an element corresponding to each element of reality. A sufficient condition for the reality of a physical quantity is the possibility of predicting it with certainty, without disturbing the system. In quantum mechanics in the case of two physical quantities described by non-commuting operators, the knowledge of one precludes the knowledge of the other. Then either (1) the description of reality given by the wave function in

quantum mechanics is not complete or (2) these two quantities cannot have simultaneous reality. Consideration of the problem of making predictions concerning a system on the basis of measurements made on another system that had previously interacted with it leads to the result that if (1) is false then (2) is also false. One is thus led to conclude that the description of reality as given by a wave function is not complete.

While we have thus shown that the wave function does not provide a complete description of the physical reality, we left open the question of whether or not such a description exists. We believe, however, that such a theory is possible.

„spooky action-at-a-distance”, „local realism”

# Splątane stany - EPR

A. Einstein, B. Podolsky, N. Rosen – Gedankenexperiment (eksperyment myślowy)

obiekty fizyczne mają dobrze określone właściwości, niezależnie od tego czy są one obserwowane, czy też nie **realizm**  
odległe obiekty są od siebie niezależne **lokalność**

While we have thus shown that the wave function does not provide a complete description of the physical reality, we left open the question of whether or not such a description exists. We believe, however, that such a theory is possible.

„spooky action-at-a-distance”, „local realism”

# Splątane stany - EPR

A. Einstein, B. Podolsky, N. Rosen – Gedankenexperiment (eksperyment myślowy)

„Wiemy już, że niemożliwe jest zrozumienie przewidywań kwantowo-mechanicznych w oparciu o klasyczny światopogląd głoszący, że:

**obiekty fizyczne mają dobrze określone właściwości, niezależnie od tego czy są one obserwowane, czy też nie** (realizm), oraz że

**odległe obiekty są od siebie niezależne** (lokalność, wynikająca w teorii względności Einsteina)” – *prof. Marek Żukowski, kierownik Instytutu Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki Uniwersytetu Gdańskiego.*

While we have thus shown that the wave function does not provide a complete description of the physical reality, we left open the question of whether or not such a description exists. We believe, however, that such a theory is possible.

„spooky action-at-a-distance”, „local realism”


# Splątane stany - EPR

*"God does not play at dice with the universe."*

A. Einstein

*"Quit telling God what to do!"*

N. Bohr



# Nierówność Bella.

## III.5 ON THE EINSTEIN PODOLSKY ROSEN PARADOX\*

JOHN S. BELL†

### I. Introduction

THE paradox of Einstein, Podolsky and Rosen [1] was advanced as an argument that quantum mechanics could not be a complete theory but should be supplemented by additional variables. These additional variables were to restore to the theory causality and locality [2]. In this note that idea will be formulated mathematically and shown to be incompatible with the statistical predictions of quantum mechanics. It is the requirement of locality, or more precisely that the result of a measurement on one system be unaffected by operations on a distant system with which it has interacted in the past, that creates the essential difficulty. There have been attempts [3] to show that even without such a separability or locality requirement no “hidden variable” interpretation of quantum mechanics is possible. These attempts have been examined elsewhere [4] and found wanting. Moreover, a hidden variable interpretation of elementary quantum theory [5] has been explicitly constructed. That particular interpretation has indeed a grossly non-local structure. This is characteristic, according to the result to be proved here, of any such theory which reproduces exactly the quantum mechanical predictions.

Originally published in *Physics*, 1, 195-200 (1964).

# Nierówność Bella.


## III.5 ON THE EINSTEIN PODOLSKY ROSEN PARADOX\*

JOHN S. BELL†

### I. Introduction

THE paradox of Einstein, Podolsky and Rosen [1] was advanced could not be a complete theory but should be supplemented by variables were to restore to the theory causality and locality [2]. In mathematically and shown to be incompatible with the statistical requirement of locality, or more precisely that the result of a by operations on a distant system with which it has interacted in difficulty. There have been attempts [3] to show that even without ment no “hidden variable” interpretation of quantum mechanics examined elsewhere [4] and found wanting. Moreover, a hidden variable theory [5] has been explicitly constructed. That particular local structure. This is characteristic, according to the result to reproduces exactly the quantum mechanical predictions.

Originally published in *Physics*, 1, 195-200 (1964).





# Nierówność Bella.



John Bell

ilość obiektów, które posiadają cechę A ale nie mają B +  
ilość obiektów, które posiadają cechę B ale nie mają C  
**jest większa bądź równa**  
ilość obiektów, które posiadają cechę A ale nie mają C

$$\text{ilość}(A, \text{not } B) + \text{ilość}(B, \text{not } C) \geq \text{ilość}(A, \text{not } C)$$

Nierówność Bella (*Bell's inequality*)

<http://www.upscale.utoronto.ca/PVB/Harrison/BellsTheorem/BellsTheorem.html>

# Nierówność Bella.



ilość obiektów, które posiadają cechę A ale nie mają B +  
ilość obiektów, które posiadają cechę B ale nie mają C  
**jest większa bądź równa**  
ilość obiektów, które posiadają cechę A ale nie mają C

$$\text{ilość}(A, \text{not } B) + \text{ilość}(B, \text{not } C) \geq \text{ilość}(A, \text{not } C)$$

John Bell

$$\text{ilość}(A, \text{not } B, C) + \text{ilość}(\text{not } A, B, \text{not } C) \geq 0$$

Dodajemy stronami  $\text{ilość}(A, \text{not } B, \text{not } C) + \text{ilość}(A, B, \text{not } C)$

$$\text{ilość}(A, \text{not } B, C) + \text{ilość}(\text{not } A, B, \text{not } C) + \text{ilość}(A, \text{not } B, \text{not } C) + \text{ilość}(A, B, \text{not } C) \geq 0 + \text{ilość}(A, \text{not } B, \text{not } C) + \text{ilość}(A, B, \text{not } C)$$

<http://www.upscale.utoronto.ca/PVB/Harrison/BellsTheorem/BellsTheorem.html>

# Nierówność Bella.



A: mężczyźni

B: wzrost powyżej 185

C: oczy niebieskie

ilość obiektów, które posiadają cechę A ale nie mają B +

ilość obiektów, które posiadają cechę B ale nie mają C

**jest większa bądź równa**

ilość obiektów, które posiadają cechę A ale nie mają C

$$\text{ilość}(A, \text{not } B) + \text{ilość}(B, \text{not } C) \geq \text{ilość}(A, \text{not } C)$$

John Bell

$$\text{ilość}(A, \text{not } B, C) + \text{ilość}(\text{not } A, B, \text{not } C) \geq 0$$

Dodajemy stronami  $\text{ilość}(A, \text{not } B, \text{not } C) + \text{ilość}(A, B, \text{not } C)$

$$\text{ilość}(A, \text{not } B, C) + \text{ilość}(\text{not } A, B, \text{not } C) + \text{ilość}(A, \text{not } B, \text{not } C) + \text{ilość}(A, B, \text{not } C) \geq 0 + \text{ilość}(A, \text{not } B, \text{not } C) + \text{ilość}(A, B, \text{not } C)$$

c.b.d.o.

<http://www.upscale.utoronto.ca/PVB/Harrison/BellsTheorem/BellsTheorem.html>

# Nierówność Bella.



A: mężczyźni

B: wzrost powyżej 185

C: oczy niebieskie

ilość obiektów, które posiadają cechę A ale nie mają B +

ilość obiektów, które posiadają cechę B ale nie mają C

**jest większa bądź równa**


ilość obiektów, które posiadają cechę A ale nie mają C

$$\text{ilość}(A, \text{not } B) + \text{ilość}(B, \text{not } C) \geq \text{ilość}(A, \text{not } C)$$

John Bell

Bell pokazał, że w pewnych przypadkach mechanika kwantowa daje

$$\text{ilość}(A, \text{not } B) + \text{ilość}(B, \text{not } C) < \text{ilość}(A, \text{not } C)$$



<http://www.upscale.utoronto.ca/PVB/Harrison/BellsTheorem/BellsTheorem.html>

# Nierówność Bella.

## Experimental Test of Bell's Inequalities Using Time-Varying Analyzers

Alain Aspect, Jean Dalibard,<sup>(a)</sup> and Gérard Roger

*Institut d'Optique Théorique et Appliquée, F-91406 Orsay Cédex, France*

(Received 27 September 1982)

Correlations of linear polarizations of pairs of photons have been measured with time-varying analyzers. The analyzer in each leg of the apparatus is an acousto-optical switch followed by two linear polarizers. The switches operate at incommensurate frequencies near 50 MHz. Each analyzer amounts to a polarizer which jumps between two orientations in a time short compared with the photon transit time. The results are in good agreement with quantum mechanical predictions but violate Bell's inequalities by 5 standard deviations.

PACS numbers: 03.65.Bz, 35.80.+s

Bell's inequalities apply to any correlated measurement on two correlated systems. For instance, in the optical version of the Einstein-Podolsky-Rosen-Bohm *Gedankenexperiment*,<sup>1</sup> a source emits pairs of photons (Fig. 1). Measurements of the correlations of linear polarizations are performed on two photons belonging to the same pair. For pairs emitted in suitable states, the correlations are strong. To account for these correlations, Bell<sup>2</sup> considered theories which invoke common properties of both members of the





FIG. 1. Optical version of the Einstein-Podolsky-Rosen-Bohm *Gedankenexperiment*. The pair of photons  $\nu_1$  and  $\nu_2$  is analyzed by linear polarizers I and II (in orientations  $\vec{a}$  and  $\vec{b}$ ) and photomultipliers. The coincidence rate is monitored.

# Nierówność Bella.

## BELL'S THEOREM : THE NAIVE VIEW OF AN EXPERIMENTALIST†



Alain Aspect

Institut d'Optique Théorique et Appliquée  
Bâtiment 503-Centre universitaire d'Orsay  
91403 ORSAY Cedex – France  
alain.aspect@iota.u-psud.fr



*Figure 1. Einstein-Podolsky-Rosen-Bohm Gedankenexperiment with photons. The two photons  $v_1$  and  $v_2$ , emitted in the state  $|\Psi(1,2)\rangle$  of Equation (1), are analyzed by linear polarizers in orientations **a** and **b**. One can measure the probabilities of single or joint detections in the output channels of the polarizers.*

# Nierówność Bella.





If one overlaps two particles at a beamsplitter, interference effects determine the probabilities to find the two particles incident one each from a and b either both in one of the two outputs c and d or to find one in each output.

Only if two photons are in the state

$$|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|H\rangle |V\rangle - |V\rangle |H\rangle)$$

they will leave the beamsplitter into different output arms. If one puts detectors there, a click in each of them, i.e. a coincidence, means the projection of the two photons onto the state

# Nierówność Bella.






ENTANGLED PHOTON PAIRS are created when a laser beam passes through a crystal such as beta barium borate. The crystal occasionally converts a single ultraviolet photon into two photons of lower energy, one polarized vertically (on red cone), one polarized horizontally (on blue cone). If the photons

happen to travel along the cone intersections (green), neither photon has a definite polarization, but their relative polarizations are complementary; they are then entangled. Colorized image (at right) is a photograph of down-converted light. Colors do not represent the color of the light.


LAURIE GRACE (left), P. G. KWIAK AND M. RECK  
Institute for Experimental Physics, University of Warsaw (right)




# Nierówność Bella.



# Nierówność Bella.



# Nierówność Bella.



Dla pojedynczych cząstek:

$$P_+(\mathbf{a}) = P_-(\mathbf{a}) = 1/2$$

$$P_+(\mathbf{b}) = P_-(\mathbf{b}) = 1/2 \quad (\text{Q.M.})$$

Dla obu cząstek:

$$P_{++}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = P_{--}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \frac{1}{2} \cos^2(\mathbf{a}, \mathbf{b}) \quad (\text{Q.M.})$$


$$P_{+-}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = P_{-+}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \frac{1}{2} \sin^2(\mathbf{a}, \mathbf{b})$$

Dla polaryzatorów  $(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = 0$   
ustawionych równolegle

$$P_{++}(\mathbf{a}, \mathbf{a}) = P_{--}(\mathbf{a}, \mathbf{a}) = \frac{1}{2}$$

$$P_{+-}(\mathbf{a}, \mathbf{a}) = P_{-+}(\mathbf{a}, \mathbf{a}) = 0$$

# Nierówność Bella.



Dla pojedynczych cząstek:

$$P_+(\mathbf{a}) = P_-(\mathbf{a}) = \boxed{1/2}$$

$$P_+(\mathbf{b}) = P_-(\mathbf{b}) = \boxed{1/2}$$

(Q.M.)

Pełna korelacja!  
(+,+) i (-,-)

Dla obu cząstek:

$$P_{++}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = P_{--}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \frac{1}{2} \cos^2(\mathbf{a}, \mathbf{b})$$

(Q.M.)


$$P_{+-}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = P_{-+}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \frac{1}{2} \sin^2(\mathbf{a}, \mathbf{b})$$

Dla polaryzatorów  $(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = 0$   
ustawionych równolegle

$$P_{++}(\mathbf{a}, \mathbf{a}) = P_{--}(\mathbf{a}, \mathbf{a}) = \boxed{\frac{1}{2}}$$

$$P_{+-}(\mathbf{a}, \mathbf{a}) = P_{-+}(\mathbf{a}, \mathbf{a}) = 0$$

# Nierówność Bella.




Funkcja korelacji

$$E(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = P_{++}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) + P_{--}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) - P_{+-}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) - P_{-+}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$$

$$E_{QM}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \cos 2(\mathbf{a}, \mathbf{b})$$

np:  $E_{QM}(0) = 1$  dla  $(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = 0$

# Nierówność Bella.



Założmy teraz, że funkcja falowa obu fotonów jest określona przez pewne „ukryte parametry” (oznaczymy je  $\lambda$ ) w momencie emisji. Dla danej pary fotonów i dla danego parametru  $\lambda$  wynik pomiaru jest dany przez funkcje

$$A(\lambda, \mathbf{a}) = \pm 1 \quad \text{at analyzer I (in orientation } \mathbf{a} \text{)}$$

$$B(\lambda, \mathbf{b}) = \pm 1 \quad \text{at analyzer II (in orientation } \mathbf{b} \text{)}$$

Rozkład parametrów  $\lambda$ , funkcje  $A(\lambda, \mathbf{a})$  i  $B(\lambda, \mathbf{b})$  określają konkretną Teorię Parametrów Ukrytych


$$P_+(\mathbf{a}) = \int d\lambda \rho(\lambda) \frac{[A(\lambda, \mathbf{a}) + 1]}{2}$$

$$P_{+-}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \int d\lambda \rho(\lambda) \frac{[A(\lambda, \mathbf{a}) + 1]}{2} \frac{[1 - B(\lambda, \mathbf{b})]}{2}$$

$$E(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \int d\lambda \rho(\lambda) A(\lambda, \mathbf{a}) B(\lambda, \mathbf{b})$$

itd...

# Nierówność Bella.



## Nierówności Bella:

niech polaryzatory będą ustawione w czterech pozycjach  $\mathbf{a}$ ,  $\mathbf{a}'$ ,  $\mathbf{b}$  i  $\mathbf{b}'$

$$\begin{aligned} s &= A(\lambda, \mathbf{a}) \cdot B(\lambda, \mathbf{b}) - A(\lambda, \mathbf{a}) \cdot B(\lambda, \mathbf{b}') + A(\lambda, \mathbf{a}') \cdot B(\lambda, \mathbf{b}) + A(\lambda, \mathbf{a}') \cdot B(\lambda, \mathbf{b}') \\ &= A(\lambda, \mathbf{a}) [B(\lambda, \mathbf{b}) - B(\lambda, \mathbf{b}')] + A(\lambda, \mathbf{a}') [B(\lambda, \mathbf{b}) + B(\lambda, \mathbf{b}')] \end{aligned}$$


wtedy, z racji tego, że  $A = \pm 1$  i  $B = \pm 1$ , dla Teorii Parametrów Ukrytych

$$s(\lambda, \mathbf{a}, \mathbf{a}', \mathbf{b}, \mathbf{b}') = \pm 2$$

Korelacje (uśrednione):  $S(\mathbf{a}, \mathbf{a}', \mathbf{b}, \mathbf{b}') = E(\mathbf{a}, \mathbf{b}) - E(\mathbf{a}, \mathbf{b}') + E(\mathbf{a}', \mathbf{b}) + E(\mathbf{a}', \mathbf{b}')$

$$-2 \leq S(\mathbf{a}, \mathbf{a}', \mathbf{b}, \mathbf{b}') \leq 2$$

# Nierówność Bella.



## Nierówności Bella:

niech polaryzatory będą ustawione w czterech pozycjach **a**, **a'**, **b** i **b'**

Korelacje (uśrednione dla Teorii Parametrów Ukrytych):

$$-2 \leq S(\mathbf{a}, \mathbf{a}', \mathbf{b}, \mathbf{b}') \leq 2$$


Okazuje się, że dla QM

$$S_{QM} = 2\sqrt{2}$$





# Nierówność Bella.






*Figure 5 -  $S(\theta)$  as predicted by Quantum Mechanics for EPR pairs. The conflict with Bell's inequalities happens when  $|S|$  is larger than 2, and it is maximum for the sets of orientations of Figure 4.*

# Nierówność Bella.


$$S_{MQ} = 2\sqrt{2} \quad \text{for} \quad \theta = \pm \frac{\pi}{8}$$

$$S_{MQ} = -2\sqrt{2} \quad \text{for} \quad \theta = \pm \frac{3\pi}{8}$$



*Figure 5 -  $S(\theta)$  as predicted by Quantum Mechanics for EPR pairs. The conflict with Bell's inequalities happens when  $|S|$  is larger than 2, and it is maximum for the sets of orientations of Figure 4.*

# Nierówność Bella.




Kluczowe założenie odnośnie parametrów  $\lambda$ : **LOKALNOŚĆ**, czyli wynik pomiaru  $A(\lambda, \mathbf{a})$  nie zależał od wyniku  $B(\lambda, \mathbf{b})$  oraz rozkład prawdopodobieństwa parametru  $\lambda$  nie zależał od orientacji polaryzatorów  $\mathbf{a}$  i  $\mathbf{b}$ .


## Wnioski:

1. Stan kwantowy splątanych cząstek nie jest ustalony oddzielnie dla każdej z nich.
2. Redukcja funkcji falowej następuje w momencie pomiaru.

# Nierówność Bella.



Eksperyment:



# Nierówność Bella.


Splątanie? Bez paniki!



# Nierówność Bella.

Założmy, że dysponujemy stanem


$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\downarrow\downarrow\rangle + |\uparrow\uparrow\rangle)$$



np. dwa fotony.

Wtedy  $|\downarrow\rangle, |\uparrow\rangle$


oznaczają dwie  
ortogonalne  
polaryzacje:



# Nierówność Bella.

Założmy, że dysponujemy stanem

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\downarrow\downarrow\rangle + |\uparrow\uparrow\rangle)$$



np. dwa fotony.


Wtedy  $|\downarrow\rangle, |\uparrow\rangle$

oznaczają dwie  
ortogonalne  
polaryzacje:



Założmy, że możemy na tym stanie  
wykonać trzy różne pomiary:

**A, B i C,**



które dają wyniki „1” lub „0” z  
prawdopodobieństwem  $\frac{1}{2}$ .

np. polaryzatory w

pozycji

$0^\circ, 60^\circ, 120^\circ$

**A, B i C**

**Uwaga** (ale bez znaczenia)

W tym przykładzie wybraliśmy stan Bella w taki sposób, że wyniki TYCH SAMYCH pomiarów na OBU składnikach pary są w pełni skorelowane (np. pomiar A na obu daje w wyniku tylko pary „00” lub „11”). Ale mogliśmy też wybrać pełną anty-korelację („01” lub „10”) – nie ma to znaczenia.

# Nierówność Bella.

Założmy, że dysponujemy stanem


$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\downarrow\downarrow\rangle + |\uparrow\uparrow\rangle)$$



np. dwa fotony.


Wtedy  $|\downarrow\rangle, |\uparrow\rangle$

oznaczają dwie  
ortogonalne  
polaryzacje:



Założmy, że możemy na tym stanie  
wykonać trzy różne pomiary:

**A, B i C,**



które dają wyniki „1” lub „0” z  
prawdopodobieństwem  $\frac{1}{2}$ .

np. polaryzatory w

pozycji 

$0^\circ, 60^\circ, 120^\circ$

**A, B i C**

Możemy teraz odseparować oba składniki stanu splątanego i niezależnie wykonać na nich  
pomiary **A, B i C,**

pierwszy




drugi






# Nierówność Bella.

pierwszy



$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\uparrow\uparrow\rangle + |\downarrow\downarrow\rangle)$$






drugi



# Nierówność Bella.




- A 0° 
- B 60° 
- C 120° 

## Uwaga:

Możemy wykonać na raz tylko JEDEN z pomiarów (różne polaryzacje nie są współmieralne).

Niespolaryzowany  
foton.






$$P = \frac{1}{2}$$



# Nierówność Bella.




- A 0° 
- B 60° 
- C 120° 

## Uwaga:

Możemy wykonać na raz tylko JEDEN z pomiarów (różne polaryzacje nie są współmieralne).


Niespolaryzowany foton.



$$P = \frac{1}{2}$$



Spolaryzowany foton.




$$P = \cos^2(\theta)$$



Prawo Malusa

# Nierówność Bella.




## Uwaga:

Możemy wykonać na raz tylko JEDEN z pomiarów (różne polaryzacje nie są współmieralne).

Dla stanu:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\downarrow\downarrow\rangle + |\uparrow\uparrow\rangle)$$

1. Pomiar dokonany tylko na jednej cząstce daje wynik „1” lub „0” z prawdopodobieństwem  $\frac{1}{2}$
2. Jeśli oba pomiary zostały wykonane dla tej samej polaryzacji, to oba wyniki są skorelowane





Mechanika kwantowa o pkt 2. „dba sama”. W mechanice klasycznej my musimy o to zadbać (ukryte parametry)!

# Nierówność Bella.

Skoro możemy na tym stanie wykonać trzy różne pomiary  $A$ ,  $B$  i  $C$ , które dają wyniki „1” lub „0” z prawdopodobieństwem  $\frac{1}{2}$ , to jak wyglądają korelacje między nimi?

Np. pytamy: jeśli na pierwszym składniku wynik był „1” dla  $A$  to znaczy, że dla drugiego był:

„1” dla  $A$  ,

i dowolny („0” lub „1”) dla  $B$  i  $C$   

z prawd.  $P = \cos^2(\theta)$

$$\cos^2(\theta) = \cos^2(60^\circ) = \cos^2(120^\circ) = \frac{1}{4}$$



drugi



KWANTOWO:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|\downarrow\downarrow\rangle + |\uparrow\uparrow\rangle)$$

pierwszy



	1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{1}{4}$
	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	1

Średni rozkład =  $(3 \times 1 + 6 \times \frac{1}{4}) / 9 = \frac{1}{2}$   
Gdy oba eksperymenty wybrane zostaną przypadkowo

# Nierówność Bella.

Założmy że stan kwantowy splątanych cząstek jest ustalony oddzielnie dla każdej z nich, a redukcja funkcji falowej nastąpiła w momencie rozdzielenia cząstek. Jakie są „klasyczne” wyniki pomiaru?

pierwszy



*A, B i C*

0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

drugi



*A, B i C*

0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

	1	1/2	1/2
	1/2	1	1/2
	1/2	1/2	1

$$\text{Średni rozkład} = (3 \times 1 + 6 \times \frac{1}{2}) / 9 = 2/3$$

# Nierówność Bella.

Założmy że stan kwantowy splątanych cząstek jest ustalony oddzielnie dla każdej z nich, a redukcja funkcji falowej nastąpiła w momencie rozdzielenia cząstek. Jakie są „klasyczne” wyniki pomiaru?

pierwszy



A, B i C

0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

drugi



A, B i C

0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

	1	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$
	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1

$$\text{Średni rozkład} = (3 \times 1 + 6 \times \frac{1}{2}) / 9 = 2/3$$

# Nierówność Bella.

Założmy że stan kwantowy splątanych cząstek jest ustalony oddzielnie dla każdej z nich, a redukcja funkcji falowej nastąpiła w momencie rozdzielenia cząstek. Jakie są „klasyczne” wyniki pomiaru?

pierwszy



A, B i C

0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

drugi



A, B i C

0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

	1	1/2	1/2
	1/2	1	1/2
	1/2	1/2	1

$$\text{Średni rozkład} = (3 \times 1 + 6 \times \frac{1}{2}) / 9 = 2/3$$



# Nierówność Bella.

Założmy że stan kwantowy splątanych cząstek jest ustalony oddzielnie dla każdej z nich, a redukcja funkcji falowej nastąpiła w momencie rozdzielenia cząstek. Jakie są „klasyczne” wyniki pomiaru?

pierwszy



*A, B i C*

0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

drugi



*A, B i C*

0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

1	1/2	1/2
1/2	1	1/2
1/2	1/2	1

$$\text{Średni rozkład} = (3 \times 1 + 6 \times \frac{1}{2}) / 9 = 2/3$$

# Nierówność Bella.

Założmy że stan kwantowy splątanych cząstek jest ustalony oddzielnie dla każdej z nich, a redukcja funkcji falowej nastąpiła w momencie rozdzielenia cząstek. Jakie są „klasyczne” wyniki pomiaru?

pierwszy



*A, B i C*

0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

drugi



*A, B i C*

0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

	1	1/2	1/2
	1/2	1	1/2
	1/2	1/2	1

$$\text{Średni rozkład} = (3 \times 1 + 6 \times \frac{1}{2}) / 9 = 2/3$$

# Nierówność Bella.

Założmy że stan kwantowy splątanych cząstek jest ustalony oddzielnie dla każdej z nich, a redukcja funkcji falowej nastąpiła w momencie rozdzielenia cząstek. Jakie są „klasyczne” wyniki pomiaru?

pierwszy



*A, B i C*

0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

drugi



*A, B i C*

0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

1	1/2	1/2
1/2	1	1/2
1/2	1/2	1

$$\text{Średni rozkład} = (3 \times 1 + 6 \times \frac{1}{2}) / 9 = 2/3$$

# Nierówność Bella.

Założmy że stan kwantowy splątanych cząstek jest ustalony oddzielnie dla każdej z nich, a redukcja funkcji falowej nastąpiła w momencie rozdzielenia cząstek. Jakie są „klasyczne” wyniki pomiaru?

pierwszy



*A, B i C*

0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

drugi




*A, B i C*

0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

	1	1/2	1/2
	1/2	1	1/2
	1/2	1/2	1

$$\text{Średni rozkład} = (3 \times 1 + 6 \times \frac{1}{2}) / 9 = 2/3$$

# Nierówność Bella.


 (QM) = a+b+g+h =  $\frac{1}{4}$

pierwszy



A, B i C




a	0	0	0
b	0	0	1
c	0	1	0
d	0	1	1
e	1	0	0
f	1	0	1
g	1	1	0
h	1	1	1


drugi



A, B i C







0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1



1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{4}$	1	$\frac{1}{2}$
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1

# Nierówność Bella.




  (QM) = a+b+g+h = ¼

  (QM) = a+c+f+h = ¼

pierwszy

A, B i C












			
a	0	0	0
b	0	0	1
c	0	1	0
d	0	1	1
e	1	0	0
f	1	0	1
g	1	1	0
h	1	1	1

drugi



A, B i C







			
a	0	0	0
b	0	0	1
c	0	1	0
d	0	1	1
e	1	0	0
f	1	0	1
g	1	1	0
h	1	1	1

			
	1	¼	¼
	¼	1	½
	¼	½	1

# Nierówność Bella.

  (QM) = a+b+g+h = ¼




  (QM) = a+c+f+h = ¼

  (QM) = a+d+e+h = ¼

pierwszy

A, B i C












			
a	0	0	0
b	0	0	1
c	0	1	0
d	0	1	1
e	1	0	0
f	1	0	1
g	1	1	0
h	1	1	1

drugi

A, B i C



			
	0	0	0
	0	0	1
	0	1	0
	0	1	1
	1	0	0
	1	0	1
	1	1	0
	1	1	1

			
	1	¼	¼
	¼	1	¼
	¼	¼	1

# Nierówność Bella.

$$\begin{array}{|} \hline \text{I} \\ \hline \end{array} \begin{array}{|} \hline \text{II} \\ \hline \end{array} \text{ (QM) = } a+b+g+h = \frac{1}{4}$$

$$\begin{array}{|} \hline \text{I} \\ \hline \end{array} \begin{array}{|} \hline \text{III} \\ \hline \end{array} \text{ (QM) = } a+c+f+h = \frac{1}{4}$$

$$\begin{array}{|} \hline \text{II} \\ \hline \end{array} \begin{array}{|} \hline \text{III} \\ \hline \end{array} \text{ (QM) = } a+d+e+h = \frac{1}{4}$$

$$\begin{array}{|} \hline \text{I} \\ \hline \end{array} \begin{array}{|} \hline \text{II} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|} \hline \text{I} \\ \hline \end{array} \begin{array}{|} \hline \text{III} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|} \hline \text{II} \\ \hline \end{array} \begin{array}{|} \hline \text{III} \\ \hline \end{array} = a+b+g+h + a+c+f+h + a+d+e+h = \\ = 2(a+h) + (a+b+c+d+e+f+g+h) = \frac{3}{4}$$

$$2(a+h) + (a+b+c+d+e+f+g+h) = \frac{3}{4}$$

$$2(a+h) + \underline{\quad\quad\quad 1 \quad\quad\quad} = \frac{3}{4}$$

$$a+h = -1/8 < 0$$

Nie ma klasycznych prawdopodobieństw dla NIEZALEŻNYCH zdarzeń



Żadna LOKALNA teoria parametrów ukrytych nie może odtworzyć wyników QM.



# Nierówność Bella.



John Bell

A: mężczyźni

B: wzrost powyżej 190

C: oczy niebieskie

ilość obiektów, które posiadają cechę A ale nie mają B +  
ilość obiektów, które posiadają cechę B ale nie mają C

**jest większa bądź równa**

ilość obiektów, które posiadają cechę A ale nie mają C

$$\text{ilość}(A, \text{not } B) + \text{ilość}(B, \text{not } C) \geq \text{ilość}(A, \text{not } C)$$

Nierówność Bella (*Bell's inequality*)

Cechy A, B i C nie istnieją równocześnie (niezależnie od siebie) w QM.

A: polaryzacja 

B: polaryzacja 

C: polaryzacja 


Za to stają się określone w momencie pomiaru (w przypadku stanów splątanych niezależnie od dzielącej cząstki odległości)! Mechanika kwantowa jest NIELOKALNA.

# Do obejrzenia

Polaryzacja




<https://www.youtube.com/watch?v=MzRCDLre1b4&t=1s>



The thumbnail for the video 'Light quantum' features the title 'Light quantum' in a serif font with radiating lines above it. Below the title is a quantum superposition equation:  $\frac{1}{\sqrt{2}} | \text{stick figure} \rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} | \text{alien} \rangle$ . The 'stick figure' is a simple white stick figure, and the 'alien' is a blue alien-like figure. A red progress bar is visible at the bottom of the thumbnail, and the duration '22:22' is shown in the bottom right corner.

Some light quantum mechanics (with minutephysics)  
1,2 mln wyświetleń • 3 lata temu

 3Blue1Brown ✓

The math of superposition and quantum states. minutephysics channel: <https://www.youtube.com/user/minutephysics>  
Brought to ...

4K napisy

# Do obejrzenia

Nierówności Bella



<https://www.youtube.com/watch?v=MzRCDLre1b4>

This block shows a screenshot of a YouTube video player. The video thumbnail on the left features a Venn diagram with three overlapping circles and a red arrow pointing to the central intersection. The text 'This is weirder than you think' is overlaid on the thumbnail. The video title is 'Bell's Theorem: The Quantum Venn Diagram Paradox', with 5.9 million views and it was uploaded 3 years ago. The channel is 'minutephysics'. Below the title, it says 'Featuring 3Blue1Brown Watch the 2nd video on 3Blue1Brown here: https://www.youtube.com/watch?v=MzRCDLre1b4 Support ...'. There is a 'napisy' (subtitles) button. The video duration is 17:35.

**This is weirder than you think**

**Bell's Theorem: The Quantum Venn Diagram Paradox**  
5,9 mln wyświetleń • 3 lata temu

minutephysics

Featuring 3Blue1Brown Watch the 2nd video on 3Blue1Brown here: <https://www.youtube.com/watch?v=MzRCDLre1b4>  
Support ...

napisy

17:35

# Nierówność Bella.

Twierdzenie Bella - Wikipedia, wolna encyklopedia - Mozilla Firefox

Plik Edycja Widok Historia Zakładki Narzędzia Pomoc

W http://pl.wikipedia.org/wiki/Twierdzenie\_Bella

Logowanie / rejestracja

artykuł dyskusja edytuj historia i autorzy

 WIKIPEDIA  
Wolna encyklopedia

- Strona główna
- Kategorie artykułów
- Losuj stronę
- Bieżące wydarzenia
- Pomoc
- Donate

techniczne

- Portal wikipedystów
- Kontakt z Wikipedią
- Zgłoś błąd

Ostatnie zmiany

Zmiany tematyczne

szukaj

Przejdź Szukaj

narzędzia

- Linkujące
- Zmiany w

22 058 osób przekazało dary pieniężne

**Właśnie ty** możesz pomóc Fundacji Wikimedia zmienić świat!

» Złóż darowiznę!

"Wonderful site! I recommend it to all of my students." – Michael R.

## Twierdzenie Bella

**Twierdzenie Bella** jest jednym z najważniejszych odkryć naukowych dotyczących podstaw [mechaniki kwantowej](#) i teorii [pomiaru](#), pokazującym w jaki sposób jej przewidywania różnią się od klasycznej intuicji. Jego autorem jest Irlandzki fizyk [John Stewart Bell](#). Można je sformułować następująco:

*Zadna **teoria zmiennych ukrytych** zgodna z teorią względności nie może opisać wszystkich zjawisk mechaniki kwantowej.*

Bell sformułował to twierdzenie w 1964 roku w pracy "*On the Einstein Podolsky Rosen paradox*" (patrz [Paradoks EPR](#)). Einstein zakładał **realizm lokalny** – czyli że parametry cząstek kwantowych mają wartości niezależne od aktów obserwacji i że oddziaływania fizyczne zachodzą ze skończoną prędkością. Bell pokazał że to założenie prowadzi do mierzalnych efektów, które nie występują w mechanice kwantowej. Udowodnił, że wszystkie teorie lokalne i realistyczne muszą spełniać tzw. **nierówności Bella**. Natomiast mechanika kwantowa ich nie spełnia.

Nierówności Bella otrzymujemy jeżeli założymy, że wyniki pomiarów przeprowadzanych przez dwóch odległych od siebie obserwatorów na parach cząstek mają spełniać zasady lokalnego realizmu (oraz, że

Znajdź: lokal

Następne Poprzednie Podświetl Uwzględnij wielkość liter

Zakończono

# Opis wielu cząstek kwantowych

## Concurrence

W.K. Wootters, Phys. Rev. Lett. 80, 2245 (1998)

$$\mathcal{C} = \max \left( 0, \sqrt{\lambda_1} - \sqrt{\lambda_2} - \sqrt{\lambda_3} - \sqrt{\lambda_4} \right)$$

$\{\lambda_i\}$  — wartości własne macierzy  $R = \rho \tilde{\rho}$

$$\tilde{\rho} = \sigma_y \otimes \sigma_y \rho^* \sigma_y \otimes \sigma_y$$

$$0 \leq \mathcal{C} \leq 1$$

## Negativity

A. Peres, Phys. Rev. Lett. 77, 1413 (1996)


P. Horodecki, Phys. Lett. A 232, 333 (1997)

$$\mathcal{N} = \max \left( 0, -2 \sum_i \nu_i \right)$$

$\{\nu_i\}$  — ujemne wartości własne częściowo transponowanej macierzy gęstości  $\rho^{T1}$

$$0 \leq \mathcal{N} \leq 1$$


# Opis wielu cząstek kwantowych



Concurrence  $\mathcal{C}(t)$  (ciągła) i negativity  $\mathcal{N}(t)$  (kreski)

# Splątane stany - EPR



POJEDYNCZE POMIARY NIE DAJĄ INFORMACJI O CAŁEJ FUNKCJI FALOWEJ



odpowiedź probabilistyczna

# Splątane stany - EPR

## Quantum Imaging with Undetected Photons



<http://phys.org/news/2014-08-picturing-schrodinger-cat-quantum-physics.html>

Credit: Gabriela Barreto Lemos, Quantum Optics and Quantum Information (IQOQI), the Vienna Center for Quantum Science and Technology (VCQ),