

# 1 Własności $\mathbb{R}^N$

## 1.1 Odległości i normy w $\mathbb{R}^N$

Będziemy się teraz zajmować funkcjami od  $n$  zmiennych, tzn. określonymi na  $\mathbb{R}^N \equiv \mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}$  (iloczyn kartezjański  $N$  egzemplarzy  $\mathbb{R}$ ).

Punkt  $x$  należący do  $\mathbb{R}^N$  będziemy oznaczać jako

$$x = (x^1, x^2, \dots, x^N).$$

Przykł. Wysokość terenu n.p.m. jako funkcja długości i szerokości geograficznej.

Przykł. Temperatura w atmosferze (czy innym ośrodku) jako funkcja dł. i szer. geogr. oraz wysokości.

Początkiem do badania  $\mathbb{R}^n$  i funkcji na niej jest zdefiniowanie *odległości*. Przypomnijmy sobie, jak definiowaliśmy odległość w  $\mathbb{R}^2$ . Jest ona wyznaczana z tw. Pitagorasa: **RYS.**: Dla dwóch punktów  $a = (a^1, a^2)$  i  $b = (b^1, b^2)$  odległość  $D(a, b)$  pomiędzy nimi jest

$$D(a, b) = \sqrt{(a^1 - b^1)^2 + (a^2 - b^2)^2}.$$

Analogicznie postępujemy w przestrzeniach o większej liczbie wymiarów: Jeśli  $x, y \in \mathbb{R}^N$ , to odległość  $d(x, y)$  między nimi definiujemy jako

**Def.**

$$d(x, y) = \sqrt{\sum_{k=1}^N (x^k - y^k)^2} \quad (1)$$

Inne oznaczenie  $d(x, y)$  w  $\mathbb{R}^N$  to  $\|x - y\|$ , tzn.

**Def.**

Jeśli mamy punkt  $r = (r^1, r^2, \dots, r^N) \in \mathbb{R}^N$ , to na  $\|r\| = \sqrt{\sum_{k=1}^N (r^k)^2}$  możemy patrzeć jako na odległość punktu  $r$  od zera:

$$\|r\| = \sqrt{\sum_{k=1}^N (r^k)^2} = d(r, 0). \quad (2)$$

Tak zdefiniowana norma ma ważne własności, które teraz wypiszemy.

**Własności normy.**

1. Dla dowolnego  $x \in \mathbb{R}^N$  mamy:  $\|x\| \geq 0$ , przy czym  $\|x\| = 0$  tylko dla wektora zerowego  $x = \mathbf{0}$ ;
2.  $\|-r\| = \|r\|$  i ogólniej,  $\|\alpha r\| = |\alpha| \cdot \|r\|$ , gdzie  $\alpha \in \mathbb{R}$ .
- 3.

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|; \quad (3)$$

ta nierówność nazywana jest *nierównością trójkąta*.

**Dow. p.3):** Nierówność trójkąta wynika z *nierówności Schwarza*: Dla dowolnych  $x, y \in \mathbb{R}^N$  zachodzi

$$\left| \sum_{k=1}^N x^k \cdot y^k \right| \leq \|x\| \cdot \|y\|. \quad (4)$$

**Dow.** Rozpatrzmy następującą funkcję zmiennej rzeczywistej  $\lambda$ :

$$f(\lambda) = \sum_{k=1}^N (x^k - \lambda y^k)^2 = \sum_{k=1}^N (x^k)^2 - 2\lambda \sum_{k=1}^N x^k y^k + \lambda^2 \sum_{k=1}^N (y^k)^2$$

$f(\lambda)$  jest trójmianem kwadratowym w  $\lambda$ . Ponadto  $f(\lambda) \leq 0$ , ponieważ  $f(\lambda)$  jest pełnym kwadratem. Skoro trójmian  $f(\lambda)$  jest nieujemny, to jego wyróżnik  $\Delta$  musi być niedodatni. Policzmy ten wyróżnik:

$$\Delta = 4\left(\sum_{k=1}^N x^k y^k\right)^2 - 4 \sum_{k=1}^N (x^k)^2 \sum_{k=1}^N (y^k)^2 \leq 0, \quad (5)$$

co możemy przepisać jako

$$\left(\sum_{k=1}^N x^k y^k\right)^2 \leq \sum_{k=1}^N (x^k)^2 \sum_{k=1}^N (y^k)^2$$

Po wyciągnięciu pierwiastka kwadratowego z obu stron nierówności i skorzystaniu z definicji normy (2) otrzymujemy nierówność (4).

**CBDO**

**Dow.** nierówności trójkąta (3). Policzmy:

$$\begin{aligned} \|x - y\|^2 &= \sum_{k=1}^N (x^k - y^k)^2 = \sum_{k=1}^N (x^k)^2 - 2 \sum_{k=1}^N x^k y^k + \sum_{k=1}^N (y^k)^2 \\ &\leq \|x\|^2 + 2\|x\| \cdot \|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2. \end{aligned}$$

z czego trzeba jeszcze wyciągnąć pierwiastek, aby otrzymać (3).

**CBDO**

*Uwaga:* Czy w nierówności Schwarz'a może wystąpić równość? TAK – jeśli  $x$  jest proporcjonalne do  $y$  (tzn.  $x = \gamma y$  dla pewnego  $\gamma \in \mathbb{R}$ ; wtedy  $\Delta = 0$ , a to znaczy (p. równ (5)) że w nier. Schwarz'a ma miejsce równość.

Podsumujmy **własności odległości**, definiowanej przez (1):

Dla dowolnych punktów  $x, y, z \in \mathbb{R}^N$  zachodzi:

1.  $d(x, y) \geq 0$ , przy czym  $d(x, y) = 0 \iff x = y$ .
2.  $d(x, y) = d(y, x)$ .
3.  $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$  (jest to tzw. *nierówność trójkąta*). **RYS.**

Okazuje się, że odległość euklidesowa nie jest jedyną funkcją od dwu argumentów, spełniającą powyższe warunki. Na przestrzeni  $\mathbb{R}^N$  można wprowadzić wiele innych funkcji, zależnych od dwu argumentów, które spełniają powyższe warunki i które w związku z tym można też nazwać odległościami. Prowadzi to do pojęcia *przestrzeni metrycznej*:

**Def.** *Przestrzenią metryczną* nazywamy zbiór punktów z funkcją dwóch zmiennych  $d(\cdot, \cdot)$  (zwaną *metryką* lub *odległością*), których odległość spełnia powyższe własności 1., 2. i 3.

*Przykł.* Wprowadźmy na  $\mathbb{R}^N$  następującą metrykę:

$$d_{\diamond}(x, y) = \sum_{i=1}^N |x_i - y_i| \quad (6)$$

Łatwo sprawdzić, że  $d_\diamond(x, y)$  spełnia powyższe własności 1., 2. i 3.; pierwsze dwie są oczywiste, a trzecia wynika z nierówności dla wartości bezwzględnej:  $|x - z| \leq |x - y| + |y - z|$ .

*Przykł.* Jeszcze jedna, niejednokrotnie użyteczna, metryka na  $\mathbb{R}^N$  :

$$d_\square(x, y) = \max_{1 \leq i \leq N} |x_i - y_i|; \quad (7)$$

pierwsze dwie własności metryki są oczywiste, a trzecia wynika z następującego rachunku: Dla dowolnych punktów  $x, y, z$  mamy

$$\begin{aligned} d_\square(x, y) &= \max_{1 \leq i \leq N} |x_i - y_i| = \max_{1 \leq i \leq N} |x_i - z_i + z_i - y_i| \\ &\leq \max_{1 \leq i \leq N} (|x_i - z_i| + |z_i - y_i|) \\ &\leq \max_{1 \leq i \leq N} |x_i - z_i| + \max_{1 \leq i \leq N} |z_i - y_i| = d(x, z) + d(z, y); \end{aligned}$$

przedostatnia nierówność wynika z nierówności  $|a+b| \leq |a|+|b|$  dla wartości bezwzględnej, a ostatnia – z nierówności dla maksimum. (? Bardziej szczegółowy rachunek?)

## 1.2 Ciągi punktów z $\mathbb{R}^N$

Oznaczymy przez  $\{a_n\} = (a_1, a_2, \dots)$  ciąg punktów z  $\mathbb{R}^N$ :  $a_n \in \mathbb{R}^N$ , tzn.  $a_n = (a_n^1, a_n^2, \dots, a_n^N)$ .

**Def.** Mówimy, że ciąg  $\{a_n\}$  punktów z  $\mathbb{R}^N$  jest zbieżny do  $g \in \mathbb{R}^N$ , jeśli

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists M \in \mathbb{N} \quad \forall n > M : d(a_n, g) < \epsilon. \quad (8)$$

*Uwaga.* Warunek (8) oznacza, że ciąg (o wartościach rzeczywistych!):  $d(a_n, g)$  dąży do zera dla  $n$  dążącego do  $\infty$ :

$$d(a_n, g) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Jeśli warunek (8) jest spełniony, to piszemy też:

$$a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} g.$$

Podobnie jak w przypadku ciągów o wartościach rzeczywistych, mamy twierdzenie o jednoznaczności granicy.

**Tw.** Jeśli  $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} g$  i  $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} g'$ , to  $g = g'$ .

**Dow.** Mamy:

$$0 \leq d(g, g') \leq d(g, a_n) + d(a_n, g') \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

co znaczy, że  $d(g, g') = 0$ , a więc  $g = g'$ .

**CBDO**

Badanie zbieżności ciągów o wartościach w  $\mathbb{R}^N$  jest równoważne badaniu zbieżności ciągów w  $\mathbb{R}$ . Mówi o tym następujące

*Stw.* Niech  $\{a_n\}$  będzie ciągiem punktów przestrzeni  $\mathbb{R}^N$ ; niech  $g \in \mathbb{R}^N$ . Wtedy

$$(a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} g) \iff (\text{dla wszystkich } k = 1, 2, \dots, N : a_n^k \xrightarrow{n \rightarrow \infty} g^k). \quad (9)$$

**Dow.**  $\Leftarrow$

$$d(a_n, g) = \sqrt{\sum_{k=1}^N (a_n^k - g^k)^2},$$

i ponieważ każde z wyrażeń pod pierwiastkiem dąży do zera:  $|a_n^k - g^k| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ , to ich suma też dąży do zera, a to znaczy, że  $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} g$ .

$\implies$

Mamy:  $\|r\| = \sqrt{\sum_{k=1}^N (r^k)^2}$ . Wybierzmy którąś  $k$ -tą składową i mamy z nierówności trójkąta:

$$\|r\| \geq \sqrt{(r^k)^2} = |r^k|,$$

co daje:

$$d(a_n, g) \geq |a_n^k - g^k| \geq 0,$$

i z tw. o 3 ciągach w przypadku ciągów o wartościach rzeczywistych, jeżeli  $d(a_n, g) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ , to także  $|a_n^k - g^k| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ , a to znaczy, że  $a_n^k \xrightarrow{n \rightarrow \infty} g^k$  dla  $k = 1, 2, \dots, N$ .

**CBDO**

**Def.** Niech  $X \subset \mathbb{R}^N$ . Mówimy, że  $X$  jest *ograniczony*, jeśli istnieje taka liczba  $M$ , że

$$\forall_{x \in X} : \|x\| \leq M$$

(tzn. odległości wszystkich punktów zbioru  $X$  od zera są nie większe od liczby  $M$ ).

Niech  $s \in \mathbb{R}^N$  i  $R \in \mathbb{R}_+$ .

**Def.** Kulą (otwartą)  $K(s, R)$  o środku w  $s$  i promieniu  $R$  nazywamy zbiór tych punktów  $\mathbb{R}^N$ , że ich odległość od  $s$  jest mniejsza od  $R$ : **RYS**.

$$K(s, R) = \{x \in \mathbb{R}^N : d(x, s) < R\}. \quad (10)$$

*Uwaga.* Własność ograniczoności zbioru można równoważnie tak wypowiedzieć: Zbiór  $Z$  jest ograniczony, jeśli zawiera się w pewnej kuli (o pewnym środku i pewnym promieniu).

**Ciekawostka.** Jak wygląda kula w metryce euklidesowej, dla  $N = 2$  to każdy (chyba) wie. Jak wyglądają kule w metrykach:  $d_\diamond$  i  $d_\square$ ? – Gdy się je narysuje to będzie wiadomo skąd są takie oznaczenia tych metryk.

**Tw.** (Bolzano – Weierstrassa). Każdy ograniczony ciąg punktów  $\mathbb{R}^N$  posiada podciąg zbieżny.

**Dow.** Niech  $a_n = (a_n^1, a_n^2, \dots, a_n^N)$ .

Jeśli ciąg  $\{a_n\}$  – ograniczony, to wszystkie ciągi  $\{a_n^k\}$  ( $k$  – numer składowej, tzn.  $k = 1, 2, \dots, N$ ;  $n$  – numer elementu ciągu, tzn.  $n = 1, 2, 3, \dots$ ) są ograniczone. Wynika to z nierówności pokazywanej wyżej:  $\|r\| \geq r^k$  dla dowolnego  $r \in \mathbb{R}^N$ .

Po zastosowaniu tw. Bolzano-Weierstrassa do ciągu  $\{a_n^1\}$  otrzymamy podciąg  $\{a_{n_k}^1\}$  ciągu  $\{a_n\}$  taki, że ciąg pierwszych współrzędnych jest zbieżny. Stosujemy teraz tw. Bolzano-Weierstrassa do ciągu  $\{a_{n_k}^2\}$  i otrzymujemy podciąg ciągu  $\{a_{n_k}\}$ , którego pierwsza i druga składowa są zbieżne. Itd., operację powtarzamy  $N$  razy, aż otrzymamy zbieżność we wszystkich składowych.

**CBDO**

Następująca definicja jest bezpośrednim analogonem definicji ciągu Cauchy'ego o wartościach rzeczywistych na ciągi o wartościach wektorowych (tzn. z  $\mathbb{R}^N$ ).

**Def.** Niech  $\{a_n\}$  – ciąg punktów z  $\mathbb{R}^N$ . Mówimy, że ciąg  $\{a_n\}$  jest *ciągami Cauchy'ego*, jeśli

$$\forall_{\epsilon > 0} \exists_{M \in \mathbb{N}} \forall_{m, n > M} : d(a_m, a_n) < \epsilon. \quad (11)$$

**Tw.** W przestrzeni  $\mathbb{R}^N$  ciąg jest zbieżny wtedy i tylko wtedy, gdy jest ciągiem Cauchy'ego.

**Dow.  $\implies$ :** Załóżmy, że  $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} g$ . Z definicji ciągu zbieżnego (powtórzonej tu 2 razy):

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists M \in \mathbb{N} \quad \forall m, n > M : d(a_m, g) < \frac{\epsilon}{2} \wedge d(a_n, g) < \frac{\epsilon}{2}.$$

Z nierówności trójkąta mamy:

$$d(a_n, a_m) \leq d(a_n, g) + d(a_m, g) < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$$

czyli otrzymujemy (11), a więc  $\{a_n\}$  jest ciągiem Cauchy'ego.

$\Leftarrow$ : Załóżmy teraz, że  $\{a_n\}$  jest ciągiem Cauchy'ego. Wtedy

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists M \in \mathbb{N} \quad \forall m, n > M : d(a_m, a_n) < \epsilon;$$

a że

$$d(a_m, a_n) \geq |a_m^k - a_n^k| \quad \text{dla } k = 1, 2, \dots, N$$

to każdy z ciągów  $\{a_n^k\}$  jest ciągiem Cauchy'ego. A jak wiemy, jeżeli ciąg rzeczywisty jest ciągiem Cauchy'ego, to jest zbieżny. Zatem każdy z ciągów  $\{a_n^k\}$  jest zbieżny; a to znaczy, że też i ciąg  $\{a_n\}$  jest zbieżny.

**CBDO**

## 1.3 Zbiory otwarte i domknięte

W przypadku analizy na  $\mathbb{R}^1$ , mieliśmy szereg twierdzeń, w założeniach których było, iż jakiś zbiór jest otwarty bądź domknięty. Dla podzbiorów  $\mathbb{R}^1$  mieliśmy sytuację, gdzie zbiorem domkniętym był odcinek z końcami (bądź skończona liczba takich odcinków), zaś otwartym – odcinek bez końców (bądź skończona liczba takich odcinków). Dla zbiorów w  $\mathbb{R}^N$  również definiujemy pojęcia otwartości i domkniętości, ale nie da się ich bezpośrednio przenieść z  $\mathbb{R}^1$  – trzeba je odpowiednio zmodyfikować.

### 1.3.1 Zbiory domknięte

**Def.** Niech  $A \subset \mathbb{R}^N$ . Zbiór  $A$  nazywamy *domkniętym*, jeśli dla dowolnego zbieżnego ciągu elementów z  $A$  jego granica też należy do  $A$ ;

tzn.:  $A$  – domknięty  $\iff$

$$\forall_{\{x_n\}} (x_n \in A, x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} g) \implies (g \in A).$$

*Przykł.* zbiorów domkniętych.

1.  $\mathbb{R}^N$ .
2. Zbiór jednoelementowy.
3. Zbiór skończony.
4. W szczególności – zbiór pusty.
5. Niech  $\{a_n\}$  – ciąg o wyrazach z  $\mathbb{R}^N$ ,  $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} g \in \mathbb{R}^n$ . Wtedy zbiór  $\{a_1, a_2, \dots\} \cup g$  jest zbiorem domkniętym.

*Przykł.* Odcinek  $]0, 1]$  nie jest domknięty, bo wszystkie elementy ciągu  $\frac{1}{n}$  należą do  $]0, 1]$ , a granica 0 *nie należy* do  $]0, 1]$ .

**Def.** Niech  $A \subset \mathbb{R}^N$ . *Domknięciem* zbioru  $A$  (ozn.  $\bar{A}$ ) nazywamy zbiór:

$$\bar{A} = \{x \in \mathbb{R}^N : \text{Istnieje ciąg } \{x_n\} \text{ o wyrazach z } A \text{ t. że } x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x\}. \quad (12)$$

*Przykł.* Domykanie z lewej strony odcinka  $]0, 1]$ .

*Stwierdzenia.*

1.  $A \subset \bar{A}$ .
2. Jeśli  $A$  – domknięty to  $A = \bar{A}$ .
3.  $\bar{A}$  jest zbiorem domkniętym oraz  $\overline{\bar{A}} = \bar{A}$ .
4. Jeśli ciąg  $\{x_n\}$  dąży do granicy  $g$ :  $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} g$  i każdy jego wyraz  $x_n$  jest granicą ciągu elementów zbioru  $A$ , to  $g$  też jest granicą ciągu elementów ze zbioru  $A$ .

**Dow.** Punkt  $x_n$  jest granicą ciągu elementów ze zbioru  $A$ ; nazwijmy ten ciąg  $\{y_m\}$ . Mamy

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists M \in \mathbb{N} \quad \forall m > M : d(y_m, x_n) < \epsilon,$$

a więc

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists a \in A \quad d(a, x_n) < \epsilon$$

Weźmy teraz  $\epsilon = \frac{1}{n}$  i odpowiednio do tego  $a_n \in A$  tak, by zachodziło  $d(a_n, x_n) < \frac{1}{n}$ . Zachodzi:

$$0 \leq d(a_n, g) \leq d(a_n, x_n) + d(x_n, g) < \frac{1}{n} + d(x_n, g);$$

prawa strona dąży do zera gdy  $n \rightarrow \infty$  ( $\frac{1}{n}$  wiadomo, zaś  $d(x_n, g) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$  z założenia). Zatem również  $d(a_n, g) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ , a to znaczy, że  $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} g$ .

**CBDO**

Mamy następującą charakteryzację domknięcia.

*Stw.*

$$\bar{A} = \{x \in \mathbb{R}^N : \forall \epsilon > 0 \quad K(x, \epsilon) \cap A \neq \emptyset\}$$

(tzn. do domknięcia należą te punkty  $x$ , że przecięcie kuli o środku w  $x$  i dowolnie małym promieniu ze zbiorem  $A$  jest niepuste). (**RYS.**)

**Dow.** Oznaczmy prawą stronę równości przez  $B$ . Jeżeli  $x \in B$ , to biorąc  $\epsilon = \frac{1}{n}$  znajdziemy  $x_n \in K(x, \frac{1}{n}) \cap A$ . To znaczy, że  $x_n \in A$  oraz że  $d(x_n, x) < \frac{1}{n}$ , czyli  $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$ .

Pokazaliśmy w ten sposób, że  $B \subset \bar{A}$ .

Z drugiej strony, jeśli  $x \in \bar{A}$ , to w dowolnie małej kuli  $K(x, \epsilon)$  o środku w  $x$  zawarte są prawie wszystkie elementy ciągu  $\{x_n\}$  o wyrazach z  $A$  i granicy  $x$ . Spełniony jest więc warunek, że przecięcie tej kuli z  $A$  jest zbiorem niepustym, czyli że  $x \in B$ . Tak więc  $x \in \bar{A} \implies x \in B$ , czyli  $\bar{A} \subset B$ .

Oba te warunki znaczą, że  $\bar{A} = B$ .

**CBDO**

### 1.3.2 Zbiory otwarte

**Def.** Niech  $\mathcal{O} \subset \mathbb{R}^N$  oraz  $x \in \mathcal{O}$ . Mówimy, że  $x$  jest *punktem wewnętrznym* zbioru  $\mathcal{O}$  (lub, że  $\mathcal{O}$  jest *otoczeniem* punktu  $x$ ) jeśli istnieje  $\epsilon > 0$  takie, że  $K(x, \epsilon) \subset \mathcal{O}$ .

**Def.** Zbiór  $A$  nazywamy *zbiorem otwartym*, jeśli każdy element tego zbioru jest jego punktem wewnętrznym.

*Przykł.* zbiorów otwartych:

1.  $\mathbb{R}^N, \emptyset$  są zbiorami otwartymi.
2.  $K(x, r)$  ( $r > 0$ ) jest zbiorem otwartym.

**Dow.** Chcemy pokazać, że (**RYS.**)

$$\forall_{y \in K(x, r)} \exists_{\epsilon > 0} K(y, \epsilon) \subset K(x, r).$$

Bierzemy  $\epsilon = r - d(x, y) > 0$ . Dla dowolnego  $z \in K(y, \epsilon)$  mamy:

$$d(z, x) \leq d(z, y) + d(y, x) < \epsilon + d(y, x) = r$$

co znaczy, że  $z \in K(x, r)$ .

**CBDO**

*Stw.* Jeśli  $x$  jest punktem wewnętrznym  $\mathcal{O}$  i  $x$  jest granicą ciągu  $\{x_n\} : x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ , to prawie wszystkie wyrazy ciągu  $\{x_n\}$  należą do  $\mathcal{O}$ .

I na odwrót:

*Stw.* Niech  $x \in \mathbb{R}^N$  i  $\mathcal{O} \subset \mathbb{R}^N$ . Przypuśćmy, że dla dowolnego ciągu  $\{x_n\}$  elementów  $\mathbb{R}^N$  zachodzi:

$$\left( \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x \right) \implies \left( \text{prawie wszystkie wyrazy } x_n \in \mathcal{O} \right).$$

Wtedy  $x$  jest punktem wewnętrznym zbioru  $\mathcal{O}$ .

**Dow.** (nie wprost).

Założmy, że  $x$  nie jest punktem wewnętrznym zbioru  $\mathcal{O}$ , tzn.

$$\forall_{\epsilon > 0} K(x, \epsilon) \not\subset \mathcal{O}.$$

Bierzemy  $\epsilon = \frac{1}{n}$ . Mamy:  $K(x, \frac{1}{n}) \not\subset \mathcal{O}$ . Zatem istnieje taki ciąg  $\{x_n\}$ , że  $x_n \in K(x, \frac{1}{n})$  oraz  $x_n \notin \mathcal{O}$ . Skoro  $x_n$  należy do kuli  $K(x, \frac{1}{n})$ , to odległość między  $x$  a  $x_n$  jest mniejsza niż promień kuli:

$$0 < d(x, x_n) < \frac{1}{n},$$

a to znaczy, że ciąg  $\{x_n\}$  jest zbieżny do  $x$ :  $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$ .

W ten sposób otrzymaliśmy sprzeczność z założeniem (znaleźliśmy bowiem ciąg  $\{x_n\}$  dążący do  $x$ , którego wyrazy nie należą do  $\mathcal{O}$ ), więc nieprawdziwe jest zaprzeczenie tezy, czyli prawdziwa jest teza mówiąca, iż  $x$  jest punktem wewnętrznym  $\mathcal{O}$ .

**CBDO**

*Uwaga.* Otwartość i domkniętość *nie są* pojęciami przeciwstawnymi! Np. zbiór  $\mathbb{R}^N$  jest zarówno otwarty jak i domknięty.

*Uwaga.* Otwartość/domkniętość zbioru zależy też od tego, podzbiorem jakiego zbioru on jest. Np. jeśli rozpatrujemy  $A = ]0, 1[$  jako podzbiór  $\mathbb{R}$ , to kulami otwartymi w  $\mathbb{R}$  są odcinki (otwarte) i  $A$  jest otwarty. Jeśli natomiast rozpatrujemy  $A$  jako podzbiór  $\mathbb{R}^2$ , to kulami otwartymi w  $\mathbb{R}^2$  są koła (bez brzegu) i  $A$  nie jest już otwarty, bo żadne koło o niezerowym promieniu nie mieści się w  $A$ .

**Tw.** Niech  $\mathcal{O} \subset \mathbb{R}^N$  i  $A = \mathbb{R}^N \setminus \mathcal{O}$ . Wtedy ma miejsce równoważność

$$(\mathcal{O} \text{ jest otwarty}) \iff (A \text{ jest domknięty}). \quad (13)$$

**Dow.**  $\implies$  Weźmy zbieżny  $\{x_n\}$  o wyrazach należących do  $A$ :  $x_n \in A$ ,  $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$ . Chcemy pokazać, że  $x \in A$ .

Przypuśćmy, że przeciwnie:  $x \notin A$ . Wobec tego  $x \in \mathcal{O}$  (bo  $A$  i  $\mathcal{O}$  są rozłączne, a ich suma to całe  $\mathbb{R}^N$ ). Z założenia  $\mathcal{O}$  jest zbiorem otwartym, więc  $x$  jest punktem wewnętrznym  $\mathcal{O}$  i (p. poprzednie Stw.) prawie wszystkie wyrazy ciągu  $\{x_n\}$  należą do  $\mathcal{O}$ , więc nie należą do  $A$ . Otrzymaliśmy sprzeczność.

$\impliedby$  Niech  $x \in \mathcal{O}$ . Skoro tak to  $x \notin A = \overline{A}$ , a więc istnieje kula  $K(x, \epsilon)$  taka, że  $K(x, \epsilon) \cap A = \emptyset$ , a to znaczy, że  $K(x, \epsilon) \subset \mathcal{O}$ , więc  $x$  jest punktem wewnętrznym  $\mathcal{O}$ , czyli  $\mathcal{O}$  jest otwarty.

**CBDO**

*Wniosek.* Niech  $x \in \mathbb{R}^N$ ,  $A \subset \mathbb{R}^N$  i  $\mathcal{O} = \mathbb{R}^N \setminus A$ . Wtedy zachodzi jeden i tylko jeden z wykluczających się warunków:

1.  $x$  jest punktem wewnętrznym zbioru  $\mathcal{O}$ .
2.  $x \in \overline{A}$ .

**Dow.** Trzeba pokazać, że nieprawdą jest równoważność obydwu powyższych warunków, tzn: Nieprawda, że 1.  $\iff$  2.

Pokażemy najspierw że z zaprzeczenia 1. wynika 2.

Zaprzeczenie zdania: " $x$  jest punktem wewnętrznym  $\mathcal{O}$ " to jest to samo, co zaprzeczenie zdania: " $\exists_{\epsilon > 0} : K(x, \epsilon) \subset \mathcal{O}$ ", czyli: " $\forall_{\epsilon > 0} : K(x, \epsilon) \not\subset \mathcal{O}$ ". To zaś jest równoważne zdaniu: " $\forall_{\epsilon > 0} : K(x, \epsilon) \cap A \neq \emptyset$ ", a to znaczy, że  $x$  jest punktem domknięcia zbioru  $A$ , tzn.  $x \in \overline{A}$ .

To teraz że z zaprzeczenia 2. wynika 1.

Skoro  $x$  nie należy do domknięcia  $A$ , to  $x \in \mathcal{O}$  oraz że  $\exists_{\epsilon > 0} : K(x, \epsilon) \cap A = \emptyset$ , a to znaczy, że  $K(x, \epsilon) \subset \mathcal{O}$ , tzn.  $x$  jest punktem wewnętrznym  $\mathcal{O}$ .

**CBDO**

**Tw.**

1.  $\mathbb{R}^N$  i  $\emptyset$  są zbiorami otwartymi.
2. Jeśli  $(\mathcal{O}_\alpha)_{\alpha \in \mathcal{A}}$  ( $\mathcal{A}$  – dowolny zbiór wskaźników) jest rodziną zbiorów otwartych, to  $\bigcup_{\alpha \in \mathcal{A}} \mathcal{O}_\alpha$  też jest zbiorem otwartym.
3. Jeżeli  $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2$  są otwarte, to  $\mathcal{O}_1 \cap \mathcal{O}_2$  jest otwarty.

**Dow.**

1. Było



2. Niech  $x \in \bigcup_{\alpha \in \mathcal{A}} \mathcal{O}_\alpha$ . Istnieje więc  $\alpha_0 \in \mathcal{A}$  takie, że  $x \in \mathcal{O}_{\alpha_0}$ . Ponieważ  $\mathcal{O}_{\alpha_0}$  – otwarty, więc istnieje kula o niezerowym promieniu, zawarta w  $\mathcal{O}_{\alpha_0}$ :

$$\exists_{\epsilon > 0} : K(x, \epsilon) \subset \mathcal{O}_{\alpha_0} \subset \bigcup_{\alpha \in \mathcal{A}} \mathcal{O}_\alpha,$$

czyli  $\bigcup_{\alpha \in \mathcal{A}} \mathcal{O}_\alpha$  jest zbiorem otwartym.

3. Niech  $x \in \mathcal{O}_1 \cap \mathcal{O}_2$ , tzn.  $x \in \mathcal{O}_1$  i  $x \in \mathcal{O}_2$ . Tak więc

$$\exists_{\epsilon_1 > 0} : K(x, \epsilon_1) \subset \mathcal{O}_1 \quad \text{i} \quad \exists_{\epsilon_2 > 0} : K(x, \epsilon_2) \subset \mathcal{O}_2.$$

Bierzemy  $\epsilon = \min(\epsilon_1, \epsilon_2) > 0$  i wtedy mamy

$$K(x, \epsilon) \subset K(x, \epsilon_1) \subset \mathcal{O}_1 \quad \text{i} \quad K(x, \epsilon) \subset K(x, \epsilon_2) \subset \mathcal{O}_2,$$

zatem  $K(x, \epsilon) \subset \mathcal{O}_1 \cap \mathcal{O}_2$ , czyli  $\mathcal{O}_1 \cap \mathcal{O}_2$  jest zbiorem otwartym. *Uwaga.* Przez indukcję dowodzi się, że powyższa własność zachodzi dla dowolnej *skończonej* ilości zbiorów: Dla dowolnego  $n \in \mathbb{N}$ , jeśli  $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2, \dots, \mathcal{O}_n$  są otwarte, to również  $\mathcal{O}_1 \cap \mathcal{O}_2 \cap \dots \cap \mathcal{O}_n$  jest otwarty. Własność ta *nie jest* prawdziwa dla rodzin nieskończonych: Weźmy np. rodzinę zbiorów otwartych  $A_n = ] - \frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n} [$ ; mamy:  $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = [0, 1]$ , co nie jest zbiorem otwartym.

CBDO

*Uwaga – stw.* Każdy zbiór otwarty  $\mathcal{O}$  jest sumą pewnej rodziny zbiorów otwartych.

**Dow.** Niech  $x \in \mathcal{O}$ ; wobec tego  $x \in \mathcal{O}_x$ , gdzie  $\mathcal{O}_x$  jest pewną kulą o środku w punkcie  $x$ , taką, że  $\mathcal{O}_x \subset \mathcal{O}$ . Mamy następujące zawierania:

$$\mathcal{O} \subset \bigcup_{x \in \mathcal{O}} \mathcal{O}_x \subset \mathcal{O},$$

skąd wynika, że  $\bigcup_{x \in \mathcal{O}} \mathcal{O}_x = \mathcal{O}$ .

CBDO

### 1.3.3 Niektóre dalsze własności zbiorów domkniętych.

Dopełnienie zbioru, przypomnienie własności dopełnienia.

Zbiory domknięte mają własności, powiązane z powyższymi własnościami zbiorów otwartych:

1.  $\mathbb{R}^N, \emptyset$  są zbiorami domkniętymi.
2. Jeśli  $A_1, A_2$  – zbiory domknięte, to  $A_1 \cup A_2$  też jest zbiorem domkniętym. Z indukcji, zachodzi to też dla dowolnej *skończonej* sumy mnogościowej: Jeśli  $A_1, A_2, \dots, A_n$  są zbiorami domkniętymi, to  $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$  też jest zbiorem domkniętym dla dowolnego  $n$ .

3. Natomiast przecięcie *dowolnej rodziny* (skończonej czy nieskończonej) zbiorów domkniętych jest zbiorem domkniętym: Jeśli  $\{A_\alpha\}$ ,  $\alpha \in \mathcal{A}$  jest rodziną zbiorów domkniętych, to również  $\bigcup_{\alpha \in \mathcal{A}} A_\alpha$  też jest zbiorem domkniętym.

**Dow.**

- $\mathbb{R}^N$  jest domknięty, bo  $\mathbb{R}^N \setminus \mathbb{R}^N = \emptyset$  jest otwarty.  
 $\emptyset$  jest domknięty, bo  $\mathbb{R}^N \setminus \emptyset = \mathbb{R}^N$  jest otwarty.
- Jeśli  $A_1, A_2$  – domknięte, to  $A'_1, A'_2$  – otwarte; zatem (było)  $A'_1 \cap A'_2$  – otwarty, a że  $A'_1 \cap A'_2 = (A_1 \cup A_2)'$ , więc  $(A_1 \cup A_2)'$  – otwarty, a to znaczy że  $A_1 \cup A_2$  – domknięty.  
*Uwaga:* Własność ta *nie jest* słuszna dla sum nieskończonych: Jako przykład weźmy  $A_n = [\frac{1}{n}, 1]$ . Każdy zbiór  $A_n$  jest domknięty, a ich suma  $\bigcup_{n=1}^{\infty} ]0, 1]$  *nie jest* zbiorem domkniętym.

- Jeśli  $A_\alpha$  jest domknięty to  $\mathbb{R}^N \setminus A_\alpha$  jest otwarty. Suma dowolnej ilości zbiorów otwartych jest otwarta (własność 3. zb. otwartych), wobec tego:  $\bigcup_{\alpha \in \mathcal{A}} (\mathbb{R}^N \setminus A_\alpha) = \bigcup_{\alpha \in \mathcal{A}} A'_\alpha$  jest otwarty. Ale mamy:  $A' \cup B' = (A \cap B)'$  dla dowolnych zbiorów  $A$  i  $B$ ,  
 $(A' - \text{dopełnienie } A, \text{ tzn. } \mathbb{R}^N \setminus A)$  i również:  $\bigcup_{\alpha \in \mathcal{A}} A'_\alpha = \left( \bigcap_{\alpha \in \mathcal{A}} A_\alpha \right)'$ . A mamy jeszcze dla dowolnych zbiorów  $X, Y$ :  $X \setminus Y = X \cap Y'$ , zatem  $\left( \bigcap_{\alpha \in \mathcal{A}} A_\alpha \right)' = \mathbb{R}^N \setminus \left( \bigcap_{\alpha \in \mathcal{A}} A_\alpha \right)$ .  
 Tak więc  $\mathbb{R}^N \setminus \left( \bigcap_{\alpha \in \mathcal{A}} A_\alpha \right)$  jest otwarty, zatem  $\bigcap_{\alpha \in \mathcal{A}} A_\alpha$  jest *domknięty*.

**CBDO**

### 1.3.4 Zbiory zwarte

**Def.** Niech  $K \subset \mathbb{R}^N$ . Mówimy, że  $K$  jest *zwarty*, jeśli z dowolnego ciągu elementów zbioru  $K$  można wybrać podciąg zbieżny do elementu zbioru  $K$ .

**Tw.** Niech  $K \subset \mathbb{R}^N$ . Wtedy:

$$(K \text{ jest zwarty} ) \iff (K \text{ jest domknięty i ograniczony} ).$$

**Dow.**  $\Leftarrow$  Na mocy twierdzenia Bolzano-Weierstrassa, z dowolnego ciągu ograniczonego można wybrać podciąg zbieżny. Granica tego ciągu musi być w  $K$ , bo  $K$  – domknięty.

$\Rightarrow$  Załóżmy, że  $K$  jest zwarty. Bierzemy ciąg elementów z  $K$  zbieżny do  $x \in \mathbb{R}^N$ . Granicą dowolnego podciągu jest ten sam punkt  $x$ . Zatem (z zał. i z definicji zb. zwartego)  $x \in K$ . To pokazuje, że  $K$  jest domknięty.

Przypuśćmy teraz, że zbiór  $K$  nie jest ograniczony. Wtedy istnieje ciąg  $\{x_n\}$  elementów zbioru  $K$  taki, że  $d(0, x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty$ . Tak też jest dla dowolnego podciągu ciągu  $\{x_n\}$ . Ale taki podciąg nie może być zbieżny.

**CBDO**

**Przykł.**  $]0, 1[ \subset \mathbb{R}^1$  nie jest zwarty;  $\mathbb{R}^1 \subset \mathbb{R}^1$  nie jest zwarty;  $[0, 1] \subset \mathbb{R}^1$  jest zwarty.

## 2 Odwzorowania

Pojęcie *odwzorowania* pomiędzy dwoma zbiorami było już definiowane, ale dawno, więc nie od rzeczy będzie przypomnieć, że odwzorowaniem nazywamy sposób przyporządkowania (niekoniecznie każdemu) elementowi  $x \in X$  elementu  $y \in Y$ . Zapisujemy to:  $T : X \rightarrow Y$ , Dalej  $X$  będzie podzbiorem  $\mathbb{R}^N$ , zaś  $Y$  podzbiorem  $\mathbb{R}^M$ .

**RYS.**

Założmy, że mamy jakieś układy współrzędnych w  $\mathbb{R}^N$  i  $\mathbb{R}^M$ , tak że dowolny punkt  $x \in X$  ma postać:

$$x = (x^j), \quad j = 1, 2, \dots, N.$$

i analogicznie w  $Y$

$$y = (y^k), \quad k = 1, 2, \dots, M.$$

$$(Tx)^k = T^k(x^1, x^2, \dots, x^N) \quad k = 1, 2, \dots, M$$

Na odwzorowanie możemy patrzeć po prostu jak na układ  $M$  funkcji  $N$  zmiennych.

*Przykł.*

1.  $R \rightarrow \mathbb{R}^3$  – krzywa w  $\mathbb{R}^3$ .
2.  $\mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ : Zamiana układu współrzędnych; pole wektorowe.

### 2.1 Definicja odwzorowania ciągłego i niektóre przykłady

**Def.** Niech  $X \subset \mathbb{R}^N$ ,  $Y \subset \mathbb{R}^M$ , oraz niech będzie dane odwzorowanie  $T : X \rightarrow Y$ .

Mówimy, że odwzorowanie  $T$  jest *ciągłe*, jeśli dla dowolnego ciągu  $\{x_n\}$  elementów zbioru  $X$  zbieżnego do punktu  $g \in X$  mamy

$$T(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} T(g). \quad (14)$$

*Uwaga:* Przypominając sobie definicję zbieżności ciągu widzimy, że odwzorowanie  $T$  jest ciągłe wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie funkcje  $T^k$  ( $k = 1, 2, \dots, M$ ) są ciągłe.

*Przykłady* odwzorowań ciągłych. Tu:  $X \subset \mathbb{R}^N$ ,  $Y \subset \mathbb{R}^M$ ,  $T : X \rightarrow Y$ .

1. Odwzorowanie stałe: Dla każdego  $x \in X$ :  $T(x) = y_0 = \text{const.}$  **RYS.**
2. Tu niech  $N = M$ . Określamy *odwzorowanie identycznościowe* wzorem:  $T(x) = x$ ;  $T$  często też oznaczamy symbolem  $Id_X$ .
3. Niech Tu:  $X \subset \mathbb{R}^N$ ,  $Y \subset \mathbb{R}^M$ ,  $Z \subset \mathbb{R}^k$  oraz  $T : X \rightarrow Y$ ,  $S : Y \rightarrow Z$ . Oznaczamy:  $(S \circ T)(x) = S(T(x))$ , czyli  $S \circ T : X \rightarrow Z$ .

**RYS.**

Odwzorowanie  $S \circ T$  nazywamy *superpozycją* lub *złożeniem* odwzorowań  $S$  oraz  $T$ .

**Tw.** Jeśli  $S$  i  $T$  są odwzorowaniami ciągłymi, to  $S \circ T$  też jest odwzorowaniem ciągłym.

**Dow.** (podobny jak w  $\mathbb{R}^1$ ): Niech  $\{x_n\}$  będzie ciągiem elementów z  $X$ :  $x_n \in X$  oraz  $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} g \in X$ .

Ponieważ  $T$  – ciągłe, więc  $T(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} T(g)$ .

Oraz:

Ponieważ  $X$  – ciągłe, więc  $S(T(x_n)) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} S(T(g))$ .

Zatem  $(S \circ T)(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} (S \circ T)(g)$ .

CBDO

4.  $+$  :  $\mathbb{R}^2 \ni (x, y) \rightarrow x + y \in \mathbb{R}$  (dodawanie liczb rzeczywistych) jest odwzorowaniem ciągłym.

**Dow.** Jest to po prostu twierdzenie, że granica sumy dwóch ciągów zbieżnych jest sumą granic.

CBDO

5.  $\cdot$  :  $\mathbb{R}^2 \ni (x, y) \rightarrow x \cdot y \in \mathbb{R}$  (mnożenie liczb rzeczywistych) jest odwzorowaniem ciągłym.

**Dow.** Granica iloczynu dwóch ciągów zbieżnych jest iloczynem granic.

CBDO

6.  $:$  :  $(\mathbb{R} \times \mathbb{R} \setminus \{0\}) \ni (x, y) \rightarrow x : y \in \mathbb{R}$  (dzielenie liczb rzeczywistych) jest odwzorowaniem ciągłym.

**Dow.** Granica ilorazu dwóch ciągów zbieżnych jest ilorazem granic.

CBDO

7. Funkcja dwóch zmiennych co *nie jest* ciągła:

$$f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2} \text{ poza } (0, 0) \text{ oraz } f(0, 0) = 0.$$

**Def.** Jeśli  $A \subset Y$ , to zbiór:

$$T^{-1}(A) = \{x \in X : T(x) = A\} \quad (15)$$

nazywamy *przeciwbrazem* zbioru  $A$  przy odwzorowaniu  $T$ .

*Przykł.*  $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $T(x, y) = x^2 + y^2$ ;  $T^{-1}(1) = \dots$ ,  $T^{-1}(1) = \dots$ ,  $T^{-1}(0) = (0, 0)$ ,  $T^{-1}(-1) = \emptyset$ ,  $T^{-1}([1, 2]) = \dots$

*Uwaga.* Pojawiający się wyżej symbol  $T^{-1}$  *nie oznacza*, że  $T$  jest odwracalne! Powyższy zapis należy odczytywać *łącznie*.

**Def.** (\*) Niech  $X \subset \mathbb{R}^N$ ,  $\mathcal{O} \subset X$ .

Mówimy, że  $\mathcal{O}$  jest *otwarty* w  $X$ , jeżeli istnieje zbiór otwarty  $\mathcal{O}'$  w  $\mathbb{R}^N$  taki, że  $\mathcal{O} = X \cap \mathcal{O}'$ .

**RYS.**

## 2.2 Inna charakteryzacja odwzorowań ciągłych

**Tw.** Niech  $T : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^M$ . Wówczas

$T$  jest ciągłe wtedy i tylko wtedy, gdy przeciwbrazy wszystkich zbiorów otwartych w  $\mathbb{R}^M$  są otwarte w  $\mathbb{R}^N$ .

**Dow.** Przypuśćmy, że  $T$  jest ciągłe na  $X = \mathbb{R}^N$ . Niech  $V$  będzie zbiorem otwartym w  $Y = \mathbb{R}^M$ . Trzeba pokazać, że każdy punkt zbioru  $T^{-1}(V)$  jest jego punktem wewnętrznym. Załóżmy, że  $p \in X$ ,  $T(p) \in V$ . Ponieważ  $V$  jest otwarty, więc istnieje  $\epsilon > 0$  takie, że  $y \in V$ ,

jeśli  $d_Y(T(p), y) < \epsilon$ ; a ponieważ  $T$  jest ciągle w punkcie  $p$ , więc istnieje  $\delta > 0$  takie, że  $d_Y(T(x), T(p)) < \epsilon$ , jeśli  $d_X(x, p) < \delta$ . W ten sposób  $x \in T^{-1}(V)$ , jeśli tylko  $d_X(x, p) < \delta$ .

W drugą stronę: Przypuśćmy, że zbiór  $T^{-1}(V)$  jest otwarty w  $X$  dla dowolnego zbioru otwartego  $V$  w  $Y$ . Weźmy  $p \in X$  i  $\epsilon > 0$ ; i niech  $V$  będzie zbiorem wszystkich  $y \in Y$  takich, że  $d_Y(y, T(p)) < \epsilon$ . Wtedy  $V$  jest otwarty i dlatego  $T^{-1}(V)$  jest otwarty. Skoro tak, to istnieje  $\delta > 0$  takie, że  $x \in T^{-1}(V)$ , jeśli tylko  $d_X(p, x) < \delta$ . Ale jeśli  $x \in T^{-1}(V)$ , to  $T(x) \in V$ , ponieważ  $d_Y(f(x), f(p)) < \epsilon$ .

CBDO

### 2.3 Jeszcze inna charakteryzacja odwzorowań ciągłych

Poniższa charakteryzacja odwzorowań ciągłych jest bezpośrednim analogonem charakteryzacji Cauchy'ego funkcji ciągłej w  $\mathbb{R}^1$ . **Tw.**

$$(T \text{ ciągłe na } X) \iff \left( \forall_{x \in X} \forall_{\epsilon > 0} \exists_{\delta > 0} \forall_{y \in X} (d(x, y) < \delta) \implies d(T(x), T(y)) < \epsilon \right) \quad (16)$$

**Dow.**

$\implies$

Założmy, że teza tw. powyżej jest nieprawdziwa, tzn.

$$\exists_{x \in X} \exists_{\epsilon > 0} \forall_{\delta > 0} \exists_{y \in X} (d(x, y) < \delta) \text{ i } d(T(x), T(y)) \geq \epsilon.$$

Wyberzmy  $\delta = \frac{1}{n}$ . Istnieje więc taki ciąg  $\{y_n\}$ , że

$$d(x, y_n) < \frac{1}{n} \quad (*)$$

$$d(T(x), T(y_n)) \geq \epsilon \quad (**)$$

Z (\*) wynika, że  $y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$ ,

natomiast z (\*\*) wynika, że  $T(y_n) \not\xrightarrow{n \rightarrow \infty} T(x)$ , co jest sprzeczne z założeniem, że  $T$  jest ciągłe.

$\implies$

Niech  $x_n, x \in X$ , oraz  $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$ .

Weźmy  $\epsilon > 0$ . Z założenia,

$$\exists_{\delta > 0} \forall_{y \in X} (d(x, y) < \delta) \implies d(T(x), T(y)) < \epsilon.$$

Ponieważ  $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$ , to dla prawie wszystkich  $n$  zachodzi:

$$d(x, x_n) < \delta \text{ oraz } d(T(x), T(x_n)) < \epsilon$$

a ta ostatnia nierówność mówi, że  $T(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} T(x)$ , a to znaczy, że  $T$  jest ciągłe.

CBDO

**Tw.** (nazwane w notatkach 'sakramentalnym'; na pewno jest FUNDAMENTALNE).

Niech  $K \subset \mathbb{R}^N$  – zwarty, oraz niech  $f : K \rightarrow \mathbb{R}$  – funkcja ciągła. Wtedy:

1.  $f$  jest ograniczona.

2.  $f$  osiąga swoje kresy, tzn.:

$$\exists_{x_{min}, x_{max} \in K} \forall_{x \in K} f(x_{min}) \leq f(x) \leq f(x_{max}) \quad (17)$$

3.  $f$  jest jednostajnie ciągła.

**Dow.**

1. Przypuśćmy, że  $f$  nie jest ograniczona. Wtedy istnieje  $\{x_n\}$ ,  $x_n \in K$  taki, że

$$f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \infty \quad (\bullet)$$

Ponieważ  $K$  jest zwarty, więc ciąg  $\{x_n\}$  posiada podciąg zbieżny  $\{y_n\} : y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} g \in K$ . Ale  $f$  jest ciągła, więc

$$f(y_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(g)$$

co stanowi sprzeczność z  $(\bullet)$ .

**CBDO**

2. Niech  $\mathcal{W} \subset \mathbb{R}$  będzie zbiorem wartości funkcji  $f$  na  $K$ :  $\mathcal{W} = \{f(x) : x \in K\}$ . Niech  $M$  będzie kresem górnym zbioru wartości funkcji na  $K$ :  $M = \sup \mathcal{W}$ . Kres górny należy do domknięcia zbioru:  $M \in \overline{\mathcal{W}}$ .  $\overline{\mathcal{W}}$  jest domknięty, więc istnieje ciąg  $\{x_n\}$  o wyrazach z  $K$  taki, że  $f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} M$ .  $K$  jest zwarty, więc domknięty, więc istnieje podciąg  $\{x_{n_m}\}$  ciągu  $\{x_n\}$ , który to podciąg jest zbieżny do granicy należącej do  $K$ :

$$f\left(\underbrace{\lim_{m \rightarrow \infty} x_{n_m}}_{x_{max}}\right) = \lim_{m \rightarrow \infty} f(x_{n_m}) = M.$$

**CBDO**

3. Przypomnijmy sobie, co to znaczy, że funkcja od argumentu rzeczywistego jest jednostajnie ciągła. Dla odwzorowania definicja jest analogiczna:

**Def.**

$$(T \text{ jednostajnie ciągła na } X) \iff \left( \forall_{\epsilon > 0} \exists_{\delta > 0} \forall_{x, y \in X} (d(x, y) < \delta) \implies d(T(x), T(y)) < \epsilon \right) \quad (18)$$

Teraz

**Dow.** Przypuśćmy, że  $f$  nie jest jednostajnie ciągła, tzn.

$$\exists_{\epsilon > 0} \forall_{\delta > 0} \exists_{x, y \in X} (d(x, y) < \delta) \implies d(T(x), T(y)) \geq \epsilon.$$

Weźmy  $\delta = \frac{1}{n}$  i ciągi  $\{x_n\}$ ,  $\{y_n\}$  o wyrazach z  $X$  takie, że

$$\begin{aligned} d(x_n, y_n) &< \frac{1}{n} \\ d(f(x_n), f(y_n)) &\geq \epsilon. \quad (\bullet\bullet) \end{aligned}$$

$K$  jest zwarty, więc można założyć, że  $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x_\infty \in K$ .

Mamy:

$$d(y_n, x_\infty) \leq d(y_n, x_n) + d(x_n, x_\infty) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Mamy więc:  $y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x_\infty$ ; oraz z ciągłości  $f$ :

$$\left. \begin{array}{l} f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x_\infty) \\ f(y_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x_\infty) \end{array} \right\} \implies d(f(x_n), f(y_n)) < \epsilon.$$

Ale ostatnia nierówność jest sprzeczna z (●●).

**CBDO**

### 3 Rachunek różniczkowy

#### 3.1 Pochodne cząstkowe, różniczkowalność funkcji, przyrosty

Niech  $\mathcal{O} \subset \mathbb{R}^N$  będzie zbiorem otwartym, zaś  $f : \mathcal{O} \rightarrow \mathbb{R}$  – funkcją ciągłą.

Niech  $x \in \mathcal{O}$ . Wypiszmy jawnie składowe  $x$ :

$$x = (x^1, x^2, \dots, x^N), \quad f(x) = f(x^1, x^2, \dots, x^N).$$

Wybermy teraz  $k \in \{1, 2, \dots, N\}$  i traktujmy zmienne  $x^l$ , gdzie  $l \neq k$  jako stałe.

Rozważmy granicę:

$$\frac{\partial}{\partial x^k} f(x^1, x^2, \dots, x^N) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x^1, \dots, x^{k-1}, x^k + h, x^{k+1}, \dots, x^N) - f(x^1, \dots, x^k, \dots, x^N)}{h} \quad (19)$$

**Def.** Powyższą granicę nazywamy *pochodną cząstkową* funkcji  $f$  po zmiennej  $x^k$  (liczoną w punkcie  $x$ ).

**Def.** Niech  $\mathcal{O} \subset \mathbb{R}^N$  będzie zbiorem otwartym, zaś  $f : \mathcal{O} \rightarrow \mathbb{R}$  – funkcją ciągłą. (Ten ostatni warunek piszemy też:  $f \in C(\mathcal{O})$ ).

Mówimy, że  $f$  jest różniczkowalna  $r$  razy w sposób ciągły, jeżeli istnieją wszystkie pochodne cząstkowe aż do rzędu  $r$  i są one ciągłe.

*Uwaga. (terminologiczna)* Ten ostatni warunek zapisujemy krócej jako:  $f \in C^r(\mathcal{O})$ , gdzie przez  $C^r(\mathcal{O})$  oznaczamy zbiór funkcji różniczkowalnych  $r$  razy w sposób ciągły. Stosujemy też oznaczenie  $C^\infty(\mathcal{O})$  dla funkcji, które posiadają pochodne ciągłe dowolnie wysokiego rzędu. Funkcje takie nazywamy *funkcjami gładkimi* (należą do nich np. wielomiany).

**Tw.** Niech  $\mathcal{O}$  – otwarty podzbiór  $\mathbb{R}^N$ , oraz  $f \in C^1(\mathcal{O})$ . Niech  $x_0 \in \mathcal{O}$ , i niech  $h \in \mathbb{R}^N$  – dostatecznie małe, tzn.  $\|h\| < \epsilon$  dla pewnego  $\epsilon$  – tak, by  $x_0 + h \in \mathcal{O}$  **RYS.**

Zdefiniujmy  $r(x_0, h)$  przez:

$$f(x_0 + h) - f(x_0) = \sum_{k=1}^N \frac{\partial f}{\partial x^k}(x_0) h^k + r(x_0, h).$$

Wtedy zachodzi:

$$\frac{r(x_0, h)}{\|h\|} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0 \quad (20)$$

*Uwaga.* Znaczenie tego wzoru: Pozwala on wyznaczać przyrost funkcji: Im mniejsze  $h$ , tym lepiej przyrost jest przybliżany przez część liniową.

**Dow.** Będzie dla (najważniejszego w zastosowaniach) przypadku  $N = 3$ ; dla dowolnego  $N$  jest analogiczny.

$$\begin{aligned} f(x_0 + h) - f(x_0) &= f(x_0^1 + h^1, x_0^2 + h^2, x_0^3 + h^3) - f(x_0^1, x_0^2, x_0^3) = \\ &= f(x_0^1 + h^1, x_0^2 + h^2, x_0^3 + h^3) - f(x_0^1, x_0^2 + h^2, x_0^3 + h^3) \quad I \\ &\quad + f(x_0^1, x_0^2 + h^2, x_0^3 + h^3) - f(x_0^1, x_0^2, x_0^3 + h^3) \quad II \\ &\quad + f(x_0^1, x_0^2, x_0^3 + h^3) - f(x_0^1, x_0^2, x_0^3) \quad III \end{aligned}$$

Z twierdzenia Lagrange'a o wartości średniej dla funkcji jednej zmiennej mamy

$$III = \frac{\partial}{\partial x^3} f(x_0^1, x_0^2, y^3) h^3,$$



gdzie  $y^3$  – punkt pomiędzy  $x_0^3$  a  $x_0^3 + h^3$ ;

$$II = \frac{\partial}{\partial x^2} f(x_0^1, y^2, x_0^3 + h^3) h^2, \quad y^2 \in ]x_0^2, x_0^2 + h^2[;$$

$$I = \frac{\partial}{\partial x^1} f(y^1, x_0^2 + h^2, x_0^3 + h^3) h^1, \quad y^1 \in ]x_0^1, x_0^1 + h^1[.$$

Tak więc

$$\begin{aligned} r(x_0, h) &= f(x_0 + h) - f(x_0) - \frac{\partial f}{\partial x^1}(x_0) h^1 - \frac{\partial f}{\partial x^2}(x_0) h^2 - \frac{\partial f}{\partial x^3}(x_0) h^3 \\ &= \left[ \frac{\partial}{\partial x^1} f(y^1, x_0^2 + h^2, x_0^3 + h^3) - \frac{\partial}{\partial x^1} f(x_0^1, x_0^2, x_0^3) \right] h^1 \\ &\quad + \left[ \frac{\partial}{\partial x^2} f(x_0^1, y^2, x_0^3 + h^3) - \frac{\partial}{\partial x^2} f(x_0^1, x_0^2, x_0^3) \right] h^2 \\ &\quad + \left[ \frac{\partial}{\partial x^3} f(x_0^1, x_0^2, y^3) - \frac{\partial}{\partial x^3} f(x_0^1, x_0^2, x_0^3) \right] h^3 \end{aligned} \quad (21)$$

Składowe wektora  $h$  szacują się przez:

$$\frac{|h^k|}{\|h\|} \leq 1.$$

Ponadto, jeżeli  $h \rightarrow 0$ , to:

$$y^1 \rightarrow x^1; \quad y^2 \rightarrow x^2; \quad y^3 \rightarrow x^3.$$

Ponieważ pochodne cząstkowe są ciągłe, to różnice w (21) dążą do zera i mamy

$$\frac{r(x_0, h)}{\|h\|} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0.$$

**CBDO**

### 3.2 Pochodna funkcji złożonej

Usystematyzujemy oznaczenia, przydając im, jeśli trzeba, dodatkowe jeszcze wyjaśnienia:

1.  $h = \Delta x$  – przyrost zmiennej (-ych);
2.  $f(x + h) - f(x) = \Delta f$  – przyrost funkcji;
3.  $\sum_{k=1}^N \frac{\partial f}{\partial x^k}(x_0) h^k = \mathbf{d}f$  – różniczka funkcji;
4.  $r$  – reszta.

Pamiętajmy, że wszystkie powyższe obiekty:  $\Delta x, \Delta f, \mathbf{d}f, r$  są funkcjami od  $x$  i  $h$ .

Mamy też:

$$\Delta f = \mathbf{d}f + r;$$

im mniejsze  $h$ , tym mniejsze  $r$  i w wielu zastosowaniach fizycznych na ogół przyjmuje się, że dla małych  $h$ ,  $r$  jest zaniedbywalny.

**Tw.** (Prototyp twierdzenia o pochodnej odwzorowania złożonego) Niech  $g : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{O}$ , gdzie  $\mathcal{U} \subset \mathbb{R}$ ,  $\mathcal{O} \subset \mathbb{R}^N$ , oraz  $f : \mathcal{O} \rightarrow \mathbb{R}$ . (Pisząc jawnie argumenty, mamy:  $f(y^1, y^2, \dots, y^N)$  oraz  $g(x) = (g^1(x), g^2(x), \dots, g^N(x))$ ). Niech  $k = f \circ g$ , tzn.  $k(x) = f(g(x))$  lub, pisząc bardziej jawnie, ale też bardziej rozwlekłe argumenty:  $k(x) = f(g^1(x), g^2(x), \dots, g^N(x))$ .

Jeżeli  $f \in C^1(\mathcal{O})$ ,  $g \in C^1(\mathcal{U})$ , to  $k \in C^1(\mathcal{U})$  oraz

$$\frac{d}{dx}k(x) = \sum_{i=1}^N \frac{\partial f}{\partial y^i}(g(x)) \frac{dg^i}{dx}(x). \quad (22)$$

**Dow.** Liczymy iloraz różnicowy:

$$\frac{k(x+h) - k(x)}{h} = \frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{h} = \spadesuit$$

(tu  $h \in \mathbb{R}$ ). Oznaczmy:  $\Delta y = g(x+h) - g(x)$  (tzn.  $\Delta y^i = g^i(x+h) - g^i(x)$ ).

$$\begin{aligned} \spadesuit &= \frac{f(g(x) + \Delta y) - f(g(x))}{h} = \frac{\sum_{i=1}^N \frac{\partial f}{\partial y^i}(g(x)) \Delta y^i + r(g(x), \Delta y)}{h} \\ &= \frac{\sum_{i=1}^N \frac{\partial f}{\partial y^i}(g(x)) \Delta y^i}{h} + \frac{r(g(x), \Delta y)}{h} \end{aligned} \quad (23)$$

Pierwszy wyraz w powyższym wyrażeniu (23) to jest to co trzeba, ponieważ

$$\frac{\Delta y^i}{h} = \frac{g^i(x+h) - g^i(x)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} \frac{\partial g^i}{\partial x}(x)$$

Natomiast drugi wyraz w wyrażeniu (23) okazuje się, że dąży do 0 gdy  $h \rightarrow 0$ . Bowiemy, gdy  $\Delta y = 0$ , to  $\frac{r(g(x), \Delta y)}{h} = 0$ . Natomiast gdy  $\Delta y \neq 0$ , to mamy:

$$\frac{r(g(x), \Delta y)}{h} = \frac{r(g(x), \Delta y)}{\|\Delta y\|} \cdot \frac{\|\Delta y\|}{h}$$

W pierwszym czynniku mamy:  $\Delta y \xrightarrow{h \rightarrow 0}$  i co za tym idzie, cały wyraz też dąży do zera (z własności reszty). Drugi czynnik, tzn. iloraz  $\frac{\|\Delta y\|}{h}$ , spełnia:

$$\frac{\|\Delta y\|}{h} = \left\| \frac{\Delta y}{h} \right\| \xrightarrow{h \rightarrow 0} \left\| \frac{dg}{dx} \right\|$$

**CBDO**

Będziemy dalej potrzebować dwu prostych faktów dotyczących normy i odległości.

*Stw.* Norma jest funkcją ciągłą swoich argumentów (tzn. składowych wektora).

**Dow.** Przyjrzyjmy się wyrażeniu na normę wektora  $x$ :

$$\|x\| = \sqrt{(x^1)^2 + (x^2)^2 + \dots + (x^N)^2}$$

i mamy:

1. podnoszenie do kwadratu jest funkcją ciągłą,

2. sumowanie jest funkcją ciągłą,

3. pierwiastek jest funkcją ciągłą.

*Stw.* Odległość jest funkcją ciągłą, tzn. jeżeli  $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$ ,  $y_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} y$ , to

$$d(x_n, y_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} d(x, y). \quad (24)$$

**Dow.** Najspierw pokażemy następującą *nierówność czworoboku*:

$$d(x, u) \leq d(x, y) + d(y, z) + d(z, u);$$

bowiem, pisząc dwukrotnie nierówność trójkąta, mamy:

$$d(x, u) \leq d(x, z) + d(z, u) \leq d(x, z) + d(z, y) + d(y, u)$$

(szkoda tu pisać **CBDO**) i teraz, korzystając dwukrotnie z nierówności czworoboku:

$$d(x_n, y_n) \leq d(x_n, x) + d(x, y) + d(y, y_n) \implies d(x_n, y_n) - d(x, y) \leq d(x_n, x) + d(y, y_n);$$

$$d(x, y) \leq d(x, x_n) + d(x_n, y_n) + d(y_n, y) \implies d(x, y) - d(x_n, y_n) \leq d(x, x_n) + d(y_n, y);$$

czyli mamy

$$0 \leq |d(x, y) - d(x_n, y_n)| \leq d(x, x_n) + d(y_n, y);$$

Prawa strona powyższej nierówności z założenia dąży do zera, a z tego wynika (24).

**CBDO**

### 3.3 Równość drugich pochodnych mieszanych

**Tw.** (o równości drugich pochodnych mieszanych). Niech  $\mathcal{O} \subset \mathbb{R}^2$  – zbiór otwarty. Niech  $f : \mathcal{O} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f \in C^2(\mathcal{O})$ . Wtedy:

$$\frac{\partial}{\partial x^1} \frac{\partial f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x^2} \frac{\partial f}{\partial x^1} \quad (25)$$

**Dow.** Najspierw oznaczmy  $x$  zamiast  $x^1$  oraz  $y$  zamiast  $x^2$ .

Oznaczmy:

$$\Delta x = h, \quad \Delta y = k$$

oraz

$$w = f(x + h, y + k) - f(x + h, y) - f(x, y + k) + f(x, y)$$

Ustalmy teraz  $x$  i  $h$  i zdefiniujmy

$$\phi(y) = f(x + h, y) - f(x, y)$$

Możemy wyrazić  $w$  przez  $\phi$ :

$$w = \phi(y + k) - \phi(y) = \phi'(\xi) \cdot k$$

gdzie  $\xi \in ]y, y + k[$ ; jest to wniosek z tw. Lagrange'a o wartości średniej. Mamy dalej

$$\phi'(\xi) \cdot k = \left[ \frac{\partial f}{\partial y}(x + h, \xi) - \frac{\partial f}{\partial y}(x, \xi) \right] = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y}(\eta, \xi) \cdot h \cdot k$$

gdzie  $\eta \in ]x, x + h[$ ; w ostatnim kroku znów skorzystaliśmy z tw. Lagrange'a o wartości średniej.

Zdefiniujmy teraz

$$\psi(x) = f(x, y + k) - f(x, y)$$

i podobnie jak wyżej, możemy wyrazić  $w$  przez  $\psi$ . Mamy:

$$w = \psi(x + h) - \psi(x) = \psi'(\tilde{\eta}) \cdot h = \spadesuit$$

(tu  $\tilde{\eta} \in ]x, x + h[$ ; znów skorzystaliśmy z tw. Lagrange'a) i dalej

$$\spadesuit = \left[ \frac{\partial f}{\partial x}(\tilde{\eta}, y + k) - \frac{\partial f}{\partial x}(\tilde{\eta}, y) \right] = \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial x}(\tilde{\eta}, \tilde{\xi}) \cdot h \cdot k$$

gdzie  $\tilde{\xi} \in ]y, y + k[$ .

W powyższych wyrażeniach liczyliśmy tę samą wielkość  $w$  na dwa różne sposoby. Mamy więc:

$$w = \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial f}{\partial y}(\eta, \xi) \cdot h \cdot k = \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial f}{\partial x}(\tilde{\eta}, \tilde{\xi}) \cdot h \cdot k$$

Jeśli teraz  $h \rightarrow 0$ , to wtedy  $\xi \rightarrow y$ ,  $\eta \rightarrow x$ , oraz  $\tilde{\xi} \rightarrow y$ ,  $\tilde{\eta} \rightarrow x$ , zatem otrzymujemy równość pochodnych cząstkowych mieszanych w punkcie  $(x, y)$ .

**CBDO**

*Przykł.:* Nie można opuścić założeń o ciągłości; Nierówność pochodnych mieszanych gdy  $f$  nie jest kl.  $C^2$ .

### 3.4 Wyższe pochodne

*Notacja pochodnych cząstkowych.* Mówiąc o pochodnej cząstkowej trzeba podać nie tylko jej rząd (ilość różniczkowań), ale też powiedzieć, po jakich zmiennych się różniczkuje. Ogólnie pochodna  $r$ -tego rzędu funkcji  $N$  zmiennych ma postać:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2},$$

$$\frac{\partial^r f}{(\partial x^1)^{r_1} (\partial x^2)^{r_2} \dots (\partial x^N)^{r_N}}, \quad \text{gdzie } r = r_1 + r_2 + \dots + r_N;$$

i tak wszystkie drugie pochodne funkcji dwóch zmiennych są

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2},$$

pochodne trzeciego rzędu:

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x^3}, \quad \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y}, \quad \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2}, \quad \frac{\partial^3 f}{\partial y^3},$$

itd.

### 3.5 Różniczkowalność odwzorowań

Powyższe uwagi dotyczyły *funkcji*  $N$  zmiennych. Gdy mamy odwzorowania, różniczkowalność tychże definiujemy analogicznie:

Niech  $T$  odwzorowuje  $\mathcal{O} \subset \mathbb{R}^N$  na  $\mathcal{U} \subset \mathbb{R}^M$ ,  $\mathcal{O}$  i  $\mathcal{U}$  są otwarte. **RYS.**; niech  $x \in \mathcal{O}$ ,  $y \in \mathcal{U}$ .

Niech  $y = T(x)$ . Wypiszmy tę równość jawnie w składowych:

$$y^k = T^k(x^1, x^2, \dots, x^N), \quad k = 1, 2, \dots, M.$$

**Def.** Mówimy, że  $T$  jest klasy  $C^r$ , jeżeli wszystkie funkcje  $T^k \in C^r(\mathcal{O})$ .

Można wypisywać wszystkie pochodne cząstkowe rzędu  $r$  dla odwzorowania – wzory są podobne jak na pochodną funkcji, tylko nieco bardziej skomplikowane. Będziemy je wypisywać, gdy będzie to potrzebne, a na razie wypiszmy jawnie *pierwszą* pochodną odwzorowania:

$$T'(x) = \begin{bmatrix} (T^1(x))' \\ (T^2(x))' \\ \vdots \\ (T^M(x))' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial T^1}{\partial x^1} & \frac{\partial T^1}{\partial x^2} & \cdots & \frac{\partial T^1}{\partial x^N} \\ \frac{\partial T^2}{\partial x^1} & \frac{\partial T^2}{\partial x^2} & \cdots & \frac{\partial T^2}{\partial x^N} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \frac{\partial T^M}{\partial x^1} & \frac{\partial T^M}{\partial x^2} & \cdots & \frac{\partial T^M}{\partial x^N} \end{bmatrix} \quad (26)$$

tnz. na skrzyżowaniu  $i$ -tego wiersza i  $j$ -tej kolumny mamy pochodną  $\frac{\partial T^i}{\partial x^j}$ . Pamiętajmy, że każda z pochodnych  $\frac{\partial T^i}{\partial x^j}$  jest funkcją  $N$  zmiennych  $x^1, \dots, x^N$ .

*Oznaczenia & terminologia:* Pochodną odwzorowania (26) oznacza się też czasem  $DT$ . Taka tablica liczb, jak pamiętamy z części algebraicznej wykładu, nazywa się *macierzą*; w tym konkretnym przypadku mamy *macierz pochodnej* odwzorowania albo *macierz Jacobiego*.

*Przykł.* Macierz Jacobiego zamiany współrzędnych kartezjańskich na biegunowe.

### 3.6 Pochodna odwzorowania złożonego

Niech:  $X \subset \mathbb{R}^N$ ,  $Y \subset \mathbb{R}^M$ ,  $Z \subset \mathbb{R}^k$  oraz  $S : X \rightarrow Y$ ,  $T : Y \rightarrow Z$ . Pamiętamy, że *superpozycją* (złożeniem odwzorowań  $S$  i  $T$  nazywamy odwzorowanie  $T \circ S : X \rightarrow Z$ , określone jako:  $(T \circ S)(x) = T(S(x))$ .

**RYS.**

Pamiętamy też twierdzenie, że jeśli  $S$  i  $T$  są odwzorowaniami ciągłymi, to  $T \circ S$  też jest odwzorowaniem ciągłym.

Wyprowadziliśmy niedawno wzór (22) na pochodną odwzorowania złożonego w przypadku, gdy  $X$  było podzbiorem  $\mathbb{R}$ ,  $Y$  podzbiorem  $\mathbb{R}^n$ , oraz  $Z \subset \mathbb{R}$ :

**RYS.**

Zastosujmy teraz ten wzór w przypadku, gdy mamy pochodną  $\frac{\partial (T \circ S)^k}{\partial x^l}(x)$ .

**RYS.**

Mamy:

$$\frac{\partial (T \circ S)^k}{\partial x^l}(x) = \frac{\partial T^k(S^1(x^1, x^2, \dots, x^N), S^2(x^1, x^2, \dots, x^N), \dots, S^M(x^1, x^2, \dots, x^N))}{\partial x^l}(x)$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\partial T^k}{\partial y^1}(S(x)) \cdot \frac{\partial S^1}{\partial x^l}(x) + \frac{\partial T^k}{\partial y^2}(S(x)) \cdot \frac{\partial S^2}{\partial x^l}(x) + \cdots + \frac{\partial T^k}{\partial y^M}(S(x)) \cdot \frac{\partial S^M}{\partial x^l}(x) \\
&= \sum_{j=1}^M \frac{\partial T^k}{\partial y^j}(S(x)) \cdot \frac{\partial S^j}{\partial x^l}(x).
\end{aligned} \tag{27}$$

To była konkretna składowa  $\frac{\partial(T \circ S)^k}{\partial x^l}(x)$ . Dla całej macierzy Jacobiego można wypisać wzór, przypominający jako żywo pochodną funkcji złożonej – ale aby go prawidłowo rozczytać, trzeba pamiętać, co oznaczają poszczególne symbole:

$$(T \circ S)'(x) = T'(S(x)) \cdot S'(x)$$

gdzie kropka oznacza *mnożenie macierzy* pochodnych.

Jeśli zarówno  $S$  jak i  $T$  są odwzorowaniami różniczkowalnymi klasy  $C^1$ , to i ich złożenie też jest odwzorowaniem różniczkowalnym klasy  $C^1$ . Wynika to od razu z faktu, że sumy i iloczyny odwzorowań różniczkowalnych typu (22) też są różniczkowalne, a we wzorze (27) są tylko sumy i iloczyny takich wyrażeń.

Analogicznie się argumentuje pokazując, że jeśli  $S$  oraz  $T$  są odwzorowaniami różniczkowalnymi klasy  $C^r$ , to i ich złożenie też jest odwzorowaniem różniczkowalnym klasy  $C^r$ .

Powyższe można podsumować w twierdzeniu:

**Tw.** Jeśli  $S$  i  $T$  są odwzorowaniami klasy  $C^r$ , to również ich złożenie  $T \circ S$  jest klasy  $C^r$ . Pierwsza pochodna odwzorowania złożonego dana jest wzorem

$$(T \circ S)'(x) = T'(S(x)) \cdot S'(x) \tag{28}$$

or, in more explicit manner,

$$\frac{\partial(T \circ S)^k}{\partial x^l}(x) = \sum_{j=1}^M \frac{\partial T^k}{\partial y^j}(S(x)) \cdot \frac{\partial S^j}{\partial x^l}(x). \tag{29}$$

*Przykł.*  $S : \mathbb{R}^2 \ni (r, \phi) \rightarrow (x = r \cos \phi, y = r \sin \phi) \in \mathbb{R}^2$ ,  $T : \mathbb{R}^2 \ni (x, y) \rightarrow (u = \exp(x + y), v = \exp(x - y)) \in \mathbb{R}^2$ . Policzmy pochodną wprost oraz jako iloczyn macierzy pochodnych  $S$  i  $T$ .