Zadania z analizy i algebry.
(wykład prof.prof. J. Wojtkiewicza i K. Napiórkowskiego)

ALGEBRA, przestrzenie wektorowe

Zadanie 1
Zbadać czy wektor $\mathbf{v}$ można przedstawić jako kombinację liniową wektorów $\mathbf{e}_1$ i $\mathbf{e}_2$, gdzie

$$i) \qquad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} , \qquad \mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix} , \qquad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 7 \\ 8 \\ 9 \end{bmatrix} ,$$

oraz

$$ii) \qquad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} , \qquad \mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} , \qquad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} ,$$

Odp. $i)$ tak: $\mathbf{v} = 2\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2$, $ii)$ nie.

Zadanie 2
Czy wektory

$$\mathbf{w}_1 = \begin{bmatrix} 1+2i \\ i \end{bmatrix} , \qquad \mathbf{w}_2 = \begin{bmatrix} 7-i \\ 3+i \end{bmatrix} ,$$

są liniowo zależne? Zbadać sprawę nad ciałem R^1 i nad ciałem C^1.
Odp. Pytamy, czy równanie

$$x_1\mathbf{w}_1 + x_2\mathbf{w}_2 = 0 ,$$

ma rozwiązanie dla $x_i \in R^1$, gdy nad R^1 oraz $x_i \in C^1$ gdy nad C^1. Rozwiążmy:

$$\begin{aligned} x_1(1+2i) + x_2(7-i) &= 0 , \\ x_1 i + x_2(3+i) &= 0 , \end{aligned}$$

Z drugiego $x_1 = (-1+3i)x_2$ i to do pierwszego, co da: $[(1+2i)(-1+3i)+7-i]x_2 = 0$. To istotnie jest zero, niezależnie od wartości x_2. Rozwiązaniami są więc dowolne x_2 i $x_1 = (-1+3i)x_2$. Widać jednak, że jeśli $x_2 \in R^1$ to x_1 jest zespolone. Zatem nad R^1 wektory $\mathbf{w}_1$ i $\mathbf{w}_2$ są liniowo niezależne, ale nad C^1 zależne.

Zadanie 3
Zbadać liniową niezależność nad ciałem R^1 i nad C^1 wektorów

$$i) \qquad \mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} , \qquad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} , \qquad \mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} , \qquad \mathbf{e}_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} ,$$

oraz

$$ii) \qquad \mathbf{f}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} , \qquad \mathbf{f}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ i \\ -i \end{bmatrix} , \qquad \mathbf{f}_3 = \begin{bmatrix} i \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} .$$

Odp.: W przypadku i) widać gołym okiem, że są liniowo zależne nad R^1 bo równanie $\lambda_1\mathbf{e}_1 + \lambda_2\mathbf{e}_2 + \lambda_3\mathbf{e}_3 + \lambda_4\mathbf{e}_4 = 0$ ma rozwiązanie $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_4 = \lambda$, $\lambda_3 = -2\lambda$ dla dowolnego λ, a skoro są liniowo zależne nad R^1 to i nad C^1 też, bo $R^1 \subset C^1$.
Uwaga: ustalona wyżej liniowa zależność $\mathbf{e}_1$, $\mathbf{e}_2$, $\mathbf{e}_3$ i $\mathbf{e}_4$ oznacza, że np. $\mathbf{e}_3 = -\frac{1}{2}\mathbf{e}_1 - \frac{1}{2}\mathbf{e}_2 - \frac{1}{2}\mathbf{e}_4$, tj., że $\mathbf{e}_3$ jest kombinacją liniową pozostałych. W zasadzie zamiast badać istnienie niezerowych rozwiązań równania $\lambda_1\mathbf{e}_1 + \lambda_2\mathbf{e}_2 + \lambda_3\mathbf{e}_3 + \lambda_4\mathbf{e}_4 = 0$ moglibyśmy postawić problem, czy wektor $\mathbf{e}_3$ jest liniowo zależny od pozostałych. To jest jednak mniej ogólne: mogłoby się np. okazać, że sam wektor $\mathbf{e}_3$ nie daje sie przedstawić jako kombinacja liniowa $\mathbf{e}_1$, $\mathbf{e}_2$ i $\mathbf{e}_4$, ale te trzy wektory są liniowo zależne. Np. gdyby badać problem liniowej zależności wektorów

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} , \qquad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} , \qquad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} , \qquad \mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} ,$$

to okazałoby się, że $\mathbf{v}_3$ nie jest kombinacją liniową $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ i $\mathbf{v}_4$, niemniej te trzy wektory: $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ i $\mathbf{v}_4$ są liniowo zależne i tym samym cztery wektory $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$, $\mathbf{v}_3$ i $\mathbf{v}_4$ są liniowo zależne. Badając ich liniową zależność przez pytanie o istnienie niezerowych rozwiązań równania $\lambda_1\mathbf{v}_1 + \lambda_2\mathbf{v}_2 + \lambda_3\mathbf{v}_3 + \lambda_4\mathbf{v}_4 = 0$ dostalibyśmy, że niezerowym rozwiązaniem jest $\lambda_1 = \lambda_2 = -\lambda_4 = \lambda$ i $\lambda_3 = 0$, czyli $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_4 = 0$. Jest jasne, że to nie pozwala wyrazić $\mathbf{v}_3$ przez pozostałe (bo $\lambda_3 = 0$).
W przypadku ii) rozwiązujemy równanie $\xi_1\mathbf{f}_1 + \xi_2\mathbf{f}_2 + \xi_3\mathbf{f}_3 = 0$, czyli układ

$$\begin{aligned} \xi_2 + i\xi_3 &= 0 , \\ \xi_1 + i\xi_2 + \xi_3 &= 0 , \\ 2\xi_1 - i\xi_2 + \xi_3 &= 0 . \end{aligned}$$

Dodając pierwsze pomnożone przez i do trzeciego dostajemy $\xi_1 = 0$. Uwzględniając to, z drugiego dodanego do trzeciego znajdujemy $2\xi_3 = 0$ czyli $\xi_3 = 0$ i wtedy (z pierwszego) $\xi_2 = 0$ też. Zatem wektory $\mathbf{f}_1$, $\mathbf{f}_2$, $\mathbf{f}_3$ są linowo niezależne nad obydwoma ciałami R^1 i C^1.

Zadanie 4
Zbadać liniową zależność wektorów.

$$\mathbf{w}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ i \\ -i \end{bmatrix} , \qquad \mathbf{w}_2 = \begin{bmatrix} 2i \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} , \qquad \mathbf{w}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} .$$

Odp.: Rozwiązujemy równanie $x_1\mathbf{w}_1 + x_2\mathbf{w}_2 + x_3\mathbf{w}_3 = 0$, czyli układ

$$\begin{aligned} 2x_1 + 2ix_2 + x_3 &= 0 , \\ ix_1 - x_2 + 2x_3 &= 0 , \\ -ix_1 + x_2 + 3x_3 &= 0 . \end{aligned}$$

Dodanie drugiego do trzeciego daje $x_3 = 0$. Wtedy pierwsze sprowadza się do $x_1 + ix_2 = 0$, a drugie do $ix_1 - x_2 = 0$, czyli do pierwszego pomnożonego przez i. Zatem szukanym rozwiązaniem jest $x_2 = ix_1$, $x_3 = 0$ i x_1 dowolne. Ponieważ albo x_1 albo x_2 jest zespolone (albo nawet oba) to wektory $\mathbf{w}_1$, $\mathbf{w}_2$ oraz $\mathbf{w}_3$ są liniowo zależne nad C^1, ale nie nad R^1.

Zadanie 5
Dowieść, że jeśli wektory $\mathbf{e}_1$, $\mathbf{e}_2$ oraz $\mathbf{e}_3$ są liniowo niezależne (nad R^1 lub C^1) to takimiż są wektory

$$\begin{aligned} \mathbf{f}_1 &= \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3 \ , \\ \mathbf{f}_2 &= \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 \ , \\ \mathbf{f}_3 &= \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3 \ . \end{aligned}$$

Odp.: Jak zwykle pytamy, czy z faktu, że $\lambda_1\mathbf{f}_1 + \lambda_2\mathbf{f}_2 + \lambda_3\mathbf{f}_3 = 0$ wynika, że $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$. Wiemy teraz także, iż równanie $\xi_1\mathbf{e}_1 + \xi_2\mathbf{e}_2 + \xi_3\mathbf{e}_3 = 0$ ma tylko rozwiązanie $\xi_1 = \xi_2 = \xi_3 = 0$. Piszemy więc:

$$\begin{aligned} 0 = \lambda_1\mathbf{f}_1 + \lambda_2\mathbf{f}_2 + \lambda_3\mathbf{f}_3 &= \lambda_1(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3) + \lambda_2(\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) + \lambda_3(\mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3) \\ &= (\lambda_1 + \lambda_2)\mathbf{e}_1 + (\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)\mathbf{e}_2 + (\lambda_1 + \lambda_3)\mathbf{e}_3 \end{aligned}$$

Zatem na mocy założenia musimy mieć $\lambda_1 + \lambda_2 = 0$, $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 0$ i $\lambda_1 + \lambda_3 = 0$. Drugie z pierwszym daje $\lambda_3 = 0$, wtedy trzecie daje $\lambda_1 = 0$ i na koniec z drugiego wynika wtedy że i $\lambda_2 = 0$.

Zadanie 6
Dowieść, że następujące zbiory wektorów-funkcji (tj. wektorów z przestrzeni $V = \mathrm{Map}(R^1, R^1)$) są liniowo niezależne

a) $\sin x, \quad \cos x \ ,$

b) $1, \quad \sin x, \quad \cos x \ ,$

c) $\sin x, \quad \sin 2x, \quad \ldots, \quad \sin nx$

d) $1, \quad \cos x, \quad \cos 2x, \quad \ldots, \quad \cos nx$

e) $1, \quad \cos x, \quad \sin x, \quad \cos 2x, \quad \sin 2x, \quad \ldots, \quad \cos nx, \quad \sin nx \ .$

Odp.: W przypadku *a)* jest jasne, że $\lambda \sin x + \xi \cos x = 0$ może *dla wszystkich* $x \in (a, b) \subset R^1$ zachodzić tylko dla $\lambda = \xi = 0$: jeśli $x = k\pi$ i $x = l\pi + \frac{1}{2}\pi$ należą do (a, b) to jest to trywialne, jesli nie, to można zróżniczkować i ma się $\lambda \cos x - \xi \sin x = 0$ oraz $\lambda \sin x + \xi \cos x = 0$ i znów jedynym rozwiązaniem obu dla wszystkich x-ów jest $\lambda = \xi = 0$. To samo w przypadku *b)*: $\eta\, 1 + \lambda \sin x + \xi \cos x = 0$ dla wszystkich $x \in (a, b) \subset R^1$ też wymaga $\eta = \lambda = \xi = 0$ (aby to zobaczyć, można znów zróżniczkować i dostaniemy ten sam problem, co w punkcie a). W przypadku *c)* możemy posłużyć się indukcją. Zakładamy, że wektory te są liniowo niezależne dla jakiegoś n (dla $n = 1$ jest to oczywiste) i sprawdzamy, czy z tego wynika to samo dla $n + 1$, to znaczy, że

$$f(x) \equiv \lambda_1 \sin x + \lambda_2 \sin 2x + \ldots + \lambda_n \sin nx + \lambda_{n+1} \sin(n + 1)x \equiv 0 \ ,$$

(symbol $\equiv$ przypomina, że ma to być 0 dla wszystkich x) tylko dla $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_n = \lambda_{n+1} = 0$. Skoro ma to zachodzić dla wszystkich x to znaczy że i

$$\frac{d^2}{dx^2} f(x) \equiv -\lambda_1 \sin x - 2^2 \lambda_2 \sin 2x + \ldots - n^2 \lambda_n \sin nx - (n+1)^2 \lambda_{n+1} \sin(n+1)x \equiv 0 \ .$$

Mnożymy $f(x)$ przez $(n+1)^2$ i dodajemy do tego tu wyżej, co da

$$[(n+1)^2 - 1]\lambda_1 \sin x + [(n+1)^2 - 4]\lambda_2 \sin 2x + \ldots + [(n+1)^2 - n^2]\lambda_n \sin nx \equiv 0 \ ,$$

To zaś na mocy indukcyjnego założenia o liniowej niezależności wektorów $\sin x$, ..., $\sin nx$ oznacza, ze $[(n+1)^2 - 1]\lambda_1 = [(n+1)^2 - 4]\lambda_2 = \ldots = [(n+1)^2 - n^2]\lambda_n = 0$. Stąd zeru muszą być wszystkie λ_i o $i = 1, \ldots, n$ z wyjątkiem ewentualnie k-tej, o takim k, że $(n+1)^2 - k^2 = 0$. Ale to się nie może zdarzyć, bo w indukcji rozpatrujemy tylko $n + 1 > k$. Zatem $\lambda_1 = \lambda_2 = \ldots \lambda_n = 0$ i z tożsamościowego znikanie $f(x)$ wynika, iż także $\lambda_{n+1} = 0$. W przypadku d) także posługujemy się indukcją. Zakładamy, że teza (liniowa niezależność) jest prawdziwa dla n mamy pokazać, że

$$g(x) \equiv \eta + \lambda_1 \cos x + \lambda_2 \cos 2x + \ldots + \lambda_n \cos nx + \lambda_{n+1} \cos(n+1)x \equiv 0 \ ,$$

pociąga za sobą $\eta = \lambda_1 = \ldots = \lambda_n = \lambda_{n+1} = 0$. Mnożymy $g(x)$ przez $(n+1)^2$ i odejmujemy od tego dwakroć zróżniczkowane $g(x) = 0$. Jak wyżej wynika stąd, że $\lambda_1 = \lambda_2 = \ldots \lambda_n = 0$ i zostaje nam w $g(x) = 0$ tylko $\eta + \lambda_{n+1} \cos(n+1)x = 0$, co znów wymaga by $\eta = \lambda_{n+1} = 0$. Wreszcie w przypadku e) także zakładamy, że $\eta + \lambda_1 \cos x + \xi_1 \sin x + \lambda_n \cos nx + \xi_n \sin nx = 0$ tylko dla $\eta = \lambda_1 = \xi_1 = \ldots = \lambda_n = \xi_n = 0$ i robimy dla $n + 1$ sztuczkę z drugą pochodną, co zostawia nam $\eta + \lambda_{n+1} \cos(n+1)x + \xi_{n+1} \sin(n+1)x = 0$. To też wymaga, by $\eta = \lambda_{n+1} = \xi_{n+1} = 0$ (choćby na mocy tego, że teza jest prawdziwa dla $n = 1$, a czymże się różni x od $(n+1)x$? - tylko dziedziną...)

Zadanie 7
Dowieść, że wektory

$$\mathbf{f}_1 = \sin x, \qquad \mathbf{f}_2 = \sin^3 x, \qquad \mathbf{f}_3 = \sin 3x \ ,$$

z przestrzeni wektorowej $V = \mathrm{Map}(R^1, R^1)$ są liniowo zależne.
Odp.: To proste (można dać do domu)

$$\begin{aligned} \sin 3x &= \sin(2x + x) = \sin 2x \cos x + \sin x \cos 2x \\ &= 2 \sin x \cos^2 x + \sin x (1 - 2 \sin^2 x) = 3 \sin x - 4 \sin^3 x \ . \end{aligned}$$

Czyli $\mathbf{f}_3 = 3\mathbf{f}_1 - 4\mathbf{f}_2$, co dowodzi, że $\mathbf{f}_1$, $\mathbf{f}_2$, $\mathbf{f}_3$ są liniowo zależne.

Zadanie 8
Dowieść, że wektory

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \ , \qquad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \ , \qquad \mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \ ,$$

tworzą bazę przestrzeni wektorowej R^3.
Uwaga: jeśli w wektorach, tj. w tych kwadratowych nawiasikach, mają być tylko liczby rzeczywiste - bo tak sobie *definiujemy* tę przestrzeń - to musi to być przestrzeń wektorowa nad ciałem R^1; gdybyśmy bowiem dopuścili mnożenie wektorów przez liczby zespolone, to w nawiasikach wystąpiłyby z konieczności także liczby zespolone wbrew naszemu określeniu tej przestrzeni. W drugą zaś stronę rzecz jest możliwa: możemy sobie arbitralnie określić przestrzeń wektorową w taki sposób, że w nawiasikach mogą wystąpić także liczby zespolone, ale dopuszczać tylko kombinacje liniowe o współczynnikach rzeczywistych. W takim przypadku stosują się uwagi o bazie i wymiarze takiej przestrzeni umieszczone na końcu tego zadania.
Odp.: Trzeba pokazać, że dowolny wektor $\mathbf{w}$ można przedstawić jako kombinację liniową tych trzech, tj. w postaci $x_1\mathbf{e}_1 + x_2\mathbf{e}_2 + x_3\mathbf{e}_3 = \mathbf{w}$. Niech $\mathbf{w} = [a, b, c]$. Trzeba pokazać, że układ równań

$$\begin{aligned} x_1 + 3x_2 + 2x_3 &= a, & 2x_2 + 4x_3 &= a + b - c \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 &= b, & 4x_1 + 2x_3 &= -a + b + c \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 &= c, & 2x_1 + 4x_2 &= a - b + c \end{aligned}$$

ma rozwiązanie. Mnożąc pierwsze równanie przez -2 i dodając je do trzeciego

$$\begin{aligned} 2x_2 + 4x_3 &= a + b - c \\ 4x_1 + 2x_3 &= -a + b + c \\ 2x_1 - 8x_3 &= -a - 3b + 3c \end{aligned}$$

Teraz trzecie razy -2 i dodać do drugiego. Otrzymujemy $18x_3 = a + 7b - 5c$. Czyli mamy x_3. W podobny sposób można znaleźć $18x_1 = -5a + b + 7c$ oraz $18x_2 = 7a - 5b + c$ (symetria równań!). Łatwo sprawdzić, że to dobry wynik. Skoro jest (jednoznaczne) rozwiązanie dla dowolnego wektora $\mathbf{w}$ to ($\mathbf{e}_1$, $\mathbf{e}_2$, $\mathbf{e}_3$) tworzą bazę.
Uwaga: Wyjaśnijmy sobie na najprostszym przykładzie jeszcze jedną sprawę: dwa wektory

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} , \qquad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} ,$$

rozpinają całą przestrzeń wektorową V nad ciałem R^1 składającą się z wektorów postaci

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} , \qquad \text{o} \quad x_1, x_2 \in R^1 ,$$

bo dowolny taki wektor można przedstawić jako $\mathbf{w} = x_1\,\mathbf{e}_1 + x_2\,\mathbf{e}_2$, tj. jako kombinację liniową $\mathbf{e}_1$ i $\mathbf{e}_2$ z rzeczywistymi współczynnikami. Przestrzeń ta jest zatem dwuwymiarowa, bo jej baza składa się z dwu wektorów. Te same dwa wektory $\mathbf{e}_1$ i $\mathbf{e}_2$ nie rozpinają jednak całej przestrzeni wektorowej W też nad ciałem R^1 składającą się z wektorów postaci

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \end{bmatrix} , \qquad \text{o} \quad z_1, z_2 \in C^1 ,$$

bo np. wektora

$$\begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} ,$$

nie można dostać z kombinacji linowej $x_1\,\mathbf{e}_1 + x_2\,\mathbf{e}_2$ o *rzeczywistych* współczynnikach x_1 i x_2. Do tego trzeba wziąć większą bazę, np.:

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} , \qquad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} , \qquad \mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} i \\ 0 \end{bmatrix} , \qquad \mathbf{e}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ i \end{bmatrix} .$$

Czyli taka przestrzeń wektorowa (nad ciałem R^1) jest czterowymiarowa. Oczywiście, jeśli przestrzeń wektorowa jest nad ciałem C^1 to te cztery powyższe wektory są parami do siebie proporcjonalne ($\mathbf{e}_2 = i\mathbf{e}_1$, $\mathbf{e}_4 = i\mathbf{e}_3$), czyli liniowo zależne. Wtedy baza ma dwa wektory i ta przestrzeń wektorowa (nad ciałem C^1) jest tylko dwuwymiarowa.

Zadanie 9
Znaleźć wymiar i jakąś bazę podprzestrzeni wektorowej $E \subset R^4$ rozpinanej przez wektory $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_5$

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} , \qquad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} , \qquad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} , \qquad \mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} , \qquad \mathbf{v}_5 = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 7 \\ -2 \end{bmatrix} ,$$

Odp.: Ponieważ R^4 ma wymiar 4, zatem przynajmniej jeden z tych wektorów musi być liniowo zależny od pozostałych. Odrzućmy ostatni (bo ma brzydkie liczby). Aby zobaczyć, czy pierwsze cztery są liniowo zależne spróbujmy zapisać czwarty jako kombinację liniową trzech pierwszych, tj. jako $\mathbf{v}_4 = x_1\mathbf{v}_1 + x_2\mathbf{v}_2 + x_3\mathbf{v}_3$. To daje układ równań

$$\begin{aligned} 2x_1 + 3x_2 + 3x_3 &= -1 , \\ x_1 + 3x_2 - x_3 &= 1 , \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 &= -1 , \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 &= 1 . \end{aligned}$$

Weźmy trzy pierwsze na razie. Odjąć od trzeciego pierwsze. To da $x_2 = 4x_3$. Wstawiamy to do dwu pierwszych i mamy układ

$$\begin{aligned} 2x_1 + 15x_3 &= -1 , \\ x_1 + 11x_3 &= 1 . \end{aligned}$$

To łatwo rozwiązać (drugie razy dwa i odjąć od pierwszego). Stąd mamy jako rozwiązanie układu trzech pierwszych równań

$$x_1 = \frac{-26}{7} , \qquad x_2 = \frac{12}{7} , \qquad x_3 = \frac{3}{7} .$$

Teraz możemy sprawdzić ostatnie

$$\frac{-26}{7} + 2 \cdot \frac{12}{7} + 3 \cdot \frac{3}{7} = -1 \ .$$

(Cztery równania na trzy zmienne - trzeba mieć szczęście żeby tak się udało!!) To dowodzi, że cztery pierwsze wektory są liniowo zależne bo

$$\frac{-26}{7}\,\mathbf{v}_1 + \frac{12}{7}\,\mathbf{v}_2 + \frac{3}{7}\,\mathbf{v}_3 - \mathbf{v}_4 = 0 \ .$$

Zarazem z jednoznaczności tego rozwiązania wynika, że jak byśmy wzięli którekolwiek dwa wektory z $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$, $\mathbf{v}_3$ to się nie uda, tzn. $\mathbf{v}_4$ nie jest kombinacją liniową tylko dwu z nich. Zatem wymiar podprzestrzeni E jest równy conajmniej 3. Skoro jednak się okazało, że z czterech wektorów $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$, $\mathbf{v}_3$ i $\mathbf{v}_4$ tylko trzy są liniowo niezależne, to trzeba wrócić i zapytać, czy nie jest w takim razie możliwe dołączenie $\mathbf{v}_5$, tzn. trzeba sprawdzić czy układ wektorów $\mathbf{v}_1$ $\mathbf{v}_3$, $\mathbf{v}_4$ i $\mathbf{v}_5$, nie jest przypadkiem liniowo niezależny. Jeśli jest, to $\mathbf{v}_5$ się powinnien dać zapisać jako $x_1\,\mathbf{v}_1 + x_2\,\mathbf{v}_3 + x_3\,\mathbf{v}_4$. Sprawdźmy to:

$$\begin{aligned} 2x_1 + 3x_3 - x_4 &= 2 \ , \\ x_1 - x_3 + x_4 &= 3 \ , \\ 2x_1 - x_3 - x_4 &= 7 \ , \\ x_1 + 3x_3 + x_4 &= -2 \ . \end{aligned}$$

Najpierw rozwiązujemy pierwsze trzy: od pierwszego trzecie da $4x_3 = -5$, czyli $x_3 = -\frac{5}{4}$. To do drugiego i trzeciego:

$$\begin{aligned} x_1 + x_4 &= \frac{7}{4} \ , \\ 2x_1 - x_4 &= \frac{23}{4} \ . \end{aligned}$$

Dodanie stronami da $x_1 = \frac{10}{4}$ i wtedy z pierwszego wyżej $x_4 = \frac{7}{2} - \frac{10}{4} = -\frac{3}{4}$. Łatwo sprawdzić, że to jest dobre rozwiązanie trzech pierwszych równań. Sprawdzamy teraz ostatnie, czwarte: $x_1 + 3x_3 + x_4 = \frac{10}{4} - 3 \cdot \frac{5}{4} - \frac{3}{4} = -\frac{8}{4} = -2$. Czyli to czwarte też jest wtedy spełnione! Zatem ostatecznie $\mathbf{v}_5$ jest kombinacją liniową $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_3$, i $\mathbf{v}_4$ czyli jest od nich liniowo zależny. Ponieważ już wiemy, że $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_3$, i $\mathbf{v}_4$ też są liniowo niezależne, więc bazę podprzestrzeni E mogą tworzyć wektory $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_3$, $\mathbf{v}_4$.

Zadanie 10
Znaleźć sumę prostą i przecięcie dwu podprzestrzeni w R^3 rozpinanych przez dwa zbiory wektorów:

$$V = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} \ , \quad \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \ , \quad \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} \right\} \ ,$$

$$W = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} , \quad \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix} , \quad \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix} \right\} .$$

Odp.:. Najpierw znajdziemy ich sumę prostą. Jeśli 3 wektory V (lub W) są liniowo niezależne, to rozpinają całą R^3 i $V = R^3$ ($W = R^3$) i wtedy w oczywisty sposób $V \oplus W = R^3$. Sprawdźmy więc liniową niezależność wektorów z V. Układ

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 0 , \\ 3x_1 + x_2 + 3x_3 &= 0 , \\ x_1 - x_2 + 3x_3 &= 0 , \end{aligned}$$

ma jak łatwo sprawdzić tylko rozwiązanie $x_1 = x_2 = x_3 = 0$, zatem rzeczywiście $V = R^3$ i $V \oplus W = R^3$. Jeśli zaś chodzi o W to gołym okiem widać, że $\mathbf{w}_3 = -\mathbf{w}_1\mathbf{w}_2$, więc podprzestrzeń W jest tylko dwuwymiarowa i jest rozpinana np. przez $\mathbf{w}_1$ i $\mathbf{w}_2$. Ponieważ $V = R^3$ to przecięcie V z W, tj. poprzestrzeń utworzona przez wyktory takie,że należą one jednocześnie do V i do W jest samą podprzestrzenią W (bo $W \subset V = R^3$).

Zadanie 11
Znaleźć wymiar i bazę podprzestrzeni $E \subset R^4$ rozpiętej przez wektory

$$\mathbf{w}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} , \qquad \mathbf{w}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} , \qquad \mathbf{w}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} , \qquad \mathbf{w}_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix} .$$

Znaleźć także ogólną postać wektora z E. Odp.: Znów zobaczmy, czy się da przedstawić $\mathbf{w}_4$ w postaci $x_1\mathbf{w}_1 + x_2\mathbf{w}_2 + x_3\mathbf{w}_3$. Aby się dało musi być spełniony układ równań:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 1 , \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 &= 3 , \\ 3x_1 + 3x_2 + x_3 &= 3 , \\ 4x_1 + x_2 + 3x_3 &= 7 . \end{aligned}$$

Rozwiążmy trzy pierwsze, a potem sprawdzimy ostatnie. Drugie minus pierwsze daje $x_3 = 1 - \frac{1}{2}x_1$. To do trzeciego i mamy razem z pierwszym układ (kolejny!)

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 1 , \\ \frac{5}{2}x_1 + 3x_2 &= 2 . \end{aligned}$$

Stąd już łatwo i mamy jako rozwiązanie trzech pierwszych

$$x_1 = 2 , \qquad x_2 = -1 , \qquad x_3 = 0 .$$

(Łatwo sprawdzić, że to rozwiązuje trzy pierwsze równania). Teraz sprawdzamy czwarte:

$$2 \cdot (4) - 1 \cdot (1) + 0 \cdot (3) = 7 \ .$$

Hurra! Znów się udało! Czyli $\mathbf{w}_4$ jest liniowo zależny od $\mathbf{w}_1$, $\mathbf{w}_2$ i $\mathbf{w}_3$: $\mathbf{w}_4 = 2\mathbf{w}_1 - \mathbf{w}_2$. Co więcej znów rozwiązanie jest jednoznaczne, więc wszystkie trzy, $\mathbf{w}_1$, $\mathbf{w}_2$ i $\mathbf{w}_3$ są już liniowo niezależne. Zatem wymiar $\dim E = 3$, a jej bazą mogą być te trzy wektory.

Oczywiście dowolny wektor należący do E ma postać

$$x_1\mathbf{w}_1 + x_2\mathbf{w}_2 + x_3\mathbf{w}_3 = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 \\ 3x_1 + 3x_2 + x_3 \\ 4x_1 + x_2 + 3x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} \ .$$

Na użytek zadania 13 wygodnie będzie przedstawić ten wektor tak, że trzy jego pierwsze składowe będą dowolne, a czwarta będzie się wyrażała przez trzy pierwsze. W tym celu zastępujemy w drugim i trzecim wierszu $x_1 + x_2$ przez a, tak by znikło z nich x_1

$$\begin{bmatrix} a \\ 2a - x_2 + 2x_3 \\ 3a + x_3 \\ 4a - 3x_2 + 3x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} \ .$$

W następnym kroku zastępujemy $3a + x_3$ przez c a w drugim i czwartym wierszu zastępujemy x_3 przez $c - 3a$. W ten sposób

$$\begin{bmatrix} a \\ -4a + 2c - x_2 \\ c \\ -5a + 3c - 3x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} \ .$$

Wreszcie, w drugim wierszu zastępujemy $-4a + 2c - x_2$ przez b, a w czwartym zamiast x_2 dajemy $-4a + 2c - b$. W ten sposób postaś wektora z E jest taka

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ 7a + 3b - 3c \end{bmatrix} \ .$$

Zadanie 12

Znaleźć wymiar i bazę podprzestrzeni $F \subset R^4$ rozpiętej przez wszystkie wektory postaci

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{bmatrix} \ , \qquad \begin{matrix} 2y - 2z - t = 0 \\ x - 4y + 4z + 2t = 0 \end{matrix} \ .$$

Odp.: dwa razy pierwszy warunek plus drugi da $x = 0$. Z pierwszego zaś mamy, że $t = 2y - 2z$. Wektory rozpinające E są więc postaci

$$\begin{bmatrix} 0 \\ y \\ z \\ 2y - 2z \end{bmatrix} = y \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} + z \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} \equiv y\,\mathbf{e}_1 + z\,\mathbf{e}_2 \ .$$

Wektory $\mathbf{e}_1$ i $\mathbf{e}_2$ są ewidentnie liniowo niezależne. Zatem $\dim F = 2$ i jej bazą mogą być $\mathbf{e}_1$ i $\mathbf{e}_2$.

Zadanie 13
Znaleźć wymiar i bazę sumy oraz przecięcia podprzestrzeni E z zadania 11 i F z zadania 12.
Odp.: Jeden z pięciu wektorów

$$\mathbf{w}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} , \qquad \mathbf{w}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix} , \qquad \mathbf{w}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} , \qquad \mathbf{w}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} , \qquad \mathbf{w}_5 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} ,$$

rozpinających $E \oplus F$ musi być liniowo zależny od pozostałych. Wyrzućmy pierwszy bo najbardziej skomplikowany. Zobaczmy następnie, czy $\mathbf{w}_2$ się da zapisać jako kombinacja liniowa $\mathbf{w}_3$, $\mathbf{w}_4$ i $\mathbf{w}_5$. Gołym okiem widać, że się nie da. Co więcej, łatwo sprawdzić, że równanie $x\,\mathbf{w}_3 + y\,\mathbf{w}_4 + z\,\mathbf{w}_5 = 0$ ma tylko rozwiązanie $x = y = z = 0$. Zatem $E \oplus F = R^4$ bo jest rozpinana przez cztery wektory $\mathbf{w}_2$, $\mathbf{w}_3$, $\mathbf{w}_4$ i $\mathbf{w}_5$, które można przyjąć za jej bazę.

Teraz przecięcie E i F. Tworzą je wektory należące i do E i do F. Oznacza to, że wektory te muszą się dać jednocześnie przedstawić w dwu postaciach

$$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ 7a + 3(b - c) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ y \\ z \\ 2y - 2z \end{bmatrix} .$$

Widać, że aby tak było musi być $a = 0$, $b = y$, $c = z$ i do tego jeszcze musi zachodzić równość $7a + 3(b - c) = 2(y - z)$. Ale skoro $a = 0$, $b = y$, $c = z$ to może tak być tylko dla $b = c$. Zatem ogólną postacia wektora należącego do przecięcia podprzestrzeni E i F jest

$$\begin{bmatrix} 0 \\ b \\ b \\ 0 \end{bmatrix} .$$

Zatem przecięcie E i F jest podprzestrzenią jednowymiarową rozpinaną przez jakikolwiek wektor powyższej postaci (np. z $b = 1$).

Zadanie 14
Pokazać, że podprzestrzeń liniowa $E \subset R^4$ złożona z wektorów postaci

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{bmatrix} , \qquad \begin{array}{c} 3z - 4t = 0 \\ x - y + z + t = 0 \end{array} ,$$

jest rozpinana przez dwa wektory.
Odp.: Warunki są dwa na cztery składowe. Weźmy x i z jako niezależne. Wtedy $t = \frac{3}{4}z$ oraz (po wstawieniu tego do drugiego warunku) $x - y + \frac{7}{4}z = 0$, czyli $y = x + \frac{7}{4}z$. Zatem każdy wektor z E musi mieć postać

$$\lambda_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \lambda_3 \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 0 \\ 7 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix} .$$

Zadanie 15
Pokazać, że podprzestrzeń E rozpięta przez wektory $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$, $\mathbf{v}_3$, $\mathbf{v}_4$ postaci

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ i \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ i \\ 1 \\ 1-i \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ -i \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix},$$

zawiera wektory

$$\mathbf{w}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ i \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \qquad \text{oraz} \qquad \mathbf{w}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \\ 1-i \end{bmatrix},$$

oraz, że wektory $\mathbf{w}_1$, $\mathbf{w}_2$, $\mathbf{v}_3$, $\mathbf{v}_4$ rozpinają tę samą podprzestrzeń E.
Odp.: Najpierw trzeba pokazać, że równania $x_1\,\mathbf{v}_1 + x_2\,\mathbf{v}_2 + x_3\,\mathbf{v}_3 + x_4\,\mathbf{v}_4 = \mathbf{w}_1$ oraz $y_1\,\mathbf{v}_1 + y_2\,\mathbf{v}_2 + y_3\,\mathbf{v}_3 + y_4\,\mathbf{v}_4 = \mathbf{w}_2$ mają rozwiązania. Pierwsze daje układ równań

$$\begin{array}{rrcl} x_1 & + 2x_3 + 3x_4 & = & 1\ , \\ & ix_2 - ix_3 & = & i\ , \\ 2x_1 & + x_2 + x_3 + 4x_4 & = & 3\ , \\ ix_1 + (1-i)x_2 & + x_4 & = & 1\ . \end{array}$$

Z drugiego $x_2 - x_3 = 1$, czyli $x_2 = 1 + x_3$. To do pozostałych trzech, co da układ

$$\begin{array}{rrcl} x_1 & + 2x_3 + 3x_4 & = & 1\ , \\ 2x_1 & + 2x_3 + 4x_4 & = & 2\ , \\ ix_1 + (1-i)x_3 + x_4 & & = & i\ . \end{array}$$

Od drugiego odjąć pierwsze: $x_1 = 1 - x_4$. To do pierwszego i trzeciego

$$\begin{aligned} 2(x_3 + x_4) &= 0 \ , \\ (1-i)(x_3 + x_4) &= i \ . \end{aligned}$$

Czyli da się przedstawić $\mathbf{w}_1$, z tym, że nie w sposób jednoznaczny. To oznacza, że same wektory $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ $\mathbf{v}_3$ i $\mathbf{v}_4$ są liniowo zależne (czyli $\dim E < 4$). Istotnie, widać, że $\mathbf{v}_4 = \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3$. Zatem by dowieść, że $\mathbf{w}_2 \in E$ wystarczy pokazać, że $\mathbf{w}_2 = y_1\mathbf{v}_1 + y_2\mathbf{v}_2 + y_3\mathbf{v}_3$. Widać, że $\mathbf{w}_2 = \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3$ po prostu. Ogólniej, można zauważyć, że

$$\begin{aligned} \mathbf{w}_1 &= \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \lambda(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 - \mathbf{v}_4) \ , \\ \mathbf{w}_2 &= \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 + \xi(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 - \mathbf{v}_4) \ , \end{aligned}$$

dla dowolnych λ i ξ ponieważ $\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 - \mathbf{v}_4 = 0$. Stąd dla $\lambda = -1$ uzyskujemy związek

$$\mathbf{v}_4 = \mathbf{w}_1 + \mathbf{v}_3 \ .$$

Następnie kładąc $\lambda = 1$, $\xi = 2$ ($\lambda = 1$, $\xi = 1$) i odejmując od drugiego pierwsze (od pierwszego drugie) dostajemy dwa układy równań

$$\begin{aligned} \mathbf{w}_1 &= 2\mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 - \mathbf{v}_4 \ , \\ \mathbf{w}_2 &= 2\mathbf{v}_1 + 3\mathbf{v}_2 + 3\mathbf{v}_3 - 2\mathbf{v}_4 \ , \end{aligned} \qquad \begin{aligned} \mathbf{w}_1 &= 2\mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 - \mathbf{v}_4 \ , \\ \mathbf{w}_2 &= \mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2 + 2\mathbf{v}_3 - \mathbf{v}_4 \ . \end{aligned}$$

Z pierwszego układu, odejmując pierwsze od drugiego otrzymujemy

$$\mathbf{w}_2 - \mathbf{w}_1 = \mathbf{v}_2 + 2\mathbf{v}_3 - \mathbf{v}_4 = \mathbf{v}_2 - 2\mathbf{v}_3 - \mathbf{w}_1 + \mathbf{v}_3 \ ,$$

gdzie w drugim kroku wykorzystany został otrzymany już wyżej związek $\mathbf{v}_4 = \mathbf{w}_1 + \mathbf{v}_3$. Z drugiego układu zaś, odejmując od pierwszego drugie, dostajemy

$$\mathbf{w}_1 - \mathbf{w}_2 = \mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_3 \ .$$

Tak więc możemy wyrazić $\mathbf{v}_1$ i $\mathbf{v}_2$ przez $\mathbf{w}_1$, $\mathbf{w}_2$ oraz $\mathbf{v}_3$:

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_2 &= \mathbf{w}_2 - \mathbf{v}_3 \ , \\ \mathbf{v}_1 &= \mathbf{w}_1 - \mathbf{w}_2 + \mathbf{v}_3 \ , \end{aligned}$$

(co łatwo sprawdzić). Zatem każdy wektor postaci $\alpha\mathbf{v}_1 + \beta\mathbf{v}_2 + \gamma\mathbf{v}_3 \in E$ można napisać jako

$$\alpha(\mathbf{w}_1 - \mathbf{w}_2 + \mathbf{v}_3) + \beta(\mathbf{w}_2 - \mathbf{v}_3) + \gamma\mathbf{v}_3 = \alpha\mathbf{w}_1 + (\beta - \alpha)\mathbf{w}_2 + (\alpha - \beta + \gamma)\mathbf{w}_3 \ .$$

Zatem wektory $\mathbf{w}_1$, $\mathbf{w}_2$ i $\mathbf{v}_3$ także rozpinają E.

Zadanie 16

W pewnej bazie w R^3 wektory $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ $\mathbf{v}_3$ mają współrzędne

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Pokazać, że $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ $\mathbf{v}_3$ są także bazą tej przestrzeni i podać w tej nowej bazie współrzędne wektora $\mathbf{w}$, który w pierwotnej bazie ma współrzędne $(6, 9, 14)$.
Odp.: Niech wyjściową bazą będą wektory $\mathbf{e}_1$, $\mathbf{e}_2$, $\mathbf{e}_3$. Zatem

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3 \ , \\ \mathbf{v}_2 &= \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 + 2\mathbf{e}_3 \ , \\ \mathbf{v}_3 &= \mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2 + 3\mathbf{e}_3 \ . \end{aligned}$$

Odejmijmy pierwsze od drugiego:

$$\mathbf{e}_3 = -\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \ .$$

To do dwu pozostałych:

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_2 &= \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 + 2(-\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) \ , \\ \mathbf{v}_3 &= \mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2 + 3(-\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) \ . \end{aligned}$$

czyli

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 &= 2\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 \ , \\ \mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2 &= 3\mathbf{v}_1 - 3\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 \ . \end{aligned}$$

Od drugiego pierwsze oraz od dwa razy pierwszego drugie. Razem więc mamy

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_1 &= \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3 \ , \\ \mathbf{e}_2 &= \mathbf{v}_1 - 2\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 \ , \\ \mathbf{e}_3 &= -\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \ . \end{aligned}$$

Udało się jednoznacznie wyrazić trzy (z założenia) liniowo niezależne wektory $\mathbf{e}_1$, $\mathbf{e}_2$ i $\mathbf{e}_3$ przez wektory $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ i $\mathbf{v}_3$, co oznacza, że te drugie też są liniowo niezależne, czyli też mogą być bazą przestrzeni. Możemy teaz przerobić wektor $\mathbf{w}$:

$$\begin{aligned} \mathbf{w} &= 6\,\mathbf{e}_1 + 9\,\mathbf{e}_2 + 14\,\mathbf{e}_3 \\ &= 6\,(\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_3) + 9\,(\mathbf{v}_1 - 2\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3) + 14\,(-\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) \\ &= \mathbf{v}_1 + 2\,\mathbf{v}_2 + 3\,\mathbf{v}_3 \ , \end{aligned}$$

czyli współrzędne $\mathbf{w}$ w bazie $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ i $\mathbf{v}_3$ to $(1, 2, 3)$. Zapiszmy to przez macierz zmiany bazy. Niech

$$(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3) = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3) \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} .$$

Mnożenia "paluchowe" podrazumywajetsia. Stojąca tu macierz R_v jest tzw. *macierzą zmiany bazy* lub *macierzą przejścia*; dokładniej, jest to macierz przejścia z bazy $\mathbf{e}_i$, $i = 1, 2, 3$ do bazy $\mathbf{v}_i$, $i = 1, 2, 3$. Stosując konwencję sumacyjną wujka A.E. można powyższy wzór z macierzą zapisać jako $\mathbf{e}_k = \mathbf{v}_j (R_v)^j{}_k$. Konwencja polega na niepisaniu w prawej stronie sumy po wartościach wskaźnika j od 1 do 3. Jawnie wzór ten mówi, że np. $\mathbf{e}_1 = \mathbf{v}_1 (R_v)^1{}_1 + \mathbf{v}_2 (R_v)^2{}_1 + \mathbf{v}_3 (R_v)^3{}_1$, gdzie $(R_v)^1{}_1 = 1$, $(R_v)^2{}_1 = 1$, $(R_v)^3{}_1 = -1$, etc.

Jeśli teraz napiszemy wektor $\mathbf{w}$ w postaci $\mathbf{w} = \mathbf{e}_i w^i_{(e)}$ (indeksik e u $w^i_{(e)}$ ma przypominać że $w^i_{(e)} = (6, 9, 14)$ to są współrzędne w bazie $\mathbf{e}_i$) to będziemy mieć:

$$\mathbf{w} = \mathbf{e}_i w^i_{(e)} = \mathbf{v}_k (R_v)^k{}_i w^i_{(e)} \equiv \mathbf{v}_k w^i_{(v)} \ .$$

gdzie $(R_v)^k{}_i$ jest macierzą zmiany bazy, a $w^i_{(v)} = (R_v)^k{}_i w^i_{(e)}$ jawnie wygląda tak:

$$\begin{pmatrix} w^1_{(v)} \\ w^2_{(v)} \\ w^3_{(v)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 9 \\ 14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} .$$

Zadanie 17
Jak w zadaniu 16 tylko teraz

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

a $\mathbf{w}$ w pierwotnej bazie ma współrzędne $(6, 2, -7)$.
Odp.: Znów piszemy

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= 2\,\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 - 3\,\mathbf{e}_3 \ , \\ \mathbf{v}_2 &= 3\,\mathbf{e}_1 + 2\,\mathbf{e}_2 - 5\,\mathbf{e}_3 \ , \\ \mathbf{v}_3 &= \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3 \ . \end{aligned}$$

Trzecie dodać do pierwszego, a potem dwa razy trzecie do drugiego

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_3 &= 3\,\mathbf{e}_1 - 2\,\mathbf{e}_3 \ , \\ \mathbf{v}_2 + 2\mathbf{v}_3 &= 5\,\mathbf{e}_1 - 3\,\mathbf{e}_3 \ , \end{aligned}$$

Teraz pierwsze razy 3, drugie razy 2 i odjąć, oraz pierwsze razy 5, a drugie razy 3 i odjąć:

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_1 &= -3\,\mathbf{v}_1 + 2\,\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 \ , \\ \mathbf{e}_3 &= -5\,\mathbf{v}_1 + 3\,\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 \ . \end{aligned}$$

Do tego jeszcze

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_2 &= \mathbf{e}_1 - \mathbf{v}_3 + \mathbf{e}_3 \\ &= (-3\,\mathbf{v}_1 + 2\,\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3) - \mathbf{v}_3 + (-5\,\mathbf{v}_1 + 3\,\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3) \\ &= -8\,\mathbf{v}_1 + 5\,\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 \ . \end{aligned}$$

Razem więc

$$\begin{aligned}\mathbf{e}_1 &= -3\,\mathbf{v}_1 + 2\,\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3\ ,\\ \mathbf{e}_2 &= -8\,\mathbf{v}_1 + 5\,\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3\ ,\\ \mathbf{e}_3 &= -5\,\mathbf{v}_1 + 3\,\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3\ .\end{aligned}$$

Czyli macierz R_v zmiany bazy to

$$R_v = \begin{pmatrix} -3 & -8 & -5 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}\ .$$

a współrzędne $w^i_{(v)}$ wektora $\mathbf{w}$ w bazie $\mathbf{v}_i$ $i = 1, 2, 3$ to

$$\begin{pmatrix} -3 & -8 & -5 \\ 2 & 5 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ -7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\ .$$

Zadanie 18
Sprawdzić, że wielomiany

$$\mathbf{w}_1 = x + 1\ , \qquad \mathbf{w}_2 = x - 1\ , \qquad \mathbf{w}_3 = x^2 + x\ ,$$

tworzą bazę przestrzeni wektorowej wielomianów stopnia nie większego niż dwa i znaleźć współrzędne w tej bazie wielomianu $\mathbf{v} = 2x^2 + 3x + 1$.
Odp.: Trzeba sprawdzić, że $\mathbf{w}_1$, $\mathbf{w}_2$, $\mathbf{w}_3$ są liniowo niezależne, czyli, że równość

$$\lambda_1\mathbf{w}_1 + \lambda_2\mathbf{w}_2 + \lambda_3\mathbf{w}_3 = 0\ ,$$

dla wszystkich wartości x zachodzi tylko gdy $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$. To widać: równość

$$\lambda_1(x+1) + \lambda_2(x-1) + \lambda_3(x^2+x) = (\lambda_1 - \lambda_2) + (\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)x + \lambda_3 x^2 = 0\ ,$$

wymaga by $\lambda_3 = 0$, oraz $\lambda_1 - \lambda_2 = 0$ i $\lambda_1 + \lambda_2 = 0$. A to rzeczywiście tylko dla $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$. Czyli są liniowo niezależne, a zatem tworzą bazę. Chcemy teraz napisać

$$\begin{aligned}\mathbf{v} = 2x^2 + 3x + 1 &= \mathbf{w}_1 v^1 + \mathbf{w}_2 v^2 + \mathbf{w}_3 v^3\\ &= (x+1)v^1 + (x-1)v^2 + (x^2+x)v^3\ .\end{aligned}$$

Czyli $v^3 = 2$ oraz $v^1 + v^2 + v^3 = 3$ i $v^1 - v^2 = 1$. Stąd $v^1 = 1$, $v^2 = 0$. Istotnie

$$1 \cdot (x+1) + 2 \cdot (x^2 + x) = 2x^2 + 3x + 1\ .$$

Zadanie 19

W bazie $\mathbf{e}_1$, $\mathbf{e}_2$, $\mathbf{e}_3$ wektory $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$, $\mathbf{v}_3$, mają składowe (współrzędne) $(1,2,1)$, $(2,3,3)$ oraz $(3,8,2)$, zaś wektory $\mathbf{w}_1$, $\mathbf{w}_2$, $\mathbf{w}_3$ mają w tejże samej bazie składowe $(3,5,8)$, $(5,14,13)$ i $(1,9,2)$. Sprawdzić, że trzy wektory $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$, $\mathbf{v}_3$ lub trzy wektory $\mathbf{w}_1$, $\mathbf{w}_2$, $\mathbf{w}_3$ także tworzą dwie inne bazy tej samej przestrzeni i znaleźć macierz przejścia z jednej z nich do drugiej. Odp.: mamy

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= \mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3 \ , \\ \mathbf{v}_2 &= 2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2 + 3\mathbf{e}_3 \ , \\ \mathbf{v}_3 &= 3\mathbf{e}_1 + 8\mathbf{e}_2 + 2\mathbf{e}_3 \ , \end{aligned}$$

Drugie od 2×pierwszego: $2\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 = \mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_3$, czyli $\mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_2 - 2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$. To do pierwszego i trzeciego:

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_1 &= \mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_2 - 2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \ , \\ \mathbf{v}_3 &= 3\mathbf{e}_1 + 8\mathbf{e}_2 + 2(\mathbf{e}_2 - 2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2) \ , \end{aligned}$$

czyli

$$\begin{aligned} 3\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 &= \mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2 \ , \\ 4\mathbf{v}_1 - 2\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 &= 3\mathbf{e}_1 + 10\mathbf{e}_2 \ , \end{aligned}$$

Teraz pierwsze ×3 od drugiego i mamy $\mathbf{e}_2 = -5\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3$. Zatem

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_1 &= 3\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_2 - 3(-5\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3) \ , \\ \mathbf{e}_3 &= -5\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 - 2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 \ . \end{aligned}$$

Reasumując:

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_1 &= 18\mathbf{v}_1 - 4\mathbf{v}_2 - 3\mathbf{v}_3 \ , \\ \mathbf{e}_2 &= -5\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 \ , \\ \mathbf{e}_3 &= -7\mathbf{v}_1 + 2\mathbf{v}_2 + \mathbf{v}_3 \ . \end{aligned}$$

W podobny sposób można wyrazić $\mathbf{e}_i$ także przez $\mathbf{w}_j$, ale już nie będziemy tu tego robić (w zasadzie trzeba by, aby dowieść, że $\mathbf{w}_j$ też są bazą). Mamy teraz (w konwencji sumacyjnej):

$$\mathbf{e}_j = \mathbf{v}_l \left(R_v\right)^l{}_j \ , \qquad \mathbf{w}_i = \mathbf{e}_j \left(R_w^{-1}\right)^j{}_i \ ,$$

gdzie R_v jest macierzą przejścia z bazy $\mathbf{e}_j$ do bazy $\mathbf{v}_l$, którą odczytujemy ze wzorów wyrażających wektory $\mathbf{e}_j$ przez wektory $\mathbf{v}_l$, a macierz R_w^{-1} jest macierzą przejścia z bazy $\mathbf{w}_i$ do bazy $\mathbf{e}_j$, odwrotną do macierzy R_w przejścia z bazy $\mathbf{e}_j$ do bazy $\mathbf{w}_i$ (której tu nie wyliczyliśmy). Łącząc te wzory otrzymujemy

$$\mathbf{w}_i = \mathbf{v}_l \left(R_v\right)^l{}_j \left(R_w^{-1}\right)^j{}_i \ .$$

Zatem jeśli $\mathbf{V} = \mathbf{w}_i V^i_{(w)}$, to $\mathbf{V} = \mathbf{v}_l V^l_{(v)}$, gdzie $V^l_{(v)} = (R_v)^l{}_j \, (R_w^{-1})^j{}_i \, V^i_{(w)}$, przy czym

$$R_v R_w^{-1} = \begin{pmatrix} 18 & -5 & -7 \\ -4 & 1 & 2 \\ -3 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 5 & 14 & 9 \\ 8 & 13 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -27 & -71 & -41 \\ 9 & 20 & 9 \\ 4 & 12 & 8 \end{pmatrix} .$$

Zadanie 20
Znaleźć współrzędne (składowe) wektora

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} ,$$

w bazie

$$\mathbf{f}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} , \qquad \mathbf{f}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} , \qquad \mathbf{f}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} , \qquad \mathbf{f}_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} .$$

Następnie znaleźć macierze przejścia z bazy $\mathbf{f}_1$, $\mathbf{f}_2$, $\mathbf{f}_3$, $\mathbf{f}_4$ do bazy "kanonicznej"

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} , \qquad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} , \qquad \mathbf{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} , \qquad \mathbf{e}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} ,$$

i z powrotem. Znaleźć współrzędne wektora $\mathbf{v}$ w bazie kanonicznej.
Odp.: Trzeba rozwiązać układ $\mathbf{v} = x\,\mathbf{f}_1 + y\,\mathbf{f}_2 + z\,\mathbf{f}_3 + t\,\mathbf{f}_4$:

$$\begin{aligned} x + t &= 5 , \\ -x + y &= 1 , \\ -y + z &= 1 , \\ -z + t &= 1 . \end{aligned}$$

To się łatwo rozwiązuje bo z trzech ostatnich $t = 1 + z = 1 + 1 + y = 2 + 1 + x = 3 + x$. Czyli $2x + 3 = 5$ i $x = 1$, $y = 2$, $z = 3$, $t = 4$. Współrzędnymi $\mathbf{v}$ w bazie $\mathbf{f}_1$, $\mathbf{f}_2$, $\mathbf{f}_3$, $\mathbf{f}_4$ są liczby $(1, 2, 3, 4)$.

Teraz zmiana bazy. Mamy oczywisty związek $\mathbf{f}_i = \mathbf{e}_j (R_f^{-1})^j{}_i$, czyli jawnie

$$(\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \mathbf{f}_3, \mathbf{f}_4) = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_4) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} .$$

Aby mieć to samo w drugą stronę trzeba albo odwrócić stojącą tu macierz (czego jeszcze nie umiemy), albo po prostu rozwiązać cztery równania (na szczęście są one proste). Pierwsze z nich, $\mathbf{e}_1 = x_1\,\mathbf{f}_1 + y_1\,\mathbf{f}_2 + z_1\,\mathbf{f}_3 + t_1\,\mathbf{f}_4$, daje układ

$$\begin{aligned} x_1 + t_1 &= 1\,, \\ -x_1 + y_1 &= 0\,, \\ -y_1 + z_1 &= 0\,, \\ -z_1 + t_1 &= 0\,, \end{aligned}$$

którego jednoznacznym rozwiązaniem są $x_1 = y_1 = z_1 = t_1 = \frac{1}{2}$ (widać gołym okiem, że to jest ok.). Drugie, $\mathbf{e}_2 = x_2\,\mathbf{f}_1 + y_2\,\mathbf{f}_2 + z_2\,\mathbf{f}_3 + t_2\,\mathbf{f}_4$, daje układ

$$\begin{aligned} x_2 + t_2 &= 0\,, \\ -x_2 + y_2 &= 1\,, \\ -y_2 + z_2 &= 0\,, \\ -z_2 + t_2 &= 0\,, \end{aligned}$$

o rozwiązaniu $x_2 = -\frac{1}{2}$, $y_2 = z_2 = t_2 = \frac{1}{2}$ (też widać, że to ok.). Trzecie $\mathbf{e}_3 = x_3\,\mathbf{f}_1 + y_3\,\mathbf{f}_2 + z_3\,\mathbf{f}_3 + t_3\,\mathbf{f}_4$, prowadzi do

$$\begin{aligned} x_3 + t_3 &= 0\,, \\ -x_3 + y_3 &= 0\,, \\ -y_3 + z_3 &= 1\,, \\ -z_3 + t_3 &= 0\,, \end{aligned}$$

i ma rozwiązanie $x_3 = y_3 = -\frac{1}{2}$, $z_3 = t_3 = \frac{1}{2}$. Wreszcie, czwarte $\mathbf{e}_4 = x_4\,\mathbf{f}_1 + y_4\,\mathbf{f}_2 + z_4\,\mathbf{f}_3 + t_4\,\mathbf{f}_4$, czyli

$$\begin{aligned} x_4 + t_4 &= 0\,, \\ -x_4 + y_4 &= 0\,, \\ -y_4 + z_4 &= 0\,, \\ -z_4 + t_4 &= 1\,, \end{aligned}$$

daje $x_4 = y_4 = z_4 - \frac{1}{2}$, $t_4 = \frac{1}{2}$. Możemy więc napisać związek $\mathbf{e}_j = \mathbf{f}_k (R_f)^k{}_j$ jawnie:

$$(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_4) = (\mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \mathbf{f}_3, \mathbf{f}_4)\,\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}\,.$$

Sprawdźmy, że to jest istotnie macierz odwrotna

$$R_f \cdot R_f^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\,.$$

Czyli jest ok. Teraz współrzędne $\mathbf{v}$ w bazie $\mathbf{e}_i$. Mamy $\mathbf{v} = \mathbf{f}_i\, v^i_{(f)} = \mathbf{e}_j (R_f^{-1})^j{}_i v^i_{(f)}$ czyli $v^j_{(e)} = (R_f^{-1})^j{}_i\, v^i_{(f)}$. Jawnie

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} ,$$

co powinno było być od początku oczywiste.

Zadanie 21
Mamy przestrzeń wektorową wielomianów stopnia ≤ 3. Definiujemy odwzorowanie F z tej przestrzeni w przestrzeń wektorową wielomianów stopnia ≤ 2 wzorem

$$F[W(x)] = W'(x) + x^2 W(0) + 12x \int_0^1 dt\, W(t) \ .$$

Sprawdzić, czy odwzorowanie F jest liniowe. Jeśli tak, to znaleźć jego macierz w bazach kanonicznych $(\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ dla przestrzeni wielomianów stopnia ≤ 3 i $(\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$ dla przestrzeni wielomianów stopnia ≤ 2, gdzie $\mathbf{e}_n \equiv x^n$.
Odp.: F jest liniowe bo jeśli mamy wielomian $W(x) = \alpha_1 W^{(1)}(x) + \alpha_2 W^{(2)}(x)$ to

$$\begin{aligned} F[W(x)] &= \frac{d}{dx}[\alpha_1 W^{(1)}(x) + \alpha_2 W^{(2)}(x)] + x^2[\alpha_1 W^{(1)}(0) + \alpha_2 W^{(2)}(0)] \\ &\qquad + 12x \int_0^1 dt\, [\alpha_1 W^{(1)}(t) + \alpha_2 W^{(2)}(t)] \\ &= \alpha_1 \frac{d}{dx} W^{(1)}(x) + \alpha_1 x^2 W^{(1)}(0) + \alpha_1\, 12x \int_0^1 dt\, \alpha_1 W^{(1)}(t) \\ &\quad + \alpha_2 \frac{d}{dx} W^{(2)}(x) + \alpha_2 x^2 W^{(2)}(0) + \alpha_2\, 12x \int_0^1 dt\, \alpha_2 W^{(2)}(t) \\ &= \alpha_1 F[W^{(1)}(x)] + \alpha_2 F[W^{(2)}(x)] \ . \end{aligned}$$

Teraz możemy znaleźć macierz odwzorowania F w bazach kanonicznych. Dowolny wielomian stopnia ≤ 3 jest postaci:

$$\mathbf{W} = \mathbf{e}_0 W^0_{(e)} + \mathbf{e}_1 W^1_{(e)} + \mathbf{e}_2 W^2_{(e)} + \mathbf{e}_3 W^3_{(e)} \equiv W^0_{(e)} + W^1_{(e)} x + W^2_{(e)} x^2 + W^3_{(e)} x^3 \ .$$

gdzie $W^i_{(e)} \in R^1$ są składowymi wielomianu $\mathbf{W}$ w bazie $\mathbf{e}_i$. Co F robi z wektorów bazowych?

$$\begin{aligned} F[\mathbf{e}_0] \equiv F[1] &= x^2 + 12x = 12\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 \ , \\ F[\mathbf{e}_1] \equiv F[x] &= 1 + 6x = \mathbf{e}_0 + 6\mathbf{e}_1 \ , \\ F[\mathbf{e}_2] \equiv F[x^2] &= 6x = 6\mathbf{e}_1 \ , \\ F[\mathbf{e}_3] \equiv F[x^3] &= 3x^2 + 3x = 3\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2 \ . \end{aligned}$$

Z liniowości F mamy więc (w konwencji sumacyjnej: powtarzające się wskaźniki są wysumowane):

$$F[\mathbf{W}] = F[\mathbf{e}_i]W^i_{(e)} = \mathbf{e}_k F^k_{\ i} W^i_{(e)} \ ,$$

gdzie $\mathbf{e}_k F^k_{\ i} = F[\mathbf{e}_i]$. Korzystając ze znalezionego wyżej działania F na wektory bazy $\mathbf{e}_i$ łatwo znajdujemy macierz $F^k_{\ i}$ (k numeruje wiersze, a i kolumny) odwzorowania F:

$$F^k_{\ i} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 12 & 6 & 6 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \ .$$

Sprawdźmy jak to działa. Niech $W(x) = 2x^3 - 3x^2 + 7$. Działanie F na W możemy łatwo znaleźć bezpośrednio ze wzoru:

$$F[W] = 6x^2 - 6x + x^2 \cdot 7 + 12x \int_0^1 dt\,(2t^3 - 3t^2 + 7) = 72x + 13x^2 = 72\mathbf{e}_1 + 13\mathbf{e}_2 \ .$$

Współrzędnymi wielomianu-wektora $\mathbf{W}$ w bazie $(\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ są

$$\begin{pmatrix} 7 \\ 0 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} \ .$$

Działając na te współrzędne macierzą $F^k_{\ i}$ dostajemy

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 12 & 6 & 6 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 72 \\ 13 \end{pmatrix} \ ,$$

czyli istotnie współrzędne $X^k_{(e)}$ wielomianu $X = F[W]$ w bazie $(\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2)$.

Zadanie 22
Znaleźć jądro odwzorowania F z poprzedniego Zadania.
Odp.: Jądro jest to w tym przypadku podprzestrzeń liniowa przestrzeni wielomianów stopnia ≤ 3 tworzona przez takie wielomiany W, że $F[W(x)] = 0$ (zero oczywiście rozumiane jako wielomian zerowy). Niech $W = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$. Zobaczymy, jakie muszą byś współczynniki a_3, a_2, a_1, a_0, żeby W należał do jądra F. Zażądajmy by

$$F[W] = 3a_3x^2 + 2a_2x + a_1 + a_0x^2 + 12x\left(\frac{1}{4}a_3 + \frac{1}{3}a_2 + \frac{1}{2}a_1 + a_0\right) = 0 \ .$$

Wymaga to, by $a_1 = 0$, $3a_3 + a_0 = 0$ oraz $3a_3 + 6a_2 + 6a_1 + 12a_0 = 0$, czyli by cztery współczynniki a_i spełniały 3 równania. Weźmy a_0 jako niezależną wielkość. Wtedy $a_3 =$

$-\frac{1}{3}a_0$ i $a_2 = -\frac{11}{6}a_0$. Zatem jądro odwzorowania F jest w przestrzeni wielomianów stopnia ≤ 3 podprzestrzenią jednowymiarową rozpiętą przez wektor o składowych

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -\frac{11}{6} \\ -\frac{1}{3} \end{pmatrix} ,$$

w bazie $\mathbf{e}_n = x^n$, takiej jak w poprzednim Zadaniu. Możemy teraz skorzystać ze znalezionej tam macierzy $F^j{}_i$ odwzorowania F by sprawdzić, że istotnie

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 12 & 6 & 6 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda \\ 0 \\ -\frac{11}{6}\lambda \\ -\frac{1}{3}\lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} ,$$

dla dowolnego λ.

Zadanie 23
Niech wektory $\mathbf{f}_0 = 1 + x$, $\mathbf{f}_1 = x + x^2$, $\mathbf{f}_2 = x^2 + x^3$, $\mathbf{f}_3 = x^3$ będą inną bazą przestrzeni wektorowej wielomianów stopnia ≤ 3 (istotnie, można sprawdzić, że są one bazą). Znaleźć tej bazie macierz odwzorowania F
Uwaga: w przestrzeni wielomianów stopnia ≤ 2 trzymamy starą, "kanoniczną" bazę $\mathbf{e}_n = x^n$, tj. chcemy by nowa macierz odwzorowania F działając na składowe wielomianu stopnia ≤ 3 w bazie $\mathbf{f}_k$ dawała składowe odpowiedniego wielomianu stopnia ≤ 2 w bazie $\mathbf{e}_n$.
Odp.: Będziemy potrzebować macierzy przejścia R_f^{-1} z bazy $\mathbf{f}_k$ do bazy $\mathbf{e}_n$ odwrotnej do macierzy R_f przejścia z bazy $\mathbf{e}_n$ do bazy $\mathbf{f}_k$. Tę pierwszą, R_f^{-1}, znajdziemy łatwo bo mamy

$$\begin{aligned} \mathbf{f}_0 &= \mathbf{e}_0 + \mathbf{e}_1 , \\ \mathbf{f}_1 &= \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 , \\ \mathbf{f}_2 &= \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3 , \\ \mathbf{f}_3 &= \mathbf{e}_3 . \end{aligned}$$

Stąd

$$(\mathbf{f}_0, \mathbf{f}_1, \mathbf{f}_2, \mathbf{f}_3) = (\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} .$$

czyli, w zapisie na wskaźniczkach, $\mathbf{f}_k = \mathbf{e}_j (R_f^{-1})^j{}_k$. Jeśli mamy teraz dany wektor (wielomian) $\mathbf{V}$ w postaci $\mathbf{V} = \mathbf{f}_j V^j_{(f)}$ (gdzie $V^j_{(f)}$ są składowymi $\mathbf{V}$ w bazie $\mathbf{f}_j$), to

$$\mathbf{V} = \mathbf{f}_k V^k_{(f)} = \mathbf{e}_j (R_f^{-1})^j{}_k V^k_{(f)} \equiv \mathbf{e}_j V^j_{(e)} ,$$

gdzie $V^j_{(e)} = (R_f^{-1})^j{}_k V^k_{(f)}$. Niech teraz $\mathbf{X} = F[\mathbf{V}]$. Macierz odwzorowania F zapisana w bazach kanonicznych $\mathbf{e}_n$ zarówno w przestrzeni wielomianów stopnia ≤ 3 jak i wielomianów stopnia ≤ 2 działa tak, że jeśli $\mathbf{X} = \mathbf{e}_i X^i_{(e)}$, to

$$\mathbf{e}_i X^i_{(e)} = F[\mathbf{V}] = F[\mathbf{e}_k] V^k_{(e)} = \mathbf{e}_i F^i{}_k V^k_{(e)} \ .$$

Wyrażając tu $V^k_{(e)}$ przez $V^j_{(f)}$ za pośrednictwem macierzy $(R_f^{-1})^k{}_j$ dostajemy

$$\mathbf{e}_i X^i_{(e)} = \mathbf{e}_i F^i{}_k (R_f^{-1})^k{}_j V^j_{(f)} \ .$$

Tak więc współrzędne w bazie $\mathbf{e}_i$ wielomianu $\mathbf{X}$ (otrzymywanego jako obraz wielomianu $\mathbf{V}$ przy odwzorowania liniowym F) ze współrzędnych $\mathbf{V}$ w bazie $\mathbf{f}_j$ daje nam macierz

$$F^i{}_k (R_f^{-1})^k{}_j \ .$$

Morał: Tak jak współrzędne (składowe) wektora $\mathbf{V}$ piszemy jako $V^i_{(e)}$ lub $V^i_{(f)}$, aby pamiętać, w jakiej bazie są to współrzędne, tak też i macierz odwzorowania liniowego powinniśmy opatrywać symbolami mówiącymi w jakich bazach jest ona dana. Tak więc

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 12 & 6 & 6 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \equiv F_{(e)(e)} \ ,$$

i

$$[F_{(e)(e)}]^i{}_k (R_f^{-1})^k{}_j = [F_{(e)(f)}]^i{}_j \ .$$

Jawnie macierzowo

$$F_{(e)(f)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 12 & 6 & 6 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 18 & 12 & 9 & 3 \\ 1 & 0 & 3 & 3 \end{pmatrix} \ .$$

Sprawdźmy to na wielomianie $W = 2x^3 - 3x^2 + 7$. Zapiszmy go najpierw w bazie $\mathbf{f}_i$. W tym celu wyrażamy najpierw wektory $\mathbf{e}_i$ przez $\mathbf{f}_j$. Idąc "od dołu" mamy: $\mathbf{e}_3 = \mathbf{f}_3$, $\mathbf{e}_2 = \mathbf{f}_2 - \mathbf{e}_3 = \mathbf{f}_2 - \mathbf{f}_3$, etc. Łatwo więc znajdujemy, że

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_0 &= \mathbf{f}_0 - \mathbf{f}_1 + \mathbf{f}_2 - \mathbf{f}_3 \ , \\ \mathbf{e}_1 &= \mathbf{f}_1 - \mathbf{f}_2 + \mathbf{f}_3 \ , \\ \mathbf{e}_2 &= \mathbf{f}_2 - \mathbf{f}_3 \ , \\ \mathbf{e}_3 &= \mathbf{f}_3 \ . \end{aligned}$$

Znaleźliśmy zatem macierz R_f

$$R_f = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \ ,$$

odwrotną do R_f^{-1}. Istotnie,

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} .$$

Możemy teraz rozłożyć wektor $\mathbf{W}$ w bazie $\mathbf{f}_i$:

$$\begin{aligned} \mathbf{W} = 2\mathbf{e}_3 - 3\mathbf{e}_2 + 7\mathbf{e}_0 &= 2\mathbf{f}_3 - 3(\mathbf{f}_2 - \mathbf{f}_3) + 7(\mathbf{f}_0 - \mathbf{f}_1 + \mathbf{f}_2 - \mathbf{f}_3) \\ &= 7\mathbf{f}_0 - 7\mathbf{f}_1 + 4\mathbf{f}_2 - 2\mathbf{f}_3 \ . \end{aligned}$$

W bazie $\mathbf{f}_i$ wielomian W ma więc składowe

$$\begin{pmatrix} 7 \\ -7 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix} .$$

Jeśli na te składowe podziałamy macierzą $F_{(e)(f)}$ to dostaniemy

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 18 & 12 & 9 & 3 \\ 1 & 0 & 3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ -7 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 72 \\ 13 \end{pmatrix} ,$$

czyli to samo, co poprzednio (bo to co wychodzi to mają być składowe $F[\mathbf{W}]$ w tej samej bazie, co poprzednio, czyli w bazie $\mathbf{e}_i$).

Zadanie 24
Zapisać macierz odwzorowania F z poprzednich dwu zadań w bazie $\mathbf{e}_n = x^n$, $n = 0, 1, 2, 3$ dla wielomianów stopnia ≤ 3 i w bazie $\mathbf{g}_j$, $j = 0, 1, 2$ danej wzorami

$$\begin{aligned} \mathbf{g}_0 &= \mathbf{e}_0 + 2\mathbf{e}_1 + 3\mathbf{e}_2 \ , \\ \mathbf{g}_1 &= 3\mathbf{e}_1 + 4\mathbf{e}_2 \ , \\ \mathbf{g}_2 &= 2\mathbf{e}_2 \ , \end{aligned}$$

(tj. w bazie tworzonej przez wielomiany $\mathbf{g}_0 = 1 + 2x + 3x^2$, $\mathbf{g}_1 = 3x + 4x^2$ i $\mathbf{g}_2 = 2x^2$) dla wielomianów stopnia ≤ 2.
Odp.: Znów musimy znaleźć macierz przejścia z bazy $\mathbf{e}_n$ do bazy $\mathbf{g}_j$. Z trzeciego związku mamy $\mathbf{e}_2 = \frac{1}{2}\mathbf{g}_2$. Z drugiego wtedy $3\mathbf{e}_1 = \mathbf{g}_1 - 2\mathbf{g}_2$. W końcu

$$\mathbf{e}_0 = \mathbf{g}_0 - \frac{2}{3}(\mathbf{g}_1 - 2\mathbf{g}_2) - \frac{3}{2}\mathbf{g}_2 = \mathbf{g}_0 - \frac{2}{3}\mathbf{g}_1 - \frac{1}{6}\mathbf{g}_2 \ .$$

Ostatecznie więc mamy

$$(\mathbf{g}_0, \mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2) = (\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} .$$

czyli $\mathbf{g}_j = \mathbf{e}_i (R_g^{-1})^i{}_j$ oraz

$$(\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) = (\mathbf{g}_0, \mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{1}{6} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} ,$$

czyli $\mathbf{e}_k = \mathbf{g}_j (R_g)^j{}_k$. Powinno oczywiście być $\mathbf{e}_k = \mathbf{g}_j (R_g)^j{}_k = \mathbf{e}_i (R_g^{-1})^i{}_j (R_g)^j{}_k$, czyli $(R_g^{-1})^i{}_j (R_g)^j{}_k = \delta^i{}_k$. Można to jawnie sprawdzić:

$$R_g^{-1} \cdot R_g = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{1}{6} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} , = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} ,$$

Podobnie powinno być $\mathbf{g}_j = \mathbf{e}_i (R_g^{-1})^i{}_j = \mathbf{g}_k (R_g)^k{}_i (R_g^{-1})^i{}_j$, tj. $(R_g)^k{}_i (R_g^{-1})^i{}_j = \delta^k{}_j$:

$$R_g \cdot R_g^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{1}{6} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} .$$

Możemy teraz zapisywać sobie związek $\mathbf{X} = F[\mathbf{V}]$ w dowolnych bazach:

$$\mathbf{e}_i X^i_{(e)} = \mathbf{e}_i [F_{(e)(e)}]^i{}_j V^j_{(e)} , \qquad \text{czyli} \qquad X^i_{(e)} = [F_{(e)(e)}]^i{}_j V^j_{(e)} ,$$

lub, wyrażając $\mathbf{e}_i$ przez $\mathbf{g}_j$,

$$\mathbf{g}_j (R_g)^j{}_i [F_{(e)(e)}]^i{}_j V^j_{(e)} \equiv \mathbf{g}_j [F_{(g)(e)}]^j{}_j V^j_{(e)} \qquad \text{czyli} \qquad X^i_{(g)} = [F_{(g)(e)}]^i{}_j V^j_{(e)} ,$$

gdzie $[F_{(g)(e)}]^i{}_j = (R_g)^i{}_k [F_{(e)(e)}]^k{}_j$. Jawnie ($F_{(e)(e)}$ jest podana w poprzednim zadaniu):

$$F_{(g)(e)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{1}{6} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 12 & 6 & 6 & 3 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & \frac{4}{3} & 2 & 1 \\ -\frac{15}{2} & -\frac{25}{6} & -4 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} .$$

Można też mieć macierz odwzorowania F w bazie $\mathbf{f}_k$ dla wielomianów stopnia ≤ 3 i bazie $\mathbf{g}_j$ dla wielomianów stopnia ≤ 2. W tym celu trzeba $V^j_{(e)}$ zapisać jako $V^j_{(e)} = (R_f^{-1})^j{}_k V^k_{(f)}$, co da $[F_{(g)(f)}]^j{}_k = [F_{(g)(e)}]^j{}_l (R_f^{-1})^l{}_k$, czyli jawnie (biorąc macierz $(R_f^{-1})^l{}_k$ z poprzedniego zadania)

$$F_{(g)(f)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & \frac{4}{3} & 2 & 1 \\ -\frac{15}{2} & -\frac{25}{6} & -4 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{16}{3} & \frac{10}{3} & 3 & 1 \\ -\frac{35}{3} & -\frac{49}{6} & -\frac{9}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} .$$

Tę samą macierz $F_{(g)(f)}$ można także otrzymać z macierzy $F_{(e)(f)}$ znalezionej w poprzednim zadaniu: $[F_{(g)(f)}]^j{}_k = (R_g)^j{}_l [F_{(e)(f)}]^l{}_k$ czyli

$$F_{(g)(f)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ -\frac{1}{6} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 18 & 12 & 9 & 3 \\ 1 & 0 & 3 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{16}{3} & \frac{10}{3} & 3 & 1 \\ -\frac{35}{3} & -\frac{49}{6} & -\frac{9}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} .$$

Sprawdźmy to wszystko na naszym wielomianie $W = 2x^3 - 3x^2 + 7$, który w bazie $\mathbf{e}_j$ miał składowe $(7, 0, -3, 2)$. Działając na te składowe macierzą $F_{(g)(e)}$ dostajemy

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & \frac{4}{3} & 2 & 1 \\ -\frac{15}{2} & -\frac{25}{6} & -4 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 24 \\ -\frac{83}{2} \end{pmatrix} ,$$

to jest składowe $F[\mathbf{W}]$ w bazie $\mathbf{g}_j$. Zatem

$$F[\mathbf{W}] = 0 \cdot \mathbf{g}_0 + 24 \cdot \mathbf{g}_1 - \frac{83}{2} \cdot \mathbf{g}_2 = 24 \cdot (3x + 4x^2) - \frac{83}{2} \cdot (2x^2) = 72x + 13x^2 ,$$

tak, jak być powinno ($F[\mathbf{W}]$ jest wektorem i nie może zależeć od wyboru baz, które są czymś pomocniczym jedynie). Podobnie, działając macierzą $F_{(g)(f)}$ na znalezione w poprzednim zadaniu składowe $(7, -7, 4, -2)$ naszego wielomianu W w bazie $\mathbf{f}_j$ otrzymujemy

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{16}{3} & \frac{10}{3} & 3 & 1 \\ -\frac{35}{2} & -\frac{49}{6} & -\frac{9}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 \\ -7 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 24 \\ -\frac{83}{2} \end{pmatrix} ,$$

czyli te same składowe $F[\mathbf{W}]$ w bazie $\mathbf{g}_j$.

Zadanie 25
Pewne odwzorowanie liniowe G z R^3 w R^3 jest takie, że

$$G\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} , \qquad G\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} , \qquad G\left(\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix} .$$

Znaleźć macierz $G_{(e)(e)}$ tego odwzorowania w bazie kanonicznej

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} , \qquad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} , \qquad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} .$$

Znaleźć także wynik działania

$$G\left(\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}\right) .$$

Odp.: Dla porządku trzeba najpierw sprawdzić, czy wektory

$$\mathbf{f}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} , \qquad \mathbf{f}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} , \qquad \mathbf{f}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} ,$$

na których zadane jest działanie G są liniowo niezależne. Jeśli są, to rozpinają całą przestrzeń R^3 i mogą być jej bazą. W takim przypadku zadanie działania odwzorowania G na tych trzech wektorach wyznacza już działanie G na każdy wektor z przestrzeni będącej dziedziną G, bo każdy wektor z tej dziedziny można zapisać jako kombinację liniową trzech wektorów, na których działanie G jest zadane. Gdyby się okazało (ale się nie okaże), że trzy wektory $\mathbf{f}_i$, na których działanie G jest zadane są liniowo zależne, to trzeba by sprawdzić, czy takie zdefiniowanie G jest niesprzeczne, tzn. czy spełniona jest liniowość; nie dało by się jednak wtedy znaleźć całej macierzy odwzorowania G w żadnej bazie. (Niemniej, nawet jeśli trzy wektory $\mathbf{f}_i$ nie rozpinały by całej dziedziny G nie przekreślałoby to z góry możliwości znalezienia wartości G na podanym w zadaniu wektorze, bo mogłoby się okazać, że akurat ten wektor jest liniową kombinacją tych, na których G jest zadane. Dopiero, gdyby ten wektor nie był liniowo zależny od tych, na których działanie G jest zadane, druga część zadania nie mogłaby być rozwiązana). Równanie $\lambda_1\mathbf{f}_1 + \lambda_2\mathbf{f}_2 + \lambda_3\mathbf{f}_3 = 0$ daje układ równań

$$\begin{aligned} \lambda_1 + \lambda_2 - \lambda_3 &= 0 \ , \\ \lambda_1 + 2\lambda_2 + \lambda_3 &= 0 \ , \\ \lambda_1 - \lambda_2 &= 0 \ . \end{aligned}$$

Z trzeciego $\lambda_2 = \lambda_1$ do pierwszego i drugiego, co da układ dwu równań $2\lambda_1 - \lambda_3 = 0$ oraz $3\lambda_1 + \lambda_3 = 0$, czyli $5\lambda_1 = 0$ etc. Widać, że jedynym rozwiązaniem jest $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$, czyli wektory $\mathbf{f}_i$ są liniowo niezależne. To samo możemy sprawdzić gdy chodzi o wektory

$$\mathbf{g}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} \ , \qquad \mathbf{g}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} \ , \qquad \mathbf{g}_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix} \ .$$

Równanie $\xi_1\mathbf{g}_1 + \xi_2\mathbf{g}_2 + \xi_3\mathbf{g}_3 = 0$ daje układ równań

$$\begin{aligned} 3\xi_1 + \xi_2 - \xi_3 &= 0 \ , \\ 2\xi_1 + \xi_2 + \xi_3 &= 0 \ , \\ 2\xi_1 + 4\xi_2 - 3\xi_3 &= 0 \ , \end{aligned}$$

też ma tylko rozwiązanie $\xi_1 = \xi_2 = \xi_3 = 0$, czyli - jak się tego kiedyś dowiemy - odwzorowanie G jest *nieosobliwe* bo przeprowadza R^3 w cała R^3 (ma więc trywialne jądro do którego należy tylko wektor zerowy). Zatem w bazach: $\mathbf{f}_i$ dla wektorów odwzorowywanych i $\mathbf{g}_j$ dla wektorów będących wynikiem odwzorowania macierz G ma postać trywialną

$$G_{(g)(f)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \ .$$

Oznacza to, że jeśli $G[\mathbf{V}] = \mathbf{X}$ i $\mathbf{V} = \mathbf{f}_i V^i_{(f)}$, a $\mathbf{X} = \mathbf{g}_j X^j_{(g)}$, to macierz $G_{(g)(f)}$ daje $X^i_{(g)}$ z $V^i_{(f)}$: $X^j_{(g)} = [G_{(g)(f)}]^j{}_i V^i_{(f)}$.

Jeśli teraz $\mathbf{f}_i = \mathbf{e}_k (R_f^{-1})^k{}_i$ to $V^k_{(e)} = (R_f^{-1})^k{}_i V^i_{(f)}$ i odwrotnie, $V^i_{(f)} = (R_f)^i{}_k V^k_{(e)}$. W podobny sposób jeśli $\mathbf{g}_i = \mathbf{e}_k (R_g^{-1})^k{}_i$ to $X^k_{(e)} = (R_g^{-1})^k{}_i X^i_{(g)}$ i odwrotnie, $X^i_{(g)} = (R_g)^i{}_k X^k_{(e)}$. Jeśli więc znajdziemy macierze R_g^{-1} i R_f to będziemy mogli napisać

$$X^k_{(e)} = (R_g^{-1})^k{}_i X^i_{(g)} = (R_g^{-1})^k{}_i [G_{(g)(f)}]^i{}_j V^j_{(f)} = (R_g^{-1})^k{}_i [G_{(g)(f)}]^i{}_j (R_f)^j{}_l V^l_{(e)} \equiv [G_{(e)(e)}]^k{}_l V^l_{(e)} \ .$$

Zatem $[G_{(e)(e)}]^k{}_l = (R_g^{-1})^k{}_i [G_{(g)(f)}]^i{}_j (R_f)^j{}_l$. Aby więc znaleźć macierz $G_{(e)(e)}$ odwzorowania G w bazie kanonicznej trzeba znaleźć macierze R_g^{-1} oraz R_f. Pierwsza jest banalna, bo mamy dane wektorki $\mathbf{g}_i = F[\mathbf{f}_i]$: np. $\mathbf{g}_1 = 3\mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2 + 2\mathbf{e}_3$, etc. Stąd

$$R_g^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & -3 \end{pmatrix} \ .$$

Podobnie banalnie jest dana macierz R_f^{-1}:

$$R_f^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \ ,$$

ale my potrzebujemy R_f. Musimy więc rozwiązać układ równań wektorowych

$$\begin{aligned} \mathbf{f}_1 &= \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3 \ , \\ \mathbf{f}_2 &= \mathbf{e}_1 + 2\mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_3 \ , \\ \mathbf{f}_3 &= -\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 \ . \end{aligned}$$

Od drugiego odjąć pierwsze: $\mathbf{e}_2 - 2\mathbf{e}_3 = \mathbf{f}_2 - \mathbf{f}_1$. Do drugiego dodać trzecie: $3\mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_3 = \mathbf{f}_2 + \mathbf{f}_3$. Dalej już łatwo:

$$\begin{aligned} 3\mathbf{e}_2 - 6\mathbf{e}_3 &= 3\mathbf{f}_2 - 3\mathbf{f}_1 \ , & \mathbf{e}_2 - 2\mathbf{e}_3 &= \mathbf{f}_2 - \mathbf{f}_1 \ , \\ 3\mathbf{e}_2 - \mathbf{e}_3 &= \mathbf{f}_2 + \mathbf{f}_3 \ , & 6\mathbf{e}_2 - 2\mathbf{e}_3 &= 2\mathbf{f}_2 + 2\mathbf{f}_3 \ . \end{aligned}$$

Stąd: $5\mathbf{e}_3 = 3\mathbf{f}_1 - 2\mathbf{f}_2 + \mathbf{f}_3$ oraz $5\mathbf{e}_2 = \mathbf{f}_1 + \mathbf{f}_2 + 2\mathbf{f}_3$ i teraz $\mathbf{e}_1 = \frac{1}{5}(5\mathbf{f}_1 - \mathbf{f}_1 - \mathbf{f}_2 - 2\mathbf{f}_3 - 3\mathbf{f}_1 + 2\mathbf{f}_2 - \mathbf{f}_3)$. Ostatecznie mamy

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_1 &= \frac{1}{5}\left(\mathbf{f}_1 + \mathbf{f}_2 - 3\mathbf{f}_3\right) \ , \\ \mathbf{e}_2 &= \frac{1}{5}\left(\mathbf{f}_1 + \mathbf{f}_2 + 2\mathbf{f}_3\right) \ , \\ \mathbf{e}_3 &= \frac{1}{5}\left(3\mathbf{f}_1 - 2\mathbf{f}_2 + \mathbf{f}_3\right) \ , \end{aligned}$$

czyli macierz R_f ma postać

$$R_f = \frac{1}{5}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -2 \\ -3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \ .$$

Aby sprawdzić, czy się nie pomyliliśmy w rachunkach i przećwiczyć mnożenie macierzy sprawdzamy

$$R_f^{-1}\cdot R_f=\begin{pmatrix}1&1&-1\\1&2&1\\1&-1&0\end{pmatrix}\cdot\frac{1}{5}\begin{pmatrix}1&1&3\\1&1&-2\\-3&2&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\ .$$

W drugą stronę też można sprawdzić:

$$R_f\cdot R_f^{-1}=\frac{1}{5}\begin{pmatrix}1&1&3\\1&1&-2\\-3&2&1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1&1&-1\\1&2&1\\1&-1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\ .$$

No to świetnie. Zatem możemy już znaleźć macierz $G_{(e)(e)}$ odwzorowania G w bazie kanonicznej $\mathbf{e}_i$: $[G_{(e)(e)}]^k{}_l=(R_g^{-1})^k{}_i[G_{(g)(f)}]^i{}_j(R_f)^j{}_l=(R_g^{-1})^k{}_i(R_f)^i{}_l$ ponieważ $[G_{(g)(f)}]^i{}_j=\delta^i{}_j$. Czyli macierzowo

$$G_{(e)(e)}=\begin{pmatrix}3&-1&-1\\2&1&1\\2&4&-3\end{pmatrix}\cdot\frac{1}{5}\begin{pmatrix}1&1&3\\1&1&-2\\-3&2&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&1\\3&0&-1\end{pmatrix}\ .$$

Jeśli mamy już $[G_{(e)(e)}]$ w bazie kanonicznej $\mathbf{e}_1$, $i=1,2,3$, to możemy łatwo znaleźć działa nie G na wektor

$$\mathbf{w}=\begin{bmatrix}2\\0\\-1\end{bmatrix}\ .$$

W bazie kanonicznej ma on oczywiste składowe $(2,0,-1)$ a zatem współrzędne (składowe) wektora $G(\mathbf{w})$ w bazie kanonicznej są dane przez

$$\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&1\\3&0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\0\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\-1\\7\end{pmatrix}\ .$$

Wspomniana wyżej nieosobliwość odwzorowania G odbija się w tym, że wyznacznik

$$\det\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&1\\3&0&-1\end{pmatrix}\equiv\begin{vmatrix}1&0&2\\0&1&1\\3&0&-1\end{vmatrix}=-7\ ,$$

który jest różny od zera. W konsekwencji (jak się tego dowiemy) $\mathrm{Ker}(G)=\{\mathbf{0}\}$ (jądro odwzorowania jest trywialne). Innym sposobem znalezienia $G(\mathbf{w})$ jest rozłożenie $\mathbf{w}$ w bazie wektorów $\mathbf{f}_i$, $i=1,2,3$, na których działanie G zostało zadane, tzn. znalezienie współczynników y_i, $i=1,2,3$ we wzorze

$$y_1\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}+y_2\begin{bmatrix}1\\2\\-1\end{bmatrix}+y_3\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\0\\-1\end{bmatrix}\ .$$

Łatwy rachunek daje $y_1 = -\frac{1}{5}$, $y_2 = \frac{4}{5}$, $y_3 = -\frac{7}{5}$. Zatem korzystając z liniowości odwzorowania G możemy napisać:

$$G\left(\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}\right) = -\frac{1}{5}G\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) + \frac{4}{5}G\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}\right) - \frac{7}{5}G\left(\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right)$$
$$= -\frac{1}{5}\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} + \frac{4}{5}\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} - \frac{7}{5}\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 7 \end{bmatrix} ,$$

tak jak poprzednio.

Zadanie 26
Dane są dwie macierze

$$F = (\,1 \quad 2 \quad 3\,) , \qquad \text{i} \qquad G = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} .$$

Znaleźć iloczyny $F \cdot G$ i $G \cdot F$.
Odp.: Macierz F jest macierzą odwzorowania $F : R^3 \to R^1$, macierz zaś G - macierzą odwzorowania $G : R^1 \to R^3$; obie one są dane w jakichś bazach. Aby mnożenia miały sens trzeba przyjąć, że odpowiednie bazy są zgodne. W notacji wprowadzonej w poprzednich zadaniach powinno być tak

$$F \cdot G \equiv F_{(g')(f)} \cdot G_{(f)(g)} = (\,1 \quad 2 \quad 3\,)\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = (14) ,$$
$$G \cdot F \equiv G_{(f')(g)} \cdot G_{(g)(f)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}(\,1 \quad 2 \quad 3\,) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} .$$

Macierz $F \cdot G$ jest macierzą odwzorowania z R^1 w R^1 i wtedy bazami $\mathbf{g}_i$, gdzie $i = 1$ i $\mathbf{g}'_i$ z $i = 1$ mogą np. być bazy kanoniczne R^1 [1] (ale nie muszą), a baza $\mathbf{f}_i$ z $i = 1, 2, 3$ przestrzeni R^3 w której danaj jest macierz $G_{(f)(g)}$ musi być (żeby mnożenie macierzy miało sens) tą samą bazą w przestrzeni R^3, w której jest dana macierz F. Z kolei macierz $G \cdot F$ jest macierzą odwzorowania z R^3 w R^3 i żeby mnożenie miało sens nie musimy zakładać, że bazy $\mathbf{f}_i$ z $i = 1, 2, 3$ i $\mathbf{f}'_i$ z $i = 1, 2, 3$ są tą samą bazą, ale musimy założyć, że baza w przestrzeni R^1 w której dane są macierze F i G jest ta sama.
Uwaga: Odwzorowanie liniowe takie jak F z przestrzeni wektorowej (np. R^3) w przestrzeń wektorową, którą można utożsamić z ciałem (np. R^1, jak tutaj lub C^1) nazywa się *kowektorem* lub *jednoformą* (oczywiście, skoro istnieją jednoformy, to należy domniemywać, że są też i dwu- i więcej-formy; istotnie, są, i to prowadzi do teorii form różniczkowych i innych cudów matematyki z nimi związanych).

Przypomnienie. Wyznacznikiem macierzy kwadratowej (dla macierzy niekwadratowych wyznacznika nie można określić!)

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} ,$$

nazywamy liczbę (z ciała, z którego są elementy a_{ij} macierzy A) daną wzorem

$$\det A \equiv \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{\pi} \mathrm{sgn}(\pi)\, a_{1\pi(1)} a_{2\pi(2)} \dots a_{n\pi(n)} \ .$$

Jest to suma $n!$ składników, z których każdy jest iloczynem n czynników będących pewnymi elementami macierzy A. $\mathrm{sgn}(\pi)$ jest znakiem permutacji π czyli $(-1)^k$, gdzie k jest równe liczbie pierestanowok potrzebnych do ustawienia ciągu liczb $\pi(1), \pi(2), \pi(3), \dots, \pi(n)$ w porządku $1, 2, 3, \dots, n$.
Ważne by zauważyć, iż w każdym składniku $a_{1\pi(1)} a_{2\pi(1)} \dots a_{n\pi(1)}$ sumy definiującej wyznacznik występuje po jednym elemencie z każdej kolumny i po jednym elemencie z każdego wiersza macierzy A.

Wygodnie jest też traktować czasem wyznacznik jak funkcję kolumn $\mathbf{C}_i$, $i = 1, \dots, n$ macierzy

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} = (\mathbf{C}_1\ \mathbf{C}_2\ \dots \mathbf{C}_n) \ ,$$

a kolumny z kolei $\mathbf{C}_i$, $i = 1, \dots, n$ traktować jak wektory z R^n

$$\mathbf{C}_1 = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \dots \\ a_{n1} \end{bmatrix} , \qquad \mathbf{C}_2 = \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \dots \\ a_{n2} \end{bmatrix} , \qquad \dots , \quad \mathbf{C}_n = \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \dots \\ a_{nn} \end{bmatrix} .$$

Właściwości wyznacznika

- $\det A = \det A^T$, gdzie macierz transponowaną A^T tworzy się z A przez odbicie elementów A symetrycznie względem diagonali wyznaczonej przez elementy a_{kk}:

$$A^T = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{n2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} ,$$

  Z tego wynika również, że wyznacznik można traktować jak fukcję wierszy $\mathbf{R}_1$, ..., $\mathbf{R}_n$ macierzy A, które to wiersze też można uważać za wektory z R^n

- jeśli choć jeden wiersz lub choć jednak kolumna macierzy A składa się z samych zer to $\det A = 0$

- zamiana miejscami dwu kolumn lub dwu wierszy macierzy A zmienia znak wyznacznika (wyznacznik jest całkowicie antysymetryczną funkcją kolumn i wierszy macierzy A)

$$\det(\mathbf{C}_1 \ \dots \mathbf{C}_k \ \dots \mathbf{C}_l \ \dots \mathbf{C}_n) = -\det(\mathbf{C}_1 \ \dots \mathbf{C}_l \ \dots \mathbf{C}_k \ \dots \mathbf{C}_n) \ ,$$

  dla dowolnych $1 \leq k, l \leq n$

- jeśli wszystkie elementy jednej z kolumn A lub wszystkie elementy jednego z wierszy A pomnożyć przez λ to wyznacznik też ulegnie pomnożeniu przez λ

$$\det(\mathbf{C}_1 \ \dots \lambda\mathbf{C}_k \ \dots \mathbf{C}_n) = \lambda \det(\mathbf{C}_1 \ \dots \mathbf{C}_k \ \dots \mathbf{C}_n) \ ,$$

- wyznacznik jest liniową funkcją każdej z kolumn (każdego z wierszy):

$$\det\left(\mathbf{C}_1 \ \dots \lambda_{(1)}\mathbf{C}_k^{(1)} + \lambda_{(2)}\mathbf{C}_k^{(2)} \ \dots \mathbf{C}_n\right) = \lambda_{(1)} \det\left(\mathbf{C}_1 \ \dots \mathbf{C}_k^{(1)} \ \dots \mathbf{C}_n\right) + \lambda_{(2)} \det\left(\mathbf{C}_1 \ \dots \mathbf{C}_k^{(2)} \ \dots \mathbf{C}_n\right)$$

- wyznacznik nie zmienia się jeśli jedną z jego kolumn (lub wiersz) zastąpić sumą tejże kolumy (wiersza) i dowolnej innej kolumny (wiersza) pomnożonej przez dowolną liczbę

$$\det\left(\mathbf{C}_1 \ \dots \tilde{\mathbf{C}}_k \ \dots \mathbf{C}_n\right) = \det(\mathbf{C}_1 \ \dots \mathbf{C}_k \ \dots \mathbf{C}_n) \ ,$$

  gdzie $\tilde{\mathbf{C}}_k = \mathbf{C}_k + \sum_{j \neq k} \lambda_j \mathbf{C}_j$

W istocie rzeczy, wyznacznik znika (tj. równa się zeru) zawsze gdy wektory $\mathbf{C}_i$, $i = 1, n$ tworzące kolumny (lub wiersze) macierzy A są *liniowo zależne*.

Przykłady

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}\dots a_{nn} \ ,$$

co wynika z tego, że w składnikach sumy występuje tylko po jednym elemencie z każdej kolumny i po jednym elemencie z każdego wiersza macierzy A. Stąd wyznacznik macierzy jednostkowej jest równy zawsze 1.

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -1 \ ,$$

bo trzeba zamienić miejscami kolumny drugą i czwartą.

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 7 & 1 & 2 \\ a & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 0 \ ,$$

bo odejmując od czwartej kolumy dwa razy trzecię dostajemy zerową czwartą kolumnę.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix}$$
$$= 2 \cdot 3 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 24 \ ,$$

gdzie w pierwszym kroku od kolumn drugiej, trzeciej i czwartej odjęliśmy pierwszą, potem wyprowadziliśmy czynnik 2 przed wyznacznik, potem od kolumn trzeciej i czwartej odjęliśmy kolumnę drugą, potem wyprowadziliśmy czynnik 3 przed etc.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 6 \ .$$

Najpierw od kolumn drugiej, trzeciej i czwartej odjęliśmy pierwszą, a potem zauważyliśmy, że wynik wynika już z tego, iż w składnikach sumy dającej wyznacznik występuje tylko po jednym elemencie z każdej kolumny i po jednym elemencie z każdego wiersza.

Wzory jawne. Wyznacznik macierzy 2×2

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12} \ .$$

Wyznacznik macierzy 3×3

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{21}a_{32}a_{13} - a_{31}a_{22}a_{13} - a_{11}a_{32}a_{23} - a_{33}a_{21}a_{12} \ .$$