

Zadania domowe z Teorii Grup w Fizyce 2026, seria 1

Zad.1 Dla dowolnych dwóch liczb rzeczywistych różnych od -1 dwuargumentowe działanie \circ zdefiniowane jest w następujący sposób

$$(x, y) \mapsto x \circ y = \alpha(x + y + xy) + \beta, \quad x, y \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$$

gdzie $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ oraz $\alpha \neq 0$.

- Dla jakich α, β działanie \circ jest dobrze określone w zbiorze $A = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$?
- Dla jakich α, β działanie \circ jest łączne?
- Pokazać, że w zbiorze A z dobrze określonym i łącznym działaniem \circ można wprowadzić strukturę grupy.

Zad.2 W zbiorze \mathbb{Z} liczb całkowitych definiujemy działanie \heartsuit następująco: $x \heartsuit y = x + (-1)^x y$. Sprawdzić, czy $(\mathbb{Z}, \heartsuit, 0)$ jest grupą. Jeśli tak to czy jest to grupa abelowa?

Zad.3 Niech H_1 i H_2 będą podgrupami grupy G . Pokazać, iż relacja

$$a \sim a' \Leftrightarrow \text{Istnieją elementy } b_1 \in H_1 \text{ i } b_2 \in H_2 \text{ takie, że } a' = b_1 a b_2$$

jest relacją równoważności w G ; klasy równoważności ze względu na tę relację nazywają się podwójnymi warstwami.

Zad.4 Ile elementów posiada grupa G generowana przez 2 elementy a i b , które spełniają następujące relacje: $a^{-1} b a = b^2$, $b^{-1} a b = a^2$?

Zad.5 Niech $a \in G$ będzie elementem rzędu 5 i $b \in G$ elementem różnym od neutralnego. Jaki rząd ma element b jeśli $a^{-1} b a = b^2$?

Zad.6 Dana jest grupa $G = \{1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14\}$ z mnożeniem modulo 15. Czy jest to grupa abelowa? Czy można ją przedstawić jako iloczyn dwóch grup? Jaka to grupa?

Zad.7 Pokazać, że jeśli k jest liczbą nieparzystą, to kwadrat k -cyklu jest cyklem. Znaleźć kwadrat cykli: (12345678) i (123456789) .

Zad.8 Znaleźć centrum grupy Heisenberga składającej się ze wszystkich macierzy postaci

$$\begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{gdzie } a, b, c \in \mathbb{C}.$$

Zad.9 Pokazać, że grupa D_3 wszystkich symetrii trójkąta równobocznego jest izomorficzna grupie S_3 .

Zad.10 Jaką grupę tworzy zbiór następujących odwzorowań: $f_i : \bar{\mathbb{C}} \rightarrow \bar{\mathbb{C}}$, gdzie

- $f_1 : z \mapsto z$, $f_2 : z \mapsto \frac{1}{z}$, $f_3 : z \mapsto -z$, $f_4 : z \mapsto -\frac{1}{z}$?
 - $f_1 : z \mapsto z$, $f_2 : z \mapsto \frac{1}{z}$, $f_3 : z \mapsto 1 - z$, $f_4 : z \mapsto \frac{z}{z-1}$, $f_5 : z \mapsto \frac{1}{1-z}$, $f_6 : z \mapsto \frac{z-1}{z}$?
- Działaniem jest składanie odwzorowań.

Zad.11 Grupa Pauliego \mathcal{P} jest to grupa, o jedności oznaczonej przez 1, generowana przez 4 elementy $\varepsilon, e_1, e_2, e_3$, spełniające następujące relacje

$$\varepsilon^2 = 1, \quad e_i^2 = 1, \quad \varepsilon e_i = e_i \varepsilon \quad i = 1, 2, 3$$

oraz $e_i e_j = \varepsilon e_j e_i$ dla $i \neq j = 1, 2, 3$.

Jaki jest rząd grupy Pauliego \mathcal{P} ? Zapisać wszystkie elementy \mathcal{P} przy użyciu generatorów. Znaleźć klasy elementów sprzężonych w \mathcal{P} .

Zad.12 Niech $\rho_{\mu\nu}$ będą elementami macierzowymi nieprzywiedlnej reprezentacji ρ skończonej grupy G . Obliczyć $\sum_{a \in G} \rho_{\mu\nu}(a)$.

Zad.13 Niech χ będzie charakterem reprezentacji skończonej grupy G , a g elementem rzędu 2. Pokazać, że $\chi(g)$ jest liczbą całkowitą oraz

$$\chi(g) \equiv \chi(e) \pmod{2}.$$

Zad.14 Niech χ będzie nieprzywiedlnym charakterem skończonej grupy G , a $z \in Z(G)$ będzie elementem rzędu m . Udowodnić, że istnieje m -ty pierwiastek z jedynki $\lambda \in \mathbb{C}$ taki, że zachodzi relacja

$$\chi(zg) = \lambda\chi(g), \quad \forall g \in G.$$

Zad.15 Niech χ będzie charakterem reprezentacji grupy G . Pokazać, że $(\chi_{reg}|\chi) = \chi(e)$.

Zad.16 Niech χ będzie charakterem reprezentacji ρ grupy G . Co możemy powiedzieć o rozkładzie ρ na sumę prostą reprezentacji nieprzywiedlnych jeśli $(\chi|\chi) = 1, 2, 3, 4$?

Zad.17 Wyznaczyć wymiary wszystkich nieprzywiedlnych, zespolonych reprezentacji grupy S_5 . *Wskazówka:* Istnieją dwie nierównoważne 5 wymiarowe reprezentacje nieprzywiedlne.