

# Algebry i grupy Liego

Jan Dereziński

Katedra Metod Matematycznych Fizyki  
Uniwersytet Warszawski  
Hoża 74, 00-682, Warszawa  
e-mail jan.derezinski@fuw.edu.pl

8 września 2019

## Spis treści

<b>1</b>	<b>Algebry</b>	<b>6</b>
1.1	Definicja . . . . .	6
1.2	Podalgebry . . . . .	6
1.3	Homomorfizmy . . . . .	6
1.4	Ideały . . . . .	7
<b>2</b>	<b>Algebry Liego</b>	<b>7</b>
2.1	Definicja . . . . .	7
2.2	Reprezentacje algebr Liego . . . . .	8
2.3	Różniczkowania . . . . .	8
2.4	Ideały i ideały charakterystyczne . . . . .	9
2.5	Iloczyn półprosty . . . . .	10
2.6	Afiniczne algebry Liego . . . . .	11
2.7	Związek zespolonych i rzeczywistych przestrzeni wektorowych . . . . .	11
2.8	Związek zespolonych i rzeczywistych algebr Liego . . . . .	12
2.9	Formy niezmiennicze na algebrze Liego . . . . .	12
2.10	Algebry półproste i reduktywne . . . . .	14
<b>3</b>	<b>Grupy Liego i ich algebry Liego</b>	<b>16</b>
3.1	Rozmaitości . . . . .	16
3.2	Wektory styczne . . . . .	16
3.3	Pola wektorowe . . . . .	16
3.4	Pola wektorowe definiujące potok . . . . .	17
3.5	Algebra Liego grupy Liego . . . . .	18
3.6	Odwzorowanie eksponencjalne . . . . .	19
3.7	Odwzorowanie pochodne . . . . .	20

<b>4</b>	<b>Klasyczne algebry i grupy Liego</b>	<b>20</b>
4.1	Algebra Liego macierzy bezśladowych . . . . .	20
4.2	Formy niezmiennicze . . . . .	21
4.3	Ortogonalne i pseudoortogonalne algebra Liego . . . . .	21
4.3.1	Abstrakcyjne podejście . . . . .	21
4.3.2	Kanoniczna forma . . . . .	21
4.3.3	Forma o sygnaturze $(q, p)$ . . . . .	22
4.4	Unitarne i pseudounitarne algebry Liego . . . . .	22
4.4.1	Abstrakcyjne podejście . . . . .	22
4.4.2	Kanoniczna forma . . . . .	22
4.4.3	Forma o sygnaturze $(q, p)$ . . . . .	23
4.5	Symplektyczna algebra Liego . . . . .	23
4.6	Przemienne grupy i algebry Liego . . . . .	23
<b>5</b>	<b>Iloczyn tensorowy</b>	<b>23</b>
5.1	Symetryczny i antysymetryczny iloczyn tensorowy . . . . .	23
5.2	Second quantization of operators . . . . .	25
5.3	Prawo eksponencjalne dla przestrzeni Focka . . . . .	25
5.4	Utożsamienie iloczynu tensorowego i operatorów liniowych . . . . .	26
<b>6</b>	<b>Zwarte grupy i ich reprezentacje</b>	<b>27</b>
6.1	Reprezentacje . . . . .	27
6.2	Reprezentacja kontragradientna . . . . .	27
6.3	Iloczyn reprezentacji i reprezentacji kontragradientnej . . . . .	28
6.4	Istnienie miary Haara i jego konsekwencje . . . . .	28
6.5	Reprezentacje nieprzywiedlne . . . . .	29
6.6	Rozkład dowolnej reprezentacji . . . . .	30
6.7	Rozkład iloczynu tensorowego reprezentacji . . . . .	32
6.8	Przykład: $\mathbb{Z}_n$ . . . . .	32
6.9	Przykład: $\mathbb{T} := \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ . . . . .	33
6.10	Przykład: $S_3$ . . . . .	33
<b>7</b>	<b><math>SL(2, \mathbb{C})</math> i <math>SU(2)</math> i ich reprezentacje</b>	<b>33</b>
7.1	Algebra wielomianów . . . . .	33
7.2	Reprezentacje $SL(2, \mathbb{C})$ , $sl(2, \mathbb{C})$ , $SU(2)$ , $su(2)$ . . . . .	34
7.3	$sl(2, \mathbb{C})$ i $su(2)$ . . . . .	35
7.4	$so(3, \mathbb{C})$ i $SO(3, \mathbb{C})$ . . . . .	36
7.5	Skończenie wymiarowe reprezentacje $sl(2, \mathbb{C})$ . . . . .	36
7.6	Reprezentacje unitarne $su(2)$ . . . . .	38
7.7	Reprezentacje $SL(2, \mathbb{C})$ i $SU(2)$ . . . . .	39
7.8	$SL(2, \mathbb{C})$ jako sfera zespolona . . . . .	40
7.9	$SU(2)$ jako sfera rzeczywista . . . . .	40
7.10	Kąty Eulera . . . . .	41
7.11	$D$ -macierze Wignera . . . . .	42

7.12	Typ reprezentacji grupy $SL(2, \mathbb{C})$ . . . . .	43
7.13	Miara Haara na $SU(2)$ . . . . .	44
7.14	Charaktery reprezentacji $SU(2)$ . . . . .	44
7.15	Współczynniki Clebscha-Gordana . . . . .	45
7.16	$3j$ -symbole . . . . .	46
7.17	Iloczyn tensorowy z reprezentacją o spinie $\frac{1}{2}$ . . . . .	49
<b>8</b>	<b>Kwaterniony</b> . . . . .	<b>50</b>
8.1	Definicje . . . . .	50
8.2	Zanurzanie liczb zespolonych w kwaternionach . . . . .	51
8.3	Macierzowa reprezentacja kwaternionów . . . . .	51
8.4	Wyznacznik kwaternionowy . . . . .	52
8.5	Rzeczywiste proste algebry . . . . .	52
8.6	Kwaternionowe przestrzenie wektorowe . . . . .	52
<b>9</b>	<b>Koincydencje wśród grup macierzowych</b> . . . . .	<b>53</b>
9.1	$SL(2, \mathbb{K}) = Sp(1, \mathbb{K})$ . . . . .	53
9.2	$SU(2)/\mathbb{Z}_2 \simeq SO(3)$ . . . . .	54
9.3	$SL(2, \mathbb{R})/\mathbb{Z}_2 \simeq SO_0(1, 2)$ , $SL(2, \mathbb{C})/\mathbb{Z}_2 \simeq SO(3, \mathbb{C})$ , . . . . .	54
9.4	$SL(2, \mathbb{C})/\mathbb{Z}_2 \simeq SO_0(1, 3)$ . . . . .	55
9.5	$(SL(2, \mathbb{R}) \times SL(2, \mathbb{R}))/\mathbb{Z}_2 \simeq SO_0(2, 2)$ , $(SL(2, \mathbb{C}) \times SL(2, \mathbb{C}))/\mathbb{Z}_2 \simeq SO(4, \mathbb{C})$ , . . . . .	55
9.6	$(SU(2) \times SU(2))/\mathbb{Z}_2 \simeq SO(4)$ . . . . .	56
<b>10</b>	<b>Struktura klasycznych prostych algebr Liego</b> . . . . .	<b>57</b>
10.1	Reprezentacje przemiennej algebry Liego . . . . .	57
10.2	Proste algebry Liego . . . . .	57
10.3	Pierwiastki i wagi . . . . .	58
10.4	$sl(n, \mathbb{C})$ . . . . .	58
10.5	$so(n, \mathbb{C})$ . . . . .	60
10.6	$so(2m)$ . . . . .	60
10.7	$so(2m + 1)$ . . . . .	61
10.8	$sp(2m, \mathbb{C})$ . . . . .	62
10.9	Koincydencje . . . . .	63
<b>11</b>	<b>Grupa <math>SU(3)</math> i jej zastosowanie w fizyce cząstek</b> . . . . .	<b>63</b>
11.1	Reprezentacje $su(3)$ . . . . .	63
11.2	Algebra Cartana . . . . .	64
11.3	Wagi reprezentacji . . . . .	65
11.4	Reprezentacja fundamentalna i antyfundamentalna . . . . .	65
11.5	Pierwiastki . . . . .	65
11.6	Triadność . . . . .	66
11.7	Pierwiastki ujemne i dodatnie . . . . .	66
11.8	Diagramy wagowe przykładowych reprezentacji . . . . .	67
11.9	Symetrie w mechanice kwantowej . . . . .	68

11.10	Konwencje . . . . .	68
11.11	Zachowane ładunki . . . . .	68
11.12	Izospin . . . . .	69
11.13	Dziwność . . . . .	70
11.14	Kwarki . . . . .	71
<b>12</b>	<b>Algebry Clifforda i grupy Spin</b>	<b>73</b>
12.1	Algebry Clifforda . . . . .	73
12.2	Algebry Clifforda jako *-algebry . . . . .	74
12.3	Parzyste algebry Clifforda . . . . .	74
12.4	Element objętości . . . . .	75
12.5	Konstrukcja Jordana-Wignera . . . . .	75
12.6	Reprezentacja Foka algebry Clifforda . . . . .	76
12.7	Postać algebr Clifforda . . . . .	77
12.8	Grupa Pin i Spin . . . . .	78
12.9	Koincydencje niskowymiarowe . . . . .	79
12.10	Reprezentacje grupy $Spin(n)$ . . . . .	80
<b>13</b>	<b>Zastosowanie teorii grup w modelu standardowym i modelach wielkiej unifikacji</b>	<b>80</b>
13.1	Model standardowy . . . . .	80
13.2	Leptony . . . . .	81
13.3	Skalar Higgsa . . . . .	82
13.4	Kwarki . . . . .	82
13.5	Lagranżjan modelu standardowego . . . . .	83
13.6	$SU(n)$ . . . . .	84
13.7	Rozszerzanie $SU(3) \otimes SU(2) \times U(1)$ do $SU(5)$ . . . . .	84
13.8	Pola w GUT opartej na $SU(5)$ . . . . .	85
13.9	Rozszerzanie $SU(3) \otimes SU(2) \times U(1)$ do $Spin(10)$ . . . . .	85
13.10	Rozszerzanie $SU(3) \otimes SU(2) \times U(1)$ do $SU(2) \times SU(2) \times SU(4)$ . . . . .	86
<b>14</b>	<b>Struktura algebr Liego</b>	<b>86</b>
14.1	Nilpotentne i rozwiązalne algebry Liego . . . . .	86
14.2	Twierdzenie Liego . . . . .	88
14.3	Dolny ciąg centralny . . . . .	90
14.4	Kryteria Cartana rozwiązalności . . . . .	91
14.5	Algebry półproste i reduktywne a algebry rozwiązalne . . . . .	93
14.6	Operator Casimira . . . . .	94
14.7	Reprezentacje algebr półprostych . . . . .	95
14.8	Różniczkowania półprostej algebry Liego . . . . .	97

<b>15 Nilpotentne algebry Liego</b>	<b>99</b>
15.1 Struktura endomorfizmu liniowego . . . . .	99
15.2 Twierdzenie Engela . . . . .	101
15.3 Przestrzenie pierwiastkowe algebry nilpotentnej . . . . .	102
15.4 Przestrzenie pierwiastkowe w algebrach Liego . . . . .	103
15.5 Algebry Cartana–przypadek ogólny . . . . .	104
15.6 Elementy półproste i nilpotentne w półprostych algebrach Liego . . . . .	105
<b>16 Struktura algebr półprostych</b>	<b>106</b>
16.1 Podalgebra Cartana dla algebr półprostych . . . . .	106
16.2 Zbiór pierwiastków półprostej algebry Liego . . . . .	106
16.3 Układy pierwiastków . . . . .	109
16.4 Pierwiastki dodatnie . . . . .	110
16.5 Grupa Weyla . . . . .	110
16.6 Reprezentacje algebr Liego . . . . .	111
16.7 Konstrukcja Schura-Weyla . . . . .	112
16.8 Reprezentacje $SL(n, \mathbb{C})$ . . . . .	113
<b>17 Globalna teoria grup Liego</b>	<b>113</b>
17.1 Homotopia krzywych . . . . .	113
17.2 Składanie krzywych i grupa homotopii . . . . .	114
17.3 Nakrycia . . . . .	115
17.4 Nakrycie uniwersalne . . . . .	115
17.5 Nakrycie wyznaczone przez podgrupę grupy homotopii . . . . .	115
17.6 Lokalna izomorficzność grup Liego . . . . .	116
17.7 Grupa homotopii grupy Liego . . . . .	117

# 1 Algebry

## 1.1 Definicja

Niech  $\mathfrak{A}$  będzie przestrzenią wektorową nad ciałem  $\mathbb{K}$ . Mówimy, że  $\mathfrak{A}$  jest *algebrą* jeśli jest wyposażona w działanie

$$\mathfrak{A} \times \mathfrak{A} \ni (A, B) \mapsto AB \in \mathfrak{A}$$

spełniające

$$\begin{aligned} A(B + C) &= AB + AC, & (B + C)A &= BA + CA, \\ (\alpha\beta)(AB) &= (\alpha A)(\beta B). \end{aligned}$$

Jeśli w dodatku

$$A(BC) = (AB)C,$$

to mówimy, że jest to *algebra łączna*. (W praktyce, często skracamy nazwę, przez *algebrę* rozumiejąc algebrę łączną).

Mówimy, że  $\mathfrak{A}$  jest *algebrą przemienną* gdy  $A, B \in \mathfrak{A}$  implikuje  $AB = BA$ .

*Centrum* algebry  $\mathfrak{A}$  jest zdefiniowane jako

$$\mathfrak{Z}(\mathfrak{A}) = \{A \in \mathfrak{A} : AB = BA, B \in \mathfrak{A}\}.$$

## 1.2 Podalgebry

Ustalmy algebrę  $\mathfrak{A}$ .  $\mathfrak{B} \subset \mathfrak{A}$  nazywamy *podalgebrą* gdy jest to podprzestrzeń liniowa i  $A, B \in \mathfrak{B} \Rightarrow AB \in \mathfrak{B}$ . Oczywiście, podalgebra jest również algebrą.

Jeśli rodzina  $\mathfrak{B}_\alpha \subset \mathfrak{A}$  składa się z podalgebr, to  $\bigcap_\alpha \mathfrak{B}_\alpha$  jest też podalgebrą. Dlatego, dla dowolnego podzbioru  $\mathfrak{B} \subset \mathfrak{A}$  istnieje najmniejsza podalgebra zawierająca  $\mathfrak{B}$ . Oznaczamy ją przez  $\text{Alg}(\mathfrak{B})$  i nazywamy *podalgebrą generowaną przez  $\mathfrak{B}$* .

Niech  $\mathcal{V}$  będzie przestrzenią wektorową nad  $\mathbb{K}$ . Oczywiście, zbiór liniowych odwzorowań w  $\mathcal{V}$ , oznaczany przez  $L(\mathcal{V})$ , jest algebrą łączną.

Podalgebry w  $L(\mathcal{V})$  nazywane są *konkretnymi algebrami (łącznymi)*. Gdy  $\dim \mathcal{V} < \infty$ , mówimy też, że są to *algebry macierzowe*.

## 1.3 Homomorfizmy

Odwzorowanie między algebrami nazywamy homomorfizmem, jeśli zachowuje wszystkie działania. W szczególności, niech  $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$  będą algebrami. Odwzorowanie  $\phi : \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{B}$  nazywa się *homomorfizmem* gdy

- (1)  $\phi(\lambda A) = \lambda\phi(A)$ ;
- (2)  $\phi(A + B) = \phi(A) + \phi(B)$ ;
- (3)  $\phi(AB) = \phi(A)\phi(B)$ .

Zbiór automorfizmów algebry  $\mathfrak{A}$  oznaczamy przez  $\text{Aut}(\mathfrak{A})$ . Jest to grupa.

Homomorfizm  $\mathfrak{A}$  w  $L(\mathcal{V})$  jest nazywany *reprezentacją  $\mathfrak{A}$  na  $\mathcal{V}$* .

## 1.4 Ideały

$\mathfrak{B}$  jest *ideałem* algebry Liego  $\mathfrak{A}$ , jeśli jest liniową podprzestrzenią w  $\mathfrak{A}$  i  $A \in \mathfrak{A}, B \in \mathfrak{B} \Rightarrow AB, BA \in \mathfrak{B}$ .

Mówimy, że ideał  $\mathfrak{B}$  jest *właściwy* gdy  $\mathfrak{B} \neq \mathfrak{A}$ . Mówimy, że ideał  $\mathfrak{B}$  jest *nietrywialny* gdy  $\mathfrak{B} \neq \mathfrak{A}$  i  $\mathfrak{B} \neq \{0\}$ .

**Twierdzenie 1.1** *Jądro homomorfizmu jest ideałem. Jeśli  $\mathfrak{B}$  jest ideałem w  $\mathfrak{A}$ , to  $\mathfrak{A}/\mathfrak{B}$  ma naturalną strukturę algebry Liego. Odwzorowanie*

$$\mathfrak{A} \ni A \mapsto A + \mathfrak{B} \in \mathfrak{A}/\mathfrak{B}$$

*jest surjektywnym homomorfizmem, którego jądro jest równe  $\mathfrak{B}$ . Jeśli  $\mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{C}$  jest innym surjektywnym homomorfizmem, którego jądro też jest równe  $\mathfrak{B}$ , to  $\mathfrak{C} \simeq \mathfrak{A}/\mathfrak{B}$ .*

Mówiąc, że

$$\mathfrak{B} \xrightarrow{\phi} \mathfrak{A} \xrightarrow{\psi} \mathfrak{H}$$

jest ciągiem dokładnym mamy na myśli, że  $\text{Ker}\psi = \text{Ran}\phi$ .

W szczególności

$$0 \rightarrow \mathfrak{B} \xrightarrow{\phi} \mathfrak{A} \xrightarrow{\psi} \mathfrak{H} \rightarrow 0 \quad (1.1)$$

oznacza, że  $\phi$  jest iniektywny,  $\psi$  jest surjektywny i  $\text{Ker}\psi = \text{Ran}\phi$ . Wtedy  $\psi$  generuje izomorfizm  $\mathfrak{A}/\phi(\mathfrak{B})$  z  $\mathfrak{H}$ . (1.1) nazywamy *krótkim ciągiem dokładnym*. Mówimy, że  $\mathfrak{A}$  jest *rozszerzeniem  $\mathfrak{B}$  poprzez  $\mathfrak{H}$* .

**Twierdzenie 1.2** (1) *Jeśli  $\mathfrak{H}, \mathfrak{B}$  są ideałami, to  $\mathfrak{H} + \mathfrak{B}$  też.*

(2) *Jeśli  $\mathfrak{H}, \mathfrak{B}$  są ideałami, to  $\mathfrak{H} \cap \mathfrak{B} = \mathfrak{H} \cdot \mathfrak{B}$  też.*

(3) *Jeśli  $\phi : \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{B}$  jest surjektywnym homomorfizmem między algebrami, to  $\mathfrak{C} \mapsto \phi(\mathfrak{C})$  zadaje bijekcję między ideałami algebry  $\mathfrak{A}$  zawierającymi  $\text{Ker}\phi$  a ideałami algebry  $\mathfrak{B}$ .*

## 2 Algebry Liego

### 2.1 Definicja

Niech  $\mathfrak{g}$  będzie algebrą nad ciałem  $\mathbb{K}$  z działaniem oznaczanym przez

$$\mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \ni (A, B) \mapsto [A, B] \in \mathfrak{g}.$$

Mówimy, że  $\mathfrak{g}$  jest *algebrą Liego* jeśli jej działanie jest *antysymetryczne*, czyli

$$[A, B] = -[B, A], \quad A, B \in \mathfrak{g},$$

i spełnia *tożsamość Jacobiego*

$$[A, [B, C]] + [B, [C, A]] + [C, [A, B]] = 0.$$

Działanie w algebrze Liego często nazywamy *nawiasem*.

Każda przestrzeń wektorowa z zerowym nawiasem jest algebrą Liego. O takich algebrach Liego mówimy, że są *przemienne*.

*Centrum* algebry Liego  $\mathfrak{g}$  jest zdefiniowane jako

$$\mathfrak{z}(\mathfrak{g}) = \{A \in \mathfrak{g} : [A, B] = 0, B \in \mathfrak{g}\}.$$

Każda algebra łączna  $\mathfrak{A}$  ma naturalną strukturę algebry Liego zadaną przez komutator

$$[A, B] := AB - BA.$$

W szczególności, jeśli  $\mathcal{V}$  jest przestrzenią wektorową to zbiór liniowych odwzorowań w  $\mathcal{V}$ , czyli  $L(\mathcal{V})$ , jest algebrą Liego.  $L(\mathcal{V})$  wyposażone w komutator oznaczamy przez  $gl(\mathcal{V})$ .

Podalgebry w  $gl(\mathcal{V})$  nazywane są *konkretnymi algebrami Liego*. Gdy  $\dim \mathcal{V} < \infty$ , mówimy też, że są to *macierzowe algebry Liego*.

## 2.2 Reprezentacje algebr Liego

Homomorfizmy algebr Liego są zdefiniowane jak powyżej, czyli

- (1)  $\phi(\lambda A) = \lambda\phi(A)$ ;
- (2)  $\phi(A + B) = \phi(A) + \phi(B)$ ;
- (3)  $\phi([A, B]) = [\phi(A), \phi(B)]$ .

Homomorfizm algebry Liego  $\mathfrak{g}$  w  $gl(\mathcal{V})$  jest nazywany *reprezentacją  $\mathfrak{g}$  na  $\mathcal{V}$* .

*Reprezentacja dołączona*

$$\mathfrak{g} \ni A \mapsto \text{ad}(A) \in gl(\mathfrak{g})$$

jest zdefiniowana przez

$$\text{ad}(A)B := [A, B], \quad A, B \in \mathfrak{g}.$$

Żeby sprawdzić, że jest to reprezentacja, czyli

$$\text{ad}([A, B]) = [\text{ad}(A), \text{ad}(B)]$$

korzystamy z tożsamości Jacobiego.

## 2.3 Różniczkowania

Niech  $\mathfrak{g}$  będzie algebrą Liego. Odwzorowanie liniowe  $D : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}$  nazywamy *różniczkowaniem* jeśli spełnia *tożsamość Leibniza*:

$$\mathcal{D}[A, B] = [\mathcal{D}A, B] + [A, \mathcal{D}B].$$

Przykładem różniczkowania jest  $\text{ad}(C)$  zdefiniowany jako

$$\text{ad}(C)A := [C, A].$$

Wynika to z tożsamości Jacobiego. Mówimy, że jest to *różniczkowanie wewnętrzne*.



Oznaczmy przez  $\text{Der}(\mathfrak{g})$  zbiór różniczkowań algebry  $\mathfrak{g}$ . Jeśli  $\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2 \in \text{Der}(\mathfrak{g})$ , to  $[\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2] \in \text{Der}(\mathfrak{g})$ . Zatem  $\text{Der}(\mathfrak{g})$  jest algebrą Liego.  $\mathfrak{g} \ni A \mapsto \text{ad}(A) \in \text{Der}(\mathfrak{g})$  jest homomorfizmem, którego jądrem jest  $\mathfrak{z}(\mathfrak{g})$ .

Jeśli  $\mathcal{D} \in \text{Der}(\mathfrak{g})$  i  $A \in \mathfrak{g}$ , to  $[\mathcal{D}, \text{ad}(A)] = \text{ad}(\mathcal{D}A)$ .

Jeśli  $\mathbb{R} \ni t \mapsto \sigma_t \in \text{Aut}(\mathfrak{g})$  jest różniczkowalnym homomorfizmem (*jednoparametrową grupą*), to

$$\left. \frac{d}{dt} \sigma_t(B) \right|_{t=0} =: \mathcal{D}B \quad (2.2)$$

definiuje różniczkowanie. I na odwrót, jeśli  $\mathcal{D}$  jest różniczkowaniem, to

$$\sigma_t(B) := \exp(t\mathcal{D})B = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^n}{n!} \mathcal{D}^n B$$

jest jednoparametrową grupą spełniającą (2.2).

Jako przykład rozważmy algebrę przemiennej  $\mathbb{K}^n$ . Wszystkie odwzorowania liniowe  $\mathbb{K}^n$  są różniczkowaniami. Nie są one wewnętrzne, poza zerowym. Wszystkie automorfizmy są zadane przez elementy  $GL(\mathbb{K}^n)$ .

Można pokazać, że w algebrze  $gl(\mathbb{K}^n)$  wszystkie różniczkowania są wewnętrzne. Podobnie, wszystkie automorfizmy są postaci  $B \mapsto CBC^{-1}$  dla pewnego  $C \in GL(\mathbb{K}^n)$ .

## 2.4 Ideały i ideały charakterystyczne

Definicja ideału jest taka sama, jak w algebrze, czyli  $\mathfrak{b}$  jest ideałem w  $\mathfrak{g}$  jeśli jest podprzestrzenią wektorową w  $\mathfrak{g}$  i  $B \in \mathfrak{b}$ ,  $A \in \mathfrak{g}$  implikuje  $[A, B] \in \mathfrak{b}$ .

Mówimy, że  $\mathfrak{b}$  jest *ideałem charakterystycznym*, gdy dla każdego  $\mathcal{D} \in \text{Der}(\mathfrak{g})$ ,  $\mathcal{D}$  przekształca  $\mathfrak{b}$  w siebie.

**Twierdzenie 2.1** (1) *Jeśli  $\mathfrak{a}$ ,  $\mathfrak{b}$  są ideałami charakterystycznymi, to  $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}$  i  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$  też.*

(2) *Jeśli  $\mathfrak{a}$  jest ideałem w  $\mathfrak{g}$  a  $\mathfrak{b}$  jest ideałem charakterystycznym w  $\mathfrak{a}$ , to  $\mathfrak{b}$  jest ideałem w  $\mathfrak{g}$ .*

(3) *Jeśli  $\mathfrak{a}$  jest ideałem charakterystycznym w  $\mathfrak{g}$  a  $\mathfrak{b}$  jest ideałem charakterystycznym w  $\mathfrak{a}$ , to  $\mathfrak{b}$  jest ideałem charakterystycznym w  $\mathfrak{g}$ .*

(4) *Jeśli  $\mathfrak{a}$ ,  $\mathfrak{b}$  są ideałami charakterystycznymi, to  $[\mathfrak{a}, \mathfrak{b}]$  też.*

(5) *Jeśli  $\phi : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{h}$  jest surjektywnym homomorfizmem i  $\text{Ker}\phi$  jest ideałem charakterystycznym, to  $\mathfrak{a} \mapsto \phi(\mathfrak{a})$  zadaje bijekcję między ideałami charakterystycznymi algebry  $\mathfrak{g}$  zawierającymi  $\text{Ker}\phi$  a ideałami charakterystycznymi algebry  $\mathfrak{h}$ .*

**Twierdzenie 2.2** *Centrum jest ideałem charakterystycznym.*

**Dowód.** Dla  $Z \in \mathfrak{z}$ ,  $A \in \mathfrak{g}$  mamy  $0 = [A, Z]$ . Dlatego

$$0 = [\mathcal{D}A, Z] + [A, \mathcal{D}Z].$$

Stąd  $\mathcal{D}Z \in \mathfrak{z}$ .  $\square$

W przemiennej algebrze Liego  $\mathbb{K}^n$  wszystkie podprzestrzenie liniowe są ideałami, ale tylko ideały trywialne są charakterystyczne.

**Stwierdzenie 2.3**  $\text{ad}(\mathfrak{g})$  jest ideałem w  $\text{Der}(\mathfrak{g})$ .

**Dowód.** Niech  $\mathcal{D} \in \text{Der}(\mathfrak{g})$ ,  $A \in \mathfrak{g}$ . Wtedy

$$\mathcal{D}\text{ad}(A) - \text{ad}(A)\mathcal{D} = \text{ad}(\mathcal{D}A).$$

□

**Stwierdzenie 2.4** Niech  $\phi : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{h}$  będzie homomorfizmem. Wtedy  $\text{Ker}\phi$  jest ideałem. Poza tym, następujące warunki są równoważne:

- (1)  $\text{Ker}\phi$  jest ideałem charakterystycznym
- (2) Jeśli  $\mathcal{D} \in \text{Der}\mathfrak{g}$ , to  $\phi(A) = \phi(A') \Leftrightarrow \phi(\mathcal{D}A) = \phi(\mathcal{D}A')$ .

Dlatego też można wtedy zdefiniować  $\phi(\mathcal{D}) \in \text{Der}\mathfrak{h}$  wzorem  $\phi(\mathcal{D})\phi(A) := \phi(\mathcal{D}A)$ . Mamy homomorfizm algebr Liego  $\phi : \text{Der}(\mathfrak{g}) \rightarrow \text{Der}(\mathfrak{h})$ .

## 2.5 Iloczyn półprosty

Niech  $\mathfrak{a}$  i  $\mathfrak{h}$  będą algebrami Liego.

Niech  $\mathfrak{h} \ni H \mapsto \alpha_H \in \text{Der}(\mathfrak{a})$  będzie homomorfizmem algebr Liego, czyli

$$\alpha_{[H_1, H_2]}(A) = \alpha_{H_1}\alpha_{H_2}(A) - \alpha_{H_2}\alpha_{H_1}(A).$$

Wtedy iloczyn półprosty  $\mathfrak{a} \rtimes_{\alpha} \mathfrak{h}$  jest zdefiniowany jako  $\mathfrak{a} \times \mathfrak{h}$  z nawiasem

$$[(A_1, H_1), (A_2, H_2)] = ([A_1, A_2] + \alpha_{H_1}(A_2) - \alpha_{H_2}(A_1), [H_1, H_2]).$$

$\mathfrak{a} \rtimes_{\alpha} \mathfrak{h}$  jest algebrą Liego. Sprawdzamy tożsamość Jacobiego:

$$\begin{aligned} & [[(A_1, H_1), (A_2, H_2)], (A_3, H_3)] \\ &= \left( [[A_1, A_2], A_3] + [\alpha_{H_1}(A_2), A_3] - [\alpha_{H_2}(A_1), A_3] - \alpha_{H_3}[A_1, A_2] \right. \\ & \quad \left. + \alpha_{[H_1, H_2]}(A_3) - \alpha_{H_3}\alpha_{H_1}(A_2) + \alpha_{H_3}\alpha_{H_2}(A_1), [[H_1, H_2], H_3] \right). \end{aligned}$$

Po cyklicznym zsumowaniu dostajemy zero.

$\{0\} \times \mathfrak{h}$  jest jej podalgebrą Liego,  $\mathfrak{a} \times \{0\}$  jest jej ideałem.

Jeśli  $\mathfrak{g}$  zawiera podalgebrę  $\mathfrak{a}$  i ideał  $\mathfrak{h}$  takie, że  $\mathfrak{g}$  jest sumą prostą  $\mathfrak{a}$  i  $\mathfrak{h}$  w sensie przestrzeni wektorowych, to mamy wtedy homomorfizm  $\mathfrak{h} \ni H \mapsto [H, \cdot] =: \alpha_H \in \text{Der}(\mathfrak{a})$  i  $\mathfrak{g}$  jest izomorficzna z iloczynem półprostym  $\mathfrak{a} \rtimes_{\alpha} \mathfrak{h}$ .

Oznaczmy przez  $t(\mathbb{K}^n)$  macierze górnotrójkątne, przez  $n(\mathbb{K}^n)$  macierze ściśle górnotrójkątne, a przez  $d(\mathbb{K}^n)$  macierze diagonalne. Wtedy  $n(\mathbb{K}^n)$  jest ideałem charakterystycznym w  $t(\mathbb{K}^n)$ .  $t(\mathbb{K}^n)$  jest iloczynem półprostym  $n(\mathbb{K}^n) \rtimes d(\mathbb{K}^n)$ . Jeśli  $t(\mathbb{K}^n) \supset \mathfrak{a} \supset n(\mathbb{K}^n)$  jest dowolną podprzestrzenią, to jest to też ideał w  $t(\mathbb{K}^n)$  (zresztą, charakterystyczny).

## 2.6 Afiniczne algebry Liego

Niech  $\mathcal{V}$  będzie przestrzenią wektorową. Odwzorowania afiniczne na  $\mathcal{V}$  tworzą algebrę Liego z działaniem

$$[(w_1, A_1), (w_2, A_2)] := (A_1 w_2 - A_2 w_1, [A_1, A_2])$$

Tę algebrę Liego nazywamy *afinicznym rozszerzeniem*  $gl(\mathcal{V})$ .

$\mathcal{V}$  można traktować jako przemienną algebrę Liego. Każde odwzorowanie liniowe na  $\mathcal{V}$  jest różniczkowaniem, czyli  $\text{Der}(\mathcal{V}) = L(\mathcal{V}) = gl(\mathcal{V})$ . Latwo widzimy, że afiniczne rozszerzenie  $gl(\mathcal{V})$  jest iloczynem półprostym  $\mathcal{V} \rtimes gl(\mathcal{V})$ .

Często w zastosowaniach spotykamy grupy w których  $gl(\mathcal{V})$  jest zastąpione jej podgrupą. Na przykład, algebra Liego grupy Poincarego jest afinicznym rozszerzeniem algebry Liego grupy Lorentza  $\mathbb{R}^{1,3} \rtimes so(1, 3)$ .

## 2.7 Związek zespolonych i rzeczywistych przestrzeni wektorowych

(1) Niech  $\mathcal{V}$  będzie zespoloną przestrzenią wektorową. Jak zrobić z niej przestrzeń rzeczywistą?

- (i)  $\mathbb{R}$  jest podciałem w  $\mathbb{C}$ . Można “zapomnieć” o mnożeniu przez nierzeczywiste liczby. Dostajemy przestrzeń  $\mathcal{V}_{\mathbb{R}}$  – *realifikację przestrzeni*  $\mathcal{V}$ .
- (ii) Niech  $\kappa$  będzie *sprzężeniem*, tzn. antyliniową involucją. Wtedy

$$\mathcal{V}^{\kappa} := \{v \in \mathcal{V} : \kappa v = v\}$$

jest rzeczywistą podprzestrzenią zwaną *formą rzeczywistą przestrzeni*  $\mathcal{V}$ . Zauważmy, że

$$i\mathcal{V}^{\kappa} = \{v \in \mathcal{V} : \kappa v = -v\}, \quad \mathcal{V} = \mathcal{V}^{\kappa} \oplus i\mathcal{V}^{\kappa}.$$

(2) Niech  $\mathcal{X}$  będzie rzeczywistą przestrzenią wektorową. Jak zrobić z niej przestrzeń zespoloną?

- (i) Przestrzeń  $\mathbb{C}\mathcal{X} := \mathcal{X} \oplus \mathcal{X}$  wyposażamy w mnożenie

$$(\lambda + i\mu)(x_{\mathbb{R}}, x_{\mathbb{I}}) := (\lambda x_{\mathbb{R}} - \mu x_{\mathbb{I}}, \lambda x_{\mathbb{I}} + \mu x_{\mathbb{R}}).$$

Zamiast  $(x_{\mathbb{R}}, x_{\mathbb{I}})$  będziemy pisali  $x_{\mathbb{R}} + ix_{\mathbb{I}}$ . Nazywamy tę przestrzeń *kompleksyfikacją przestrzeni*  $\mathcal{X}$ .

- (ii) Niech  $j \in L(\mathcal{X})$  będzie *antyyinwolucją* (albo *strukturą zespoloną*), czyli niech spełnia  $j^2 = -\mathbb{1}$ . Wyposażamy  $\mathcal{X}$  w mnożenie

$$(\lambda + i\mu)x := (\lambda + \mu j)x.$$

Tak uzyskaną przestrzeń zespoloną oznaczamy przez  $\mathcal{X}^{\mathbb{C}}$  i czasami nazywamy *formą zespoloną przestrzeni*  $\mathcal{X}$ .

W kompleksyfikacji rzeczywistej przestrzeni  $\mathcal{X}$  mamy naturalne sprzężenie:

$$\kappa(x_{\mathbb{R}} + ix_{\mathbb{I}}) = \overline{(x_{\mathbb{R}} + ix_{\mathbb{I}})} = x_{\mathbb{R}} - ix_{\mathbb{I}}.$$

Oczywiście,  $(\mathbb{C}\mathcal{X})^{\kappa} = \mathcal{X}$ .

Jeśli zrealifikujemy zespoloną przestrzeń  $\mathcal{V}$  dostając  $\mathcal{V}_{\mathbb{R}}$ , to w  $\mathcal{V}_{\mathbb{R}}$  mamy naturalną antyinvolucję zadaną przez  $i$ . Mamy  $(\mathcal{V}_{\mathbb{R}})^{\mathbb{C}} = \mathcal{V}$ .

Jeśli skompleksyfikujemy rzeczywistą przestrzeń  $\mathcal{X}$ , a potem ją zrealifikujemy, dostajemy  $(\mathbb{C}\mathcal{X})_{\mathbb{R}} = \mathcal{X} \oplus \mathcal{X}$ .

Jeśli zrealifikujemy zespoloną przestrzeń  $\mathcal{V}$ , a potem ją skompleksyfikujemy, dostajemy  $\mathbb{C}(\mathcal{V}_{\mathbb{R}}) = \mathcal{V} \oplus \mathcal{V}$ .

## 2.8 Związek zespolonych i rzeczywistych algebr Liego

(1) Niech  $\mathfrak{g}$  będzie zespoloną algebrą Liego.

(i)  $\mathfrak{g}_{\mathbb{R}}$  jest rzeczywistą algebrą Liego.

(ii) Niech  $\kappa$  będzie *sprzężeniem*, które jest jednocześnie homomorfizmem. Wtedy  $\mathfrak{g}^{\kappa}$  jest rzeczywistą algebrą Liego.

(2) Niech  $\mathfrak{h}$  będzie rzeczywistą algebrą Liego.

(i)  $\mathbb{C}\mathfrak{h}$  jest zespoloną algebrą Liego.

(ii) Niech  $j$  antyinvolutywnym automorfizmem algebry  $\mathfrak{h}$ . Wtedy  $\mathfrak{h}^{\mathbb{C}}$  jest zespoloną algebrą Liego.

**Stwierdzenie 2.5** Niech  $\mathfrak{h}$  będzie rzeczywistą algebrą Liego.

(1)  $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{h}$  jest ideałem (charakterystycznym)  $\Leftrightarrow \mathbb{C}\mathfrak{a} \subset \mathbb{C}\mathfrak{h}$  jest ideałem (charakterystycznym).

(2)  $\mathfrak{a}, \mathfrak{b} \subset \mathfrak{h}$  implikuje  $[\mathbb{C}\mathfrak{a}, \mathbb{C}\mathfrak{b}] = \mathbb{C}[\mathfrak{a}, \mathfrak{b}]$ .

**Przykład 2.6** (1)  $sl(n, \mathbb{C})$  ma formy rzeczywiste  $sl(n, \mathbb{R})$  ze sprzężeniem zespolonym i  $su(n)$  ze sprzężeniem hermitowskim razy minus.

(2)  $so(n, \mathbb{C})$  ma formy rzeczywiste  $so(q, p)$  dla  $n = q + p$  ze sprzężeniem  $A \mapsto K\bar{A}K$ , gdzie  $K^2 = I_{q,p}$ .

(3)  $sp(m, \mathbb{C})$  ma formę rzeczywistą  $sp(m, \mathbb{R})$ .

## 2.9 Formy niezmiennicze na algebrze Liego

Niech  $\mathfrak{g}$  będzie algebrą Liego. Mówimy, że forma dwuliniowa  $\langle \cdot | \cdot \rangle$  na  $\mathfrak{g}$  jest *niezmiennicza*, gdy

$$\langle [B, A] | C \rangle + \langle A | [B, C] \rangle = 0, \quad A, B, C \in \mathfrak{g}. \quad (2.3)$$

Inny równoważny warunek:

$$\langle [A, B] | C \rangle = \langle A | [B, C] \rangle.$$

Przypomnijmy, że jeśli  $\pi : \mathfrak{g} \rightarrow gl(\mathcal{V})$  jest reprezentacją, i  $\langle \cdot | \cdot \rangle$  jest formą dwuliniową na  $\mathcal{V}$ , to mówimy, że  $\mathfrak{g}$  (*infinitesimalnie*) zachowuje  $\langle \cdot | \cdot \rangle$  gdy

$$\langle v | \pi(X)w \rangle + \langle \pi(X)v | w \rangle = 0, \quad X \in \mathfrak{g}, \quad v, w \in \mathcal{V}. \quad (2.4)$$

Definicję (2.4) można zatem przeformułować następująco: forma na algebrze Liego jest niezmiennicza, gdy jest ona niezmiennicza dla reprezentacji dołączonej:

$$\langle \text{ad}(B)A | C \rangle + \langle A | \text{ad}(B)C \rangle = 0.$$

Jeśli  $\mathfrak{g} \subset gl(\mathcal{V})$ , to  $\text{Tr } AB$  jest formą niezmienniczą. Ogólniej, z każdą reprezentacją  $\pi$  algebry Liego  $\mathfrak{g}$  w skończenie wymiarowej przestrzeni mamy związaną niezmienniczą formę dwuliniową

$$\langle B | C \rangle_\pi := \text{Tr } \pi(B)\pi(C).$$

Jeśli  $\pi = \text{ad}$  formę tę nazywamy *formą Killinga* i oznaczamy czasem  $\langle \cdot | \cdot \rangle_{\mathfrak{g}}$ .

**Twierdzenie 2.7** *Niech  $\perp$  będzie dopełnieniem ortogonalnym dla formy niezmienniczej  $\langle \cdot | \cdot \rangle$ . Niech  $\mathfrak{b}$  będzie ideałem w  $\mathfrak{g}$ .*

- (1)  $\mathfrak{b}^\perp$  też jest ideałem.
- (2) Jeśli forma zeruje się na  $\mathfrak{b}$ , to  $[\mathfrak{b}, \mathfrak{b}] \subset \mathfrak{g}^\perp$ .
- (3) Jeśli forma jest niezdegenerowana, to  $\mathfrak{b} \cap \mathfrak{b}^\perp$  jest przemiennym ideałem.

**Dowód.** (1) Niech  $A \in \mathfrak{g}$ ,  $B \in \mathfrak{b}$ ,  $C \in \mathfrak{b}^\perp$ .

$$\langle [C, A] | B \rangle = \langle C | [A, B] \rangle = 0.$$

Zatem,  $[A, C] \in \mathfrak{b}^\perp$ .

(2) Niech  $B_1, B_2 \in \mathfrak{b}$ . Wtedy

$$\langle [B_1, B_2] | A \rangle = \langle B_1 | [B_2, A] \rangle = 0.$$

Zatem  $[B_1, B_2] \in \mathfrak{g}^\perp$ .

(3)  $\mathfrak{g}^\perp = \{0\}$ . Zatem, na mocy (2),  $[\mathfrak{b} \cap \mathfrak{b}^\perp, \mathfrak{b} \cap \mathfrak{b}^\perp] = \{0\}$ .  $\square$

**Stwierdzenie 2.8** *Niech  $\mathfrak{a}$  będzie ideałem algebry Liego  $\mathfrak{g}$ . Niech  $\langle \cdot | \cdot \rangle_{\mathfrak{g}}$  i  $\langle \cdot | \cdot \rangle_{\mathfrak{a}}$  będą formami Killinga względem  $\mathfrak{g}$  i  $\mathfrak{a}$ . Wtedy obcięcie  $\langle \cdot | \cdot \rangle_{\mathfrak{g}}$  do  $\mathfrak{a} \times \mathfrak{a}$  jest równe  $\langle \cdot | \cdot \rangle_{\mathfrak{a}}$ .*

**Dowód.** Niech  $A, B \in \mathfrak{a}$ . Wybieramy bazę w  $\mathfrak{g}$  tak, aby początkowe elementy tworzyły bazę  $\mathfrak{a}$ . Wtedy

$$\text{ad}(A) \sim \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \text{ad}(B) \sim \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Zatem

$$\text{ad}(A)\text{ad}(B) \sim \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} & a_{11}b_{12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Stąd

$$\langle A | B \rangle_{\mathfrak{g}} = \text{Tr ad}(A)\text{ad}(B) = \text{Tr } a_{11}b_{11} = \langle A | B \rangle_{\mathfrak{a}}.$$

$\square$

**Przykład 2.9** Dla  $gl(n) = \mathbb{C}\mathbb{1}_n \oplus sl(n)$  forma Killinga jest równa

$$\langle A|B \rangle_{\text{ad}} = 2n\text{Tr}AB - 2\text{Tr}A\text{Tr}B.$$

Czyli forma Killinga równa jest  $2n$  razy forma śladowa na  $sl(n)$  i  $0$  na  $\mathbb{C}\mathbb{1}_n$ . Niezerowe elementy macierzowe formy Killinga mamy dla  $i \neq j$ :

$$\langle A_{ij}|A_{ji} \rangle_{\text{ad}} = 2n, \quad \langle A_{ii}|A_{ii} \rangle_{\text{ad}} = 2n - 2, \quad \langle A_{ii}|A_{jj} \rangle_{\text{ad}} = -2.$$

Mamy bowiem

$$\text{ad}(A)\text{ad}(B)X = ABX + XBA - AXB - BXA.$$

Niezerowe wyrazy diagonalne dla reprezentacji dołączonej są równe

$$\text{ad}(A_{ij})\text{ad}(A_{ji})A_{ik} = A_{ik}, \quad k \neq j, \quad n - 1 \text{ wyrazów},$$

$$\text{ad}(A_{ij})\text{ad}(A_{ji})A_{kj} = A_{kj}, \quad k \neq i, \quad n - 1 \text{ wyrazów},$$

$$\text{ad}(A_{ij})\text{ad}(A_{ji})A_{ij} = 2A_{ij}, \quad 2 \text{ wyrazy},$$

$$\text{ad}(A_{ii})\text{ad}(A_{ii})A_{ik} = A_{ik}, \quad k \neq i, \quad n - 1 \text{ wyrazów},$$

$$\text{ad}(A_{ii})\text{ad}(A_{ii})A_{ki} = A_{ki}, \quad k \neq i, \quad n - 1 \text{ wyrazów},$$

$$\text{ad}(A_{ii})\text{ad}(A_{jj})A_{ij} = -A_{ij}, \quad 1 \text{ wyraz},$$

$$\text{ad}(A_{ii})\text{ad}(A_{jj})A_{ji} = -A_{ji}, \quad 1 \text{ wyraz}.$$

## 2.10 Algebry półproste i reduktywne

Mówimy, że algebra Liego  $\mathfrak{g}$  jest *półprosta* gdy nie posiada niezerowych ideałów przemiennych.  $\mathfrak{g}$  jest *reduktywna* gdy jest sumą prostą półprostej i przemienniej algebry Liego.

**Twierdzenie 2.10** Niech  $\mathfrak{g}$  będzie algebrą Liego. Następujące warunki są równoważne:

- (1)  $\mathfrak{g}$  jest algebrą półprostą.
- (2) Forma Killinga na  $\mathfrak{g}$  jest niezdegenerowana.
- (3)  $\mathfrak{g}$  jest sumą prostą ideałów prostych

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{a}_1 \oplus \cdots \oplus \mathfrak{a}_n.$$

**Dowód.** (2) $\Rightarrow$ (1): Niech  $\langle \cdot | \cdot \rangle_{\text{ad}}$  będzie nieosobliwa. Niech  $\mathfrak{a}$  będzie ideałem przemiennym. Dobierzmy bazę w  $\mathfrak{g}$  tak, aby początkowe elementy stanowiły bazę w  $\mathfrak{a}$ . Niech  $B \in \mathfrak{g}$ ,  $A \in \mathfrak{a}$ . Mamy

$$\text{ad}(B) \sim \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ 0 & b_{22} \end{bmatrix}, \quad \text{ad}(A) \sim \begin{bmatrix} 0 & a_{12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Zatem

$$\text{ad}(A)\text{ad}(B) \sim \begin{bmatrix} 0 & a_{12}b_{22} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Czyli

$$\langle A|B \rangle_{\text{ad}} = \text{Tr ad}(A)\text{ad}(B) = 0.$$

Zatem  $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{g}^\perp = \{0\}$ .

(1) $\Rightarrow$ (2): Implikacja ta wynika z Kryterium Cartana dla formy Killinga (Tw. 14.15).

(1) $\Rightarrow$ (3): Niech  $\mathfrak{a}$  będzie nietrywialnym ideałem. Wiemy już, że z (1) wynika, że forma Killinga jest niezdegenerowana. Z Tw. 2.7 wynika, że  $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{a}^\perp$  jest ideałem przemiennym. Z półprostoty  $\mathfrak{g}$  wynika, że  $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{a}^\perp = \{0\}$ . Kontynuując ten proces dostajemy rozkład na ideały proste.

(3) $\Rightarrow$ (1):  $\mathfrak{a}_i$  jako proste algebry Liego posiadają niezdegenerowaną formę Killinga. (Wynika to z (1) $\Rightarrow$ (2)). Więc to samo jest prawdą dla  $\mathfrak{g} = \mathfrak{a}_1 \oplus \dots \oplus \mathfrak{a}_n$ .  $\square$

**Twierdzenie 2.11** *Niech  $\mathfrak{g}$  będzie półprosta i*

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{a}_1 \oplus \dots \oplus \mathfrak{a}_n \tag{2.5}$$

*będzie jej rozkładem na proste ideały.*

- (1) *Dowolny ideał ma postać  $\mathfrak{a}_{i_1} \oplus \dots \oplus \mathfrak{a}_{i_k}$ , gdzie  $1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n$ .*
- (2) *Rozkład (2.5) jest jedyny z dokładnością do permutacji.*
- (3) *Obraz  $\mathfrak{g}$  względem homomorfizmu jest półprosty.*
- (4)  $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = \mathfrak{g}$ .

**Dowód.** (1) Niech  $\mathfrak{h}$  będzie ideałem w  $\mathfrak{g}$ . Jeśli  $\mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{h} \neq \{0\}$ , to  $\mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{h}$  jest nietrywialnym ideałem. Zatem  $\mathfrak{a}_i \subset \mathfrak{h}$ . Czyli

$$I_1 = \{i : \mathfrak{a}_i \subset \mathfrak{h}\}, \quad I_2 = \{i : \mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{h} = \{0\}\}$$

stanowi rozbitcie zbioru  $\{1, \dots, n\}$  na rozłączne podzbiory. Połóżmy

$$\mathfrak{g}_1 := \bigoplus_{i \in I_1} \mathfrak{a}_i, \quad \mathfrak{g}_2 := \bigoplus_{i \in I_2} \mathfrak{a}_i.$$

Oczywiście,  $\mathfrak{g}_1 \subset \mathfrak{h}$ .

Niech  $B \in \mathfrak{h}$ .  $B = B_1 + B_2$ ,  $B_i \in \mathfrak{g}_i$ .

Niech  $j \in I_1$ . Wtedy  $[B_2, \mathfrak{a}_j] \in \mathfrak{g}_2 \cap \mathfrak{a}_j = \{0\}$ .

Niech  $j \in I_2$ . Mamy  $B, B_1 \in \mathfrak{h}$ . Zatem  $B_2 \in \mathfrak{h}$ . Więc,  $[B_2, \mathfrak{a}_j] \in \mathfrak{h} \cap \mathfrak{a}_j = \{0\}$ . Zatem  $[B_2, \mathfrak{a}_j] = \{0\}$ .

Czyli  $[B_2, \mathfrak{g}] = \{0\}$ . Zatem  $B_2$  należy do centrum algebry  $\mathfrak{g}$ . Czyli  $B_2 = 0$ .

(2) Na mocy (1), jeśli  $\mathfrak{a}$  jest prostym ideałem zawartym w  $\mathfrak{g}$ , to jest on równy jednemu z ideałów w (2.5).  $\square$

**Twierdzenie 2.12** *Niech  $\mathfrak{g} \subset gl(\mathcal{V})$  będzie półprosta. Wtedy forma śladowa jest niezdegenerowana.*

**Dowód.** Dowód jest analogiczny do dowodu Tw. 2.10 (1) $\Rightarrow$ (2), przy czym korzystamy z Kryterium Cartana dla formy śladowej (Tw. 14.13).  $\square$

**Twierdzenie 2.13** Niech  $\mathfrak{g}$  będzie algebrą Liego. Następujące warunki są równoważne:

- (1)  $\mathfrak{g}$  jest algebrą reduktywną.
- (2) Istnieje niezdegenerowana forma niezmiennicza na  $\mathfrak{g}$ .
- (3)  $\mathfrak{g}$  jest sumą prostą ideałów prostych lub równych  $\mathbb{K}$ .

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{a}_1 \oplus \cdots \oplus \mathfrak{a}_n.$$

### 3 Grupy Liego i ich algebry Liego

#### 3.1 Rozmaitości

Niech  $\mathcal{P}$  będzie rozmaitością.  $\mathcal{P}$  można pokryć zbiorami otwartymi  $\mathcal{O}$  i mapami  $\phi_{\mathcal{O}} : \mathcal{O} \rightarrow \mathbb{R}^n$ . Mapy  $\phi_{\mathcal{O}}(p) = x = (x^1, \dots, x^n) \in \mathbb{R}^n$  pozwalają utożsamić  $\mathcal{O}$  z otwartym podzbiorem  $\phi_{\mathcal{O}}(\mathcal{O}) \subset \mathbb{R}^n$ .

Niech  $\Phi$  będzie gładką transformacją na  $\mathcal{P}$ . Dla  $f \in C^\infty(\mathcal{P})$  kładziemy  $\Phi^\# f(p) := f(\Phi(p))$ .

Niech  $\text{Diff}(\mathcal{P})$  oznacza zbiór dyfeomorfizmów rozmaitości  $\mathcal{P}$ . Jest to grupa. Piszemy  $\Phi_\# := (\Phi^\#)^{-1}$ .  $\text{Diff}(\mathcal{P}) \ni \Phi \mapsto \Phi_\#$  jest działaniem grupy.

#### 3.2 Wektory styczne

Niech  $p \in \mathcal{P}$ . Standardowa definicja wektora stycznego do  $\mathcal{P}$  w punkcie  $p$  mówi o klasie abstrakcji krzywych. Jeśli krzywa  $t \mapsto \gamma_t \in \mathcal{P}$  zadaje wektor styczny  $A$  w  $p = \gamma_s$ , będziemy pisali  $A = \left. \frac{d}{dt} \gamma_t \right|_{t=s}$ . Przez  $T_p \mathcal{P}$  będziemy oznaczali przestrzeń styczną do  $\mathcal{P}$  w punkcie  $p$ .

Jeśli  $A \in T_p \mathcal{P}$ , to mamy liniowe odwzorowanie  $A^\# : C^\infty(\mathcal{P}) \rightarrow \mathbb{C}$

$$A^\# f = \left. \frac{d}{dt} f(\gamma_t) \right|_{t=0}$$

dla krzywej  $\gamma_t$  definiującej  $A$  dla  $t = 0$ . Będziemy pisać  $A$  zamiast  $A^\#$ .

Niech  $\Phi$  będzie gładką transformacją na  $\mathcal{P}$ . Wektor  $A \in T_p \mathcal{P}$  może być przetransportowany przez  $\Phi$ . Dostajemy odwzorowanie  $T_p \Phi : T_p \mathcal{P} \rightarrow T_{\Phi(p)} \mathcal{P}$  zdefiniowane przez

$$T_p \Phi(A) f := \left. \frac{d}{dt} f \circ \Phi \circ \gamma_t \right|_{t=0}.$$

Mamy

$$T_p(\Phi_2 \circ \Phi_1) = T_{\Phi_1(p)} \Phi_2 \circ T_p \Phi_1.$$

#### 3.3 Pola wektorowe

Zbiór  $T\mathcal{P} := \bigcup_{p \in \mathcal{P}} T_p \mathcal{P}$  z naturalną strukturą rozmaitości nazywamy *wiązką styczną*. Funkcję gładką  $\mathcal{P} \ni p \mapsto X(p) \in T\mathcal{P}$  taką, że  $X(p) \in T_p \mathcal{P}$  nazywamy polem wektorowym. Zbiór pól wektorowych na  $\mathcal{P}$  oznaczamy przez  $C^\infty(\mathcal{P}, T\mathcal{P})$ . Pole wektorowe  $X$  zadaje odwzorowanie  $X : C^\infty(\mathcal{P}) \rightarrow C^\infty(\mathcal{P})$  (czasami oznaczane przez  $X^\#$ ). We współrzędnych ma ono postać

$$Xf(x) = X^j(x) \partial_{x^j} f(x).$$



Komutator dwóch pól wektorowych jest też polem wektorowym:

$$[X, Y] = (X^j(x)\partial_{x^j}Y^i(x) - Y^j(x)\partial_{x^j}X^i(x))\partial_{x^i}.$$

Pola wektorowe można przenosić przez dyfeomorfizm. Dla  $\Phi \in \text{Diff}(\mathcal{P})$ , definiujemy  $\Phi_{\#} : C^{\infty}(\mathcal{P}, \mathbb{T}\mathcal{P}) \rightarrow C^{\infty}(\mathcal{P}, \mathbb{T}\mathcal{P})$  przez

$$\Phi_{\#}(X^{\#}) := \Phi_{\#} \circ X \circ \Phi_{\#}^{-1},$$

czyli

$$\Phi_{\#}(X^{\#})f(p) = (X(f \circ \Phi))(\Phi^{-1}(p)).$$

We współrzędnych:

$$\Phi_{\#}(X^{\#}) = X^j(y)\frac{\partial\Phi^i(y)}{\partial y^j}\Big|_{y=\Phi^{-1}(x)}\partial_{x^i}.$$

Mamy

$$(\Phi_{\#}(X)f)(p) = \mathbb{T}_q\Phi(X(q))f \circ \Phi(p)\Big|_{q=\Phi^{-1}(p)}.$$

### 3.4 Pola wektorowe definiujące potok

Rodzinę dyfeomorfizmów  $\Phi_t$  zależy w sposób gładki od  $t \in \mathbb{R}$  będziemy nazywali potokiem. Dla każdego  $p \in \mathcal{P}$ ,  $t \mapsto \Phi_t(p)$  definiuje krzywą. Wzór

$$\frac{d}{dt}\Phi_t(p) = X_t(\Phi_t(p)). \quad (3.6)$$

definiuje więc rodzinę pól wektorowych  $X_t$ . Równoważnie,

$$\frac{d}{dt}\Phi_t^{\#} = \Phi_t^{\#} \circ X_t.$$

Mówimy, że potok  $\Phi_t$  jest generowany przez  $X_t$ .

Można zadać rodzinę pól wektorowych  $\mathbb{R} \ni t \mapsto X_t$  i rozważać istnienie rozwiązań (3.6) z  $\Phi_0 = \text{Id}$ . Rozwiązania takie lokalnie (w  $\mathcal{P}$  i w czasie) istnieją i są jednoznaczne.

W szczególności, jeśli

$$\frac{d}{dt}\Phi_t(p) = X(\Phi_t(p)), \quad (3.7)$$

to  $\Phi_t$  jest jednoparametrową grupą i piszemy  $\Phi_t = e^{tX}$ . Równoważnie,

$$\frac{d}{dt}\Phi_t^{\#} = X \circ \Phi_t^{\#} = \Phi_t^{\#} \circ X, \quad (3.8)$$

Jeśli  $X$  jest zadany polem wektorowym takim, że istnieje rozwiązanie (3.7 dla małych  $t$ , to istnieje dla  $t \in \mathbb{R}$ .

### 3.5 Algebra Liego grupy Liego

Niech  $G$  będzie grupą Liego. Dla  $g \in G$  definiujemy lewe i prawe przesunięcie:

$$L_g h := gh, \quad R_g h := hg^{-1}, \quad h \in G.$$

Dostajemy homomorfizmy

$$G \ni g \mapsto L_g \in \text{Diff}(G), \quad G \ni g \mapsto R_g \in \text{Diff}(G).$$

Mamy

$$L_{g\#} f(h) = f(g^{-1}h), \quad R_{g\#} f(h) = f(hg).$$

Niech  $Kh := h^{-1}$ . Mamy

$$KL_gK = R_g.$$

Mówimy, że pole  $X$  na  $G$  jest lewoniemiennicze, gdy

$$L_{g\#}(X) = X, \quad g \in G.$$

Równoważny warunek

$$\mathbb{T}_h L_g(X(h)) = X(gh), \quad g, h \in G.$$

**Twierdzenie 3.1** *Pola lewoniemiennicze tworzą algebrę Liego.*

**Stwierdzenie 3.2** *Niech  $G = GL(\mathcal{V})$ . Wtedy  $\mathbb{T}_h G = L(\mathcal{V})$ . Jeśli  $A \in L(\mathcal{V})$ , to  $G \ni g \mapsto gA \in L(\mathcal{V})$  jest polem lewoniemiennicznym takim, które dla  $g = \mathbb{1}$  przyjmuje wartość  $A$ .*

**Twierdzenie 3.3** *Niech  $G$  będzie spójną grupą Liego. Wtedy dla każdego  $v \in \mathbb{T}_\mathbb{1}G$  istnieje dokładnie jedno pole lewoniemiennicze  $V$  takie, że  $V(\mathbb{1}) = v$ .*

**Dowód.** Kładziemy

$$V(h) := \mathbb{T}_\mathbb{1} L_h(v).$$

Mamy wtedy

$$\mathbb{T}_h L_g(V(h)) = \mathbb{T}_h L_g(\mathbb{T}_\mathbb{1} L_h(V(\mathbb{1}))) = \mathbb{T}_\mathbb{1} L_g L_h(V(\mathbb{1})) = \mathbb{T}_\mathbb{1} L_{gh}(V(\mathbb{1})) = V(gh).$$

□

Algebra Liego lewoinwariantnych pól na grupie  $G$  jest nazywana *algebrą Liego grupy  $G$*  i oznaczana przez  $\mathfrak{g}$ . Jest ona naturalnie izomorficzna algebrze Liego prawoinwariantnych pól, jak również przestrzeni  $\mathbb{T}_\mathbb{1}G$ .

### 3.6 Odwzorowanie eksponencjalne

Niech  $X$  będzie polem lewoniezmiennicznym

$$\frac{d}{ds}\phi(s) = X(\phi(s)), \quad \phi(0) = g$$

ma zawsze rozwiązanie w otoczeniu zera, które oznaczamy  $\phi_{X,g}(s)$ .

**Stwierdzenie 3.4** *Jeśli  $]-\epsilon, \epsilon[ \ni s \mapsto \phi_{X,h}(s)$  jest zdefiniowane, to*

$$]-\epsilon, \epsilon[ \ni s \mapsto \phi_{X,gh}(s) = g\phi_{X,h}(s).$$

Sprawdzamy, że

$$\frac{d}{ds}g\phi_{X,h}(s) = L_{g\#}(X)(g\phi(s)) = X(g\phi(s)), \quad g\phi_{X,h}(0) = gh.$$

Korzystamy z jednoznaczności rozwiązania.  $\square$

**Stwierdzenie 3.5**  $\phi_{X,\mathbb{1}}(t_1)\phi_{X,\mathbb{1}}(t_2) = \phi_{X,\mathbb{1}}(t_1 + t_2)$ .

**Dowód.** Korzystając ze Stw. 3.4, dostajemy

$$\phi_{X,\mathbb{1}}(t_1)\phi_{X,\mathbb{1}}(t_2) = \phi_{X,\phi_{X,\mathbb{1}}(t_1)}(t_2)$$

$\square$

Zatem można przedłużać  $s \mapsto \phi_{X,h}(s)$  na całe  $\mathbb{R}$ . Kładziemy

$$\exp(X) := \phi_{X,\mathbb{1}}(1).$$

**Stwierdzenie 3.6** *Mamy własności*

$$\begin{aligned} \exp(tX) &= \phi_{X,\mathbb{1}}(t), \\ \frac{d}{dt}\exp(tX) &= X(\exp(tX)), \\ \exp(t_1X)\exp(t_2X) &= \exp((t_1 + t_2)X). \end{aligned}$$

Jeśli  $G \subset GL(\mathcal{V})$ , to  $X(g) = gv$ , gdzie  $v = X(\mathbb{1}) \in gl(\mathcal{V})$ . Wtedy

$$\exp(tX) = e^{tv}$$

jest zwykłą funkcją eksponencjalną.

**Twierdzenie 3.7** *Istnieje otoczenie  $\mathcal{U} \subset \mathfrak{g}$  takie, że  $\mathcal{U} \ni X \mapsto \exp X \in G$  jest dyfeomorfizmem na pewne otoczenie  $\mathbb{1}$  w  $G$ .*

**Dowód.** Pokażemy to tylko dla  $GL(\mathcal{V})$ . Funkcja

$$\log(A) = \sum \frac{(-1)^{n+1}(\mathbb{1} - A)^n}{n}$$

jest analityczna dla  $\|\mathbb{1} - A\| < 1$  i  $\exp(\log A) = \mathbb{1}$ .  $\square$

### 3.7 Odwzorowanie pochodne

**Twierdzenie 3.8** Niech  $\phi : H \rightarrow G$  będzie homomorfizmem grup Liego. Niech  $\mathfrak{h} = T_{\mathbb{1}}H$ ,  $\mathfrak{g} = T_{\mathbb{1}}G$  będą ich algebraami Liego. Wtedy  $\phi' := T_{\mathbb{1}}\phi : \mathfrak{h} \rightarrow \mathfrak{g}$  jest homomorfizmem algebra Liego. Poza tym, następujący diagram jest przemienny:

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{h} & \xrightarrow{\phi'} & \mathfrak{g} \\ \exp \downarrow & & \downarrow \exp \\ H & \xrightarrow{\phi} & G \end{array}$$

jest przemienny.

**Dowód.** Niech  $X \in \mathfrak{h}$ ,  $Y \in \mathfrak{g}$  będą polami lewoniezmiennicznymi na  $H$  i  $G$  takimi, że  $Y = \phi'(X)$ . Niech  $g = \phi(h)$ .

$$\begin{aligned} X(h) &= T_{\mathbb{1}}L_h X(\mathbb{1}), \\ Y(g) &= T_{\mathbb{1}}L_g Y(\mathbb{1}) = T_{\mathbb{1}}L_g T_{\mathbb{1}}\phi X(\mathbb{1}) = T_{\mathbb{1}}L_g \phi X(\mathbb{1}) \\ &= T_{\mathbb{1}}\phi L_h X(\mathbb{1}) = T_h \phi X(h). \end{aligned}$$

(...)  $\square$

## 4 Klasyczne algebra i grupy Liego

### 4.1 Algebra Liego macierzy bezśladowych

Definiujemy

$$SL(\mathbb{K}^n) = SL(n, \mathbb{K}) := \{A \in GL(\mathbb{K}^n) : \det A = 1\}.$$

Niech  $A \in L(\mathbb{K}^n)$ . Wzór

$$\text{Tr} A := \sum_{i=1}^n A_{ii} \in \mathbb{K}$$

definiuje ślad spełniający

$$\text{Tr} AB = \text{Tr} BA, \quad \det e^A = e^{\text{Tr} A}.$$

Zauważmy, że  $\text{Tr}[A, B] = 0$ .

$sl(\mathbb{K}^n)$  definiujemy jako

$$sl(\mathbb{K}^n) := \{A \in gl(\mathbb{K}^n) : \text{Tr} A = 0\}.$$

Jest to algebra Liego. Piszemy też

$$sl(\mathbb{K}^n) = sl(n, \mathbb{K}).$$

Oczywiście,  $A \in sl(n, \mathbb{K})$  implikuje  $e^A \in SL(n, \mathbb{K})$ .

Każdą  $B \in SL(\mathbb{C}^n)$  można przedstawić w postaci  $B = e^A$  dla  $A \in sl(\mathbb{C}^n)$ .

Są jednak takie elementy  $SL(\mathbb{R}^n)$ , których nie można przedstawić jako  $e^A$  dla  $A \in sl(\mathbb{R}^n)$ .

Przykładem takim jest  $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ .

## 4.2 Formy niezmiennicze

Niech  $\mathcal{V} \times \mathcal{V} \ni (v, w) \mapsto \langle v|w \rangle \in \mathbb{K}$  będzie formą dwuliniową. Pamiętajmy, że grupa  $G \subset GL(\mathcal{V})$  zachowuje  $\langle \cdot | \cdot \rangle$  gdy

$$\langle gv|gw \rangle = \langle v|w \rangle, \quad g \in G.$$

Oczywiste jest, że odwzorowania odwracalne zachowujące pewną formę stanowią grupę.

Mówimy, że algebra Liego  $\mathfrak{g} \subset gl(\mathcal{V})$  (infinityzmalnie) zachowuje  $\langle \cdot | \cdot \rangle$  gdy

$$\langle v|Xw \rangle + \langle Xv|w \rangle = 0, \quad X \in \mathfrak{g}. \quad (4.9)$$

**Stwierdzenie 4.1** *Odwzorowania infinityzmalnie zachowujące formę stanowią algebrę Liego.*

**Dowód.**

$$\begin{aligned} 0 &= \langle v|XYw \rangle + \langle Xv|Yw \rangle - \langle v|YXw \rangle - \langle Yv|Xw \rangle \\ &\quad + \langle XYv|w \rangle + \langle Yv|Xw \rangle - \langle YXv|w \rangle - \langle Xv|Yw \rangle \\ &= \langle v|[X, Y]w \rangle + \langle [X, Y]v|w \rangle. \end{aligned}$$

□

Jeśli grupa  $G$  zachowuje formę  $\langle \cdot | \cdot \rangle$ , to jej algebra Liego infinityzmalnie zachowuje formę  $\langle \cdot | \cdot \rangle$ . W rzeczy samej,

$$\langle e^{tX}v|e^{tX}w \rangle = \langle v|w \rangle, \quad X \in \mathfrak{g} \quad (4.10)$$

implikuje

$$t\langle v|Xw \rangle + t\langle Xv|w \rangle + O(t^2) = 0, \quad X \in \mathfrak{g}. \quad (4.11)$$

## 4.3 Ortogonalne i pseudoortogonalne algebra Liego

### 4.3.1 Abstrakcyjne podejście

Założmy, że w  $\mathcal{V}$  mamy niezdegenerowaną symetryczną formę dwuliniową –iloczyn skalarny. Pamiętajmy, że

$$O(\mathcal{V}) = \{B \in GL(\mathcal{V}) : \langle Bv|Bw \rangle = \langle v|w \rangle\}.$$

$A \in gl(\mathcal{V})$  należy do  $so(\mathcal{V})$  gdy infinityzmalnie zachowuje iloczyn skalarny czyli  $\langle Av|w \rangle + \langle v|Aw \rangle = 0$ .

### 4.3.2 Kanoniczna forma

W szczególności, niech  $\mathcal{V} = \mathbb{K}^n$  i forma będzie kanoniczna

$$\langle v|w \rangle = v_1w_1 + \dots + v_nw_n.$$

Wtedy  $B \in O(\mathbb{K}^n)$  gdy  $B^\#B = \mathbf{1}$ .  $B \in O(\mathbb{K}^n)$  implikuje  $\det B = \pm 1$ . Kładziemy  $SO(\mathbb{K}^n) := O(\mathbb{K}^n) \cap SL(\mathbb{K}^n)$ .

Dla formy kanonicznej,  $A \in o(\mathbb{K}^n)$  gdy  $A^\# + A = 0$ . Jest to podalgebra Liego w  $sl(\mathbb{K}^n)$ . Jest ona algebrą Liego grupy Liego  $SO(\mathbb{K}^n)$ . Piszemy też

$$so(\mathbb{R}^n) = so(n).$$

W przypadku zespolonym piszemy też  $so(n, \mathbb{C}) = so(\mathbb{C}^n)$ .

Każdą  $B \in SO(\mathbb{K}^n)$  można przedstawić w postaci  $B = e^A$  dla  $A \in so(\mathbb{K}^n)$ .

### 4.3.3 Forma o sygnaturze $(q, p)$

Wyposażmy  $\mathbb{R}^n$  w formę o sygnaturze  $(q, p)$ :

$$\langle v|w \rangle_{q,p} = -v_1w_1 - \dots - v_qw_q + v_{q+1}w_{q+1} + \dots + v_{q+p}w_{q+p} = \langle v|I_{q,p}w \rangle.$$

$B \in O(q, p)$  kiedy

$$B^\# I_{q,p} B = I_{q,p}.$$

$B \in O(q, p)$  implikuje  $\det B = \pm 1$ . Piszemy  $SO(q, p) := SL(q+p) \cap O(q, p)$ .

$A \in so(\mathbb{R}^{q,p})$  wtedy i tylko wtedy gdy

$$A^\# I_{q,p} + I_{q,p} A = 0.$$

Jest to podalgebra Liego w  $sl(\mathbb{R}^{q+p})$ . Jest to algebra Liego grupy Liego  $SO(\mathbb{R}^{q,p})$ . Piszemy też

$$so(\mathbb{R}^{q,p}) = so(q, p).$$

## 4.4 Unitarne i pseudounitarne algebry Liego

### 4.4.1 Abstrakcyjne podejście

Załóżmy, że w zespolonej przestrzeni  $\mathcal{V}$  mamy niezdegenerowaną hermitowską formę dwuliniową. Pamiętajmy, że

$$U(\mathcal{V}) = \{B \in GL(\mathcal{V}) : (Bv|Bw) = (v|w)\}.$$

$A \in gl(\mathcal{V})$  należy do  $u(\mathcal{V})$  gdy infinitesimalnie zachowuje iloczyn skalarny czyli  $(Av|w) + (v|Aw) = 0$ .

### 4.4.2 Kanoniczna forma

W szczególności, niech  $\mathcal{V} = \mathbb{C}^n$  i forma będzie kanoniczna

$$(v|w) = \bar{v}_1w_1 + \dots + \bar{v}_nw_n.$$

Wtedy  $B \in U(n)$  gdy  $B^*B = \mathbb{1}$ .  $B \in U(n)$  implikuje  $|\det B| = 1$ . Kładziemy  $SU(n) := O(n) \cap SL(\mathbb{C}^n)$ .

Dla formy kanonicznej,  $A \in u(n)$  gdy  $A^* + A = 0$ . Jest ona algebrą Liego grupy Liego  $U(n)$ .

Kładziemy też  $su(n) := u(n) \cap sl(\mathbb{C}^n)$ . Jest to algebra Liego grupy  $SU(n)$ .

Każdą  $B \in SU(n)$  można przedstawić w postaci  $B = e^A$  dla  $A \in su(n)$ .

### 4.4.3 Forma o sygnaturze $(q, p)$

Wyposaźmy  $\mathbb{C}^n$  w formę hermitowską o sygnaturze  $(q, p)$ :

$$(v|w)_{q,p} = -\bar{v}_1 w_1 - \dots - \bar{v}_q w_q + \bar{v}_{q+1} w_{q+1} + \dots + \bar{v}_{q+p} w_{q+p} = (v|I_{q,p}w).$$

$B \in U(q, p)$  kiedy

$$B^* I_{q,p} B = I_{q,p}.$$

$B \in U(q, p)$  implikuje  $|\det B| = 1$ . Piszemy  $SU(q, p) := SL(\mathbb{C}^{q+p}) \cap U(q, p)$ .

$A \in u(q, p)$  wtedy i tylko wtedy gdy

$$A^* I_{q,p} + I_{q,p} A = 0.$$

Mamy też  $su(q, p) := u(q, p) \cap sl(\mathbb{C}^{q+p})$ .

### 4.5 Symplektyczna algebra Liego

Niech  $\langle v|Jw \rangle$  będzie formą antysymetryczną na  $\mathcal{V}$ . Kładziemy

$$Sp(\mathcal{V}) = \{B \in GL(\mathcal{V}) : \langle Bv|JBw \rangle = \langle v|Jw \rangle\}.$$

W szczególności, jeśli  $\mathcal{V} = \mathbb{K}^{2n}$ , to standardowo wybieramy  $J = \begin{bmatrix} 0 & \mathbb{1}_n \\ -\mathbb{1}_n & 0 \end{bmatrix}$ . Wtedy piszemy  $Sp(\mathbb{K}^{2n}) = Sp(n, \mathbb{K})$ . Można pokazać, że  $Sp(\mathbb{K}^{2n}) \subset SL(\mathbb{K}^{2n})$ .

Definiujemy

$$sp(\mathbb{K}^{2n}) := \{A \in L(\mathbb{K}^{2n}) : A^\# J + JA = 0\}$$

Latwo pokazać, że ślad macierzy symplektycznych jest równy 0. Dlatego  $sp(\mathbb{K}^{2n})$  jest podalgebrą Liego w  $sl(\mathbb{K}^{2n})$ .  $sp(\mathbb{K}^{2n})$  jest algebrą Liego grupy  $Sp(\mathbb{K}^{2n})$ .

### 4.6 Przemienne grupy i algebry Liego

Jednowymiarowe macierze postaci  $e^t$  i  $e^{it}$ , gdzie  $t \in \mathbb{R}$  stanowią przemienne grupy Liego. Ich algebry Liego są izomorficzne z  $\mathbb{R}$ .

Jeśli  $\mathfrak{g} \in gl(\mathcal{V})$  jest jakąkolwiek algebrą Liego, to  $\exp(\mathfrak{g})$  nie musi być konkretną grupą Liego. Ilustruje poniższy przykład:

Rozważmy 1-wymiarową algebrę Liego w  $gl(\mathbb{C}^2)$ . rozpiętą na  $X := \begin{bmatrix} i\alpha & 0 \\ 0 & i\beta \end{bmatrix}$ , gdzie  $\frac{\alpha}{\beta}$  jest niewymierne. Wtedy  $\{e^{tX} : t \in \mathbb{R}\}$  jest gęsta w macierzach diagonalnych. Wynika to z tego, że  $e^{i\frac{\beta}{\alpha}n}$  jest gęste w okręgu jednostkowym.

## 5 Iloczyn tensorowy

### 5.1 Symetryczny i antsymetryczny iloczyn tensorowy

Niech  $\mathcal{V}$  będzie przestrzenią wektorową.

**Twierdzenie 5.1** Dla  $\sigma \in S_n$  istnieje dokładnie jeden operator  $\Theta(\sigma) \in L(\otimes^n \mathcal{V})$ , dla którego

$$\Theta(\sigma)v_1 \otimes \cdots \otimes v_n = v_{\sigma^{-1}1} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma^{-1}n}.$$

$$S_n \ni \sigma \mapsto \Theta(\sigma) \in L(\mathcal{V}^{\otimes n})$$

jest reprezentacją.

**Dowód.** Wystarczy wybrać bazę  $e_1, \dots, e_m$  w  $\mathcal{V}$  i położyć

$$\Theta(\sigma)e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_n} = e_{i_{\sigma^{-1}1}} \otimes \cdots \otimes e_{i_{\sigma^{-1}n}}$$

To definiuje jednoznacznie operator  $\Theta(\sigma)$ .

Pokażmy, że  $\Theta(\pi)\Theta(\sigma) = \Theta(\pi\sigma)$ . Niech  $v_1, \dots, v_n \in \mathcal{V}$  i  $w_i := v_{\sigma^{-1}i}$ . Wtedy

$$\begin{aligned} \Theta(\pi)\Theta(\sigma)v_1 \otimes \cdots \otimes v_n &= \Theta(\pi)w_1 \otimes \cdots \otimes w_n \\ &= w_{\pi^{-1}1} \otimes \cdots \otimes w_{\pi^{-1}n} \\ &= v_{\sigma^{-1}\pi^{-1}1} \otimes \cdots \otimes v_{\sigma^{-1}\pi^{-1}n} \\ &= v_{(\pi\sigma)^{-1}1} \otimes \cdots \otimes v_{(\pi\sigma)^{-1}n}. \end{aligned}$$

Jeśli  $\mathcal{V}$  jest przestrzenią Hilberta, jest to reprezentacja unitarna.

Jest to reprezentacja przywiedlna. W szczególności, można podać rzuty ortogonalne na podprzestrzenie na których reprezentacja jest trywialna i znakowa:

$$\begin{aligned} \Theta_s^n &:= \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} \Theta(\sigma), \\ \Theta_a^n &:= \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}\sigma \Theta(\sigma). \end{aligned}$$

Kładziemy  $\otimes_{s/a}^n \mathcal{V} := \Theta_{s/a}^n \otimes^n \mathcal{V}$ .

Zauważmy, że

$$\begin{aligned} \Theta_s^2 &:= \frac{1}{2}(\mathbb{1} + \Theta(\tau)), \\ \Theta_a^2 &:= \frac{1}{2}(\mathbb{1} - \Theta(\tau)). \end{aligned}$$

Zatem  $\mathbb{1} = \Theta_s^2 + \Theta_a^2$ . Czyli każdy 2-tensor można rozłożyć na część symetryczną i antysymetryczną:  $\otimes^2 \mathcal{V} = \otimes_s^2 \mathcal{V} \oplus \otimes_a^2 \mathcal{V}$ .

Jeśli  $t \in \otimes^n \mathcal{V}$ , to

$$t = \sum t_{i_1, \dots, i_n} e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_n}.$$

Wtedy

$$\begin{aligned} \Theta_s t &= \sum t_{(i_1, \dots, i_n)} e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_n}, \\ \Theta_a t &= \sum t_{[i_1, \dots, i_n]} e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_n}, \end{aligned}$$



gdzie

$$\begin{aligned} t_{(i_1, \dots, i_n)} &= \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} t_{i_{\sigma 1}, \dots, i_{\sigma n}}, \\ t_{[i_1, \dots, i_n]} &= \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn} \sigma t_{i_{\sigma 1}, \dots, i_{\sigma n}}. \end{aligned}$$

Mamy

$$\dim \otimes_s^n \mathbb{C}^d = \frac{(d+n-1)!}{(d-1)!n!}, \quad \dim \otimes_a^n \mathbb{C}^d = \frac{d!}{n!(d-n)!}.$$

## 5.2 Second quantization of operators

For a contraction  $q$  on  $\mathcal{Z}$  we define the operator  $\Gamma(q)$  on  $\Gamma_{s/a}(\mathcal{Z})$  by

$$\Gamma(q) \Big|_{\otimes_{s/a}^n \mathcal{Z}} = q \otimes \cdots \otimes q \Big|_{\otimes_{s/a}^n \mathcal{Z}}.$$

$\Gamma(q)$  is called the *second quantization of  $q$* .

Similarly, for an operator  $h$  we define the operator  $d\Gamma(h)$  by

$$d\Gamma(h) \Big|_{\otimes_{s/a}^n \mathcal{Z}} = h \otimes 1^{(n-1)\otimes} + \cdots + 1^{(n-1)\otimes} \otimes h \Big|_{\otimes_{s/a}^n \mathcal{Z}}.$$

$d\Gamma(h)$  is called the *(infinitesimal) second quantization of  $h$* .

Traditional notation: If  $h$  is the multiplication operator by  $h(\xi)$ , then  $d\Gamma(h) = \int h(\xi) a_\xi^* a_\xi d\xi$ .

Note the identity  $\Gamma(e^{ith}) = e^{itd\Gamma(h)}$ .

## 5.3 Prawo eksponencjalne dla przestrzeni Focka

Niech  $\mathcal{Y}_1$  i  $\mathcal{Y}_2$  będą przestrzeniami Hilberta i  $j_i : \mathcal{Y}_i \rightarrow \mathcal{Y}_1 \oplus \mathcal{Y}_2$  kanonicznymi włożeniami.

Wprowadźmy

$$U : \Gamma_{s/a}^{\text{fin}}(\mathcal{Y}_1) \otimes \Gamma_{s/a}^{\text{fin}}(\mathcal{Y}_2) \rightarrow \Gamma_{s/a}^{\text{fin}}(\mathcal{Y}_1 \oplus \mathcal{Y}_2)$$

następująco. Niech  $\Psi_1 \in \Gamma_{s/a}^{n_1}(\mathcal{Y}_1)$ ,  $\Psi_2 \in \Gamma_{s/a}^{n_2}(\mathcal{Y}_2)$ . Wtedy

$$U\Psi_1 \otimes \Psi_2 := \sqrt{\frac{(n_1+n_2)!}{n_1!n_2!}} (\Gamma(j_1)\Psi_1) \otimes_{s/a} (\Gamma(j_2)\Psi_2). \quad (5.12)$$

**Twierdzenie 5.2** (1)  $U$  rozszerza się do unitarnego operatora z  $\Gamma_{s/a}(\mathcal{Y}_1) \otimes \Gamma_{s/a}(\mathcal{Y}_2)$  do  $\Gamma_{s/a}(\mathcal{Y}_1 \oplus \mathcal{Y}_2)$ .

(2)  $U\Omega_1 \otimes \Omega_2 = \Omega$ .

(3) Jeśli  $h_i \in B(\mathcal{Y}_i)$ , wtedy

$$d\Gamma(h_1 \oplus h_2)U = U(d\Gamma(h_1) \otimes \mathbf{1} + \mathbf{1} \otimes d\Gamma(h_2)). \quad (5.13)$$

(4) Jeśli  $p_i \in B(\mathcal{Y}_i)$ , wtedy

$$\Gamma(p_1 \oplus p_2)U = U\Gamma(p_1) \otimes \Gamma(p_2). \quad (5.14)$$

**Dowód.** Pokażmy (1) dla przypadku symetrycznego. Niech  $\Psi_1 \in \Gamma_s^{n_1}(\mathcal{Y}_1)$ ,  $\Psi_2 \in \Gamma_s^{n_2}(\mathcal{Y}_2)$ . Wtedy

$$\begin{aligned} \Gamma(j_1)\Psi_1 \otimes_s \Gamma(j_2)\Psi_2 &= \frac{1}{(n_1+n_2)!} \sum_{\sigma \in S_{n_1+n_2}} \Theta(\sigma)\Gamma(j_1)\Psi_1 \otimes \Gamma(j_2)\Psi_2 \\ &= \frac{n_1!n_2!}{(n_1+n_2)!} \sum_{[\sigma] \in S_{n_1+n_2}/S_{n_1} \times S_{n_2}} \Theta(\sigma)\Gamma(j_1)\Psi_1 \otimes \Gamma(j_2)\Psi_2. \end{aligned}$$

Elementy sumy z prawej są wzajemnie ortogonalne. Zatem

$$\begin{aligned} \|\Gamma(j_1)\Psi_1 \otimes_s \Gamma(j_2)\Psi_2\|^2 &= \left( \frac{n_1!n_2!}{(n_1+n_2)!} \right)^2 \sum_{[\sigma] \in S_{n_1+n_2}/S_{n_1} \times S_{n_2}} \|\Theta(\sigma)\Psi_1 \otimes \Psi_2\|^2 \\ &= \frac{n_1!n_2!}{(n_1+n_2)!} \|\Psi_1 \otimes \Psi_2\|^2. \end{aligned}$$

□

#### 5.4 Utożsamienie iloczynu tensorowego i operatorów liniowych

Rozważmy przestrzeń wektorową skończenie wymiarową  $\mathcal{V}$ . Wybierzmy bazę  $e_1, \dots, e_n$ . Mamy wtedy bazę w przestrzeni dualnej  $e^1, \dots, e^n$ . Wektor  $v \in \mathcal{V}$  możemy zapisywać na wiele sposobów

$$v = v^i e_i = [v^i].$$

Niech  $\mathcal{W}$  będzie również skończenie wymiarową przestrzenią. Wybierzmy w niej bazę  $f_1, \dots, f_m$ . Zdefiniujmy  $J : \mathcal{V} \otimes \mathcal{W} \rightarrow L(\mathcal{W}^\#, \mathcal{V})$  następująco:

$$J(e_i \otimes f_j)\xi := e_i \langle f_j | \xi \rangle.$$

Zauważmy, że  $\Phi \in \mathcal{V} \otimes \mathcal{W}$  i  $J(\Phi)$  mają tę samą macierz:

$$\Phi = \Phi^{ij} e_i \otimes f_j, \quad J(\Phi)f^j = \Phi^{ij} e_i.$$

Jeśli  $P \in L(\mathcal{V})$ ,  $Q \in L(\mathcal{W})$ , to

$$P \otimes Q \Phi = PJ(\Phi)Q^\#.$$

W szczególności, jeśli  $\mathcal{W} = \mathcal{V}^\#$ , to  $J(e_i \otimes e^i) = \mathbb{1}_\mathcal{V}$ .

Niech  $\Psi \in \mathcal{V}^\# \otimes \mathcal{W}^\#$ . Wtedy

$$\text{Tr}ST = \langle J(S) | J(T) \rangle.$$

## 6 Zwarte grupy i ich reprezentacje

### 6.1 Reprezentacje

Rozważmy reprezentację  $\rho : \mathfrak{g} \rightarrow gl(\mathcal{V})$  lub  $\rho : G \rightarrow GL(\mathcal{V})$ . Mówimy, że reprezentacja jest *przywiedlna*, gdy posiada nietrywialną podprzestrzeń niezmienniczą. W przeciwnym razie mówimy, że jest *nieprzywiedlna*.

Mówimy, że reprezentacja jest *rozkładalna*, gdy posiada nietrywialny rozkład na sumę prostą podprzestrzeni niezmienniczych. W przeciwnym razie mówimy, że jest *nierozkładalna*.

Każda reprezentacja rozkładalna jest przywiedlna.

W oczywisty sposób definiujemy *sumę prostą*. *Iloczyn tensorowy* reprezentacji  $\rho_1$  i  $\rho_2$  działa w  $\mathcal{V}_1 \otimes \mathcal{V}_2$  i jest równy dla grup  $\rho_1 \otimes \rho_2$  a dla algebr Liego  $\rho_1 \otimes \mathbb{1} + \mathbb{1} \otimes \rho_2$ .

Mówimy, że reprezentacja jest *całkowicie rozkładalna*, gdy istnieje rozkład  $\mathcal{V} = \bigoplus_{j=1}^n \mathcal{V}_j$  takie, że reprezentacja ograniczona do  $\mathcal{V}_j$  jest nieprzywiedlna.

(Zauważmy następującą niekonsekwencję terminologiczną: reprezentacja nieprzywiedlna jest całkowicie rozkładalna, ale nierozkładalna).

Jeśli  $\mathcal{V}_1 \subset \mathcal{V}$  jest podprzestrzenią niezmienniczą, to  $\rho_1 := \rho|_{\mathcal{V}_1}$  nazywamy *podreprezentacją* reprezentacji  $\rho$ . Mamy również naturalną *reprezentację ilorazową*  $\rho^1 : \mathfrak{g} \rightarrow L(\mathcal{V}/\mathcal{V}_1)$  zadaną przez  $\rho^1(A)(v + \mathcal{V}_1) = \rho(A)v + \mathcal{V}_1$ . Wybierając bazę w  $\mathcal{V}$  tak, by pierwsze wektory należały do  $\mathcal{V}_1$ , możemy wtedy napisać

$$\rho(A) = \begin{bmatrix} \rho_1(A) & ? \\ 0 & \rho^1(A) \end{bmatrix}.$$

Jeśli istnieje podprzestrzeń niezmiennicza  $\mathcal{V}^1$  dopełniająca do  $\mathcal{V}_1$ , i bazy dostosujemy do rozkładu  $\mathcal{V} = \mathcal{V}_1 \oplus \mathcal{V}^1$ , to ? znika.

Zauważmy, że jeśli  $\mathcal{W}$  jest podprzestrzenią niezmienniczą dla reprezentacji ilorazowej  $\rho^1$ , to  $\mathcal{W} + \mathcal{V}_1$  jest podprzestrzenią niezmienniczą dla  $\rho$ .

Dla każdej reprezentacji skończonej wymiarowej znajdziemy niezerową podprzestrzeń niezmienniczą. Przez indukcję, konstruujemy ciąg przestrzeni niezmienniczych  $\{0\} = \mathcal{V}_0 \subset \mathcal{V}_1 \subset \mathcal{V}_2 \cdots \subset \mathcal{V}_n = \mathcal{V}$  takich, że reprezentacja ilorazowa na  $\mathcal{V}_{n+1}/\mathcal{V}_n$  jest nieprzywiedlna. Ciąg taki nazywamy *ciągami Jordana-Höldera*. Robimy to indukcyjnie: dla reprezentacji na  $\mathcal{V}/\mathcal{V}_n$  szukamy podreprezentacji nieprzywiedlnej.

### 6.2 Reprezentacja kontrgradientna

Załóżmy, że mamy reprezentację (niekoniecznie unitarną)  $\pi$  grupy  $G$  na skończonej wymiarowej przestrzeni  $\mathcal{V}$ . Reprezentację kontrgradientną do  $\pi$  nazywamy reprezentację  $\pi^{\text{ct}}$  działającą w przestrzeni sprzężonej  $\mathcal{V}^\#$  zadaną przez

$$\pi^{\text{ct}}(g) := \pi(g)^{\#(-1)}, \quad g \in G.$$

Jeśli mamy reprezentację algebry Liego  $\mathfrak{g}$ , jej reprezentacja kontrgradientna jest zdefiniowana jako

$$\pi^{\text{ct}}(A) := -\pi(A)^\#, \quad A \in \mathfrak{g}.$$

$\pi$  jest nieprzywiedlna wtedy i tylko wtedy gdy  $\pi^{\text{ct}}$  jest nieprzywiedlna (bo anihilator przestrzeni niezmienniczej dla  $\pi$  jest niezmienniczy dla  $\pi^{\text{ct}}$ ).

Zauważmy, że dla reprezentacji unitarnych zapisanych w bazie ortonormalnej, reprezentacja kontrgradientna pokrywa się z reprezentacją zespolenie sprzężoną  $\bar{\rho}$ .

### 6.3 Iloczyn reprezentacji i reprezentacji kontrgradientnej

Rozważmy skończenie wymiarową reprezentację grupy  $\rho : G \rightarrow GL(\mathcal{V})$  lub algebry Liego  $\rho : \mathfrak{g} \rightarrow gl(\mathcal{V})$ . Wtedy mamy reprezentację  $\rho \otimes \rho^{\text{ct}}$  lub  $\rho \otimes \mathbb{1} + \mathbb{1} \otimes \rho^{\text{ct}}$  w  $\mathcal{V} \otimes \mathcal{V}^{\#}$ . Wektor  $e_i \otimes e^i$  rozpiną 1-wymiarową przestrzeń na której ta reprezentacja jest trywialna. Ma ona reprezentację dopełniającą, zadaną przez jądro śladu, gdzie korzystamy z utożsamienia  $\mathcal{V} \otimes \mathcal{V}^{\#} \simeq L(\mathcal{V})$ .

Na przykład, jeśli rozważymy algebrę  $sl(n, \mathbb{C})$  lub  $su(n)$  i  $\rho$  jest reprezentacją fundamentalną na  $\mathbb{C}^n$ , to dostaniemy reprezentację dołączoną. Jest ona nieprzywiedlna.

Jeśli rozważymy reprezentację fundamentalną  $so(n, \mathbb{C})$  lub  $so(n)$ , to reprezentacja na macierzach bezśladowych rozkłada się na sumę prostą dwóch podreprezentacji nieprzywiedlnych: w macierzach symetrycznych bezśladowych i w macierzach antysymetrycznych. Ta druga jest tożsąma z reprezentacją dołączoną.

**Twierdzenie 6.1** *Niech  $\pi_1, \pi_2$  będą skończenie wymiarowymi reprezentacjami nieprzywiedlnymi. Wtedy następujące warunki są równoważne:*

- (1)  $\pi_1 \otimes \pi_2$  zawiera  $\iota$ .
- (2)  $\pi_1 \otimes \pi_2$  zawiera  $\iota$  jednokrotnie
- (3)  $\pi_2 \simeq \pi_1^{\text{ct}}$ .

**Dowód.**  $1 \Rightarrow 3$ : Niech  $\Psi \in \mathcal{V}_1 \otimes \mathcal{V}_2$  będzie niezmienniczym wektorem dla  $\pi_1 \otimes \pi_2$ .

$$\Psi = \pi_1(g) \otimes \pi_2(g) \Psi$$

implikuje

$$J(\Psi) = \pi_1(g) J(\Psi) \pi_2(g)^{\#},$$

czyli

$$J(\Psi) \pi_2(g)^{\#-1} = \pi_1(g) J(\Psi),$$

zatem  $J(\Psi)$  splata  $\pi_1$  i  $\pi_2^{\text{ct}}$ . Zatem  $\pi_1 \simeq \pi_2^{\text{ct}}$ .

$3 \Rightarrow 2$ : Z Lematu Schura wynika, że jeśli  $\pi_1 \simeq \pi_2^{\text{ct}}$ , to przestrzeń splataczy  $\pi_1$  z  $\pi_2^{\text{ct}}$  jest jednowymiarowa. Odwracając rozumowanie  $1 \Rightarrow 3$  dostajemy, że przestrzeń wektorów niezmienniczych dla  $\pi_1 \otimes \pi_2$  jest jednowymiarowa.

$2 \Rightarrow 1$  jest oczywiste.  $\square$

### 6.4 Istnienie miary Haara i jego konsekwencje

Załóżmy, że  $(X, dx)$  jest przestrzenią z miarą na której działa mierzalnie grupa  $G$  przez  $(g, x) \mapsto gx$ . Mówimy, że działanie zachowuje miarę, jeśli

$$\int f(x) dx = \int f(gx) dx.$$

W szczególności, grupa działa na sobie na dwa sposoby: z prawej i z lewej. Mówimy, że miara  $dg$  na  $G$  jest lewoniemnienna jeśli

$$\int f(g)dg = \int f(hg)dg,$$

prawoniemnienna jeśli

$$\int f(g)dg = \int f(gh^{-1})dg.$$

**Twierdzenie 6.2** *Na zwartej grupie istnieje dokładnie jedna miara lewo- i prawoniemnienna  $dg$  taka, że  $\int_G dg = 1$ .*

Miarę tę nazywamy *unormowaną miarą Haara*. W szczególności, na skończonej grupie jest to miara licząca podzielona przez rząd grupy.

**Twierdzenie 6.3** *Niech  $(\rho, \mathcal{V})$  będzie reprezentacją grupy zwartej  $G$ . Wtedy istnieje iloczyn skalarny taki, że  $\rho$  jest reprezentacją unitarną*

**Dowód.** Wybieramy dowolny iloczyn skalarny  $(\cdot|\cdot)_0$  na  $\mathcal{V}$  Kładziemy

$$(v|w) := \int (\rho(g)v|\rho(g)w)_0 dg.$$

□

**Wniosek 6.4** *Reprezentacje skończenie wymiarowe grupy zwartej są zawsze całkowicie rozkładalne.*

**Twierdzenie 6.5**  *$\mathfrak{g}$  jest algebrą Liego grupy Liego zwartej wtedy i tylko wtedy gdy posiada dodatni niezdegenerowany iloczyn skalarny.*

## 6.5 Reprezentacje nieprzywiedlne

**Twierdzenie 6.6** *Każda reprezentacja nieprzywiedlna grupy zwartej jest skończenie wymiarowa.*

Niech  $G$  będzie grupą zwartą. Oznaczmy przez  $\hat{G}$  zbiór klas równoważności reprezentacji nieprzywiedlnych w przestrzeniach zespolonych. Możemy założyć, że są unitarne. W szczególności, mamy w  $\hat{G}$  reprezentację trywialną  $\iota$ . Dla każdego elementu  $\hat{G}$  wybierzemy reprezentanta  $(\pi, \mathcal{V}_\pi)$ . Wybierzemy również bazę ortonormalną  $e_{\pi,1}, \dots, e_{\pi,d_\pi}$ , gdzie  $d_\pi := \dim \mathcal{V}_\pi$ . Możemy wtedy zapisać  $\pi$  jako macierz

$$[\pi_{ij}(g)]_{i,j=1,\dots,d_\pi}, \quad g \in G.$$

Mamy też charaktery nieprzywiedlne

$$\chi_\pi(g) := \sum_{i=1}^{d_\pi} \pi_{ii}(g) = \text{Tr} \pi(g)$$

Dla każdej  $\pi \in \hat{G}$  mamy jej reprezentację zespolenie sprzężoną  $\bar{\pi}$ , która pokrywa się z jej reprezentacją kontrgradientną  $\pi^{\text{ct}}$ . Oczywiście,  $\chi_{\bar{\pi}} = \overline{\chi_{\pi}}$ .

W  $L^2(G)$  będziemy używać iloczynu skalarnego

$$(f|f') := \int \overline{f(g)} f'(g) dg.$$

Niech  $L_{\text{cent}}^2(G)$  będzie podprzestrzenią  $L^2(G)$  składającą się z funkcji stałych na klasach sprzężoności.

**Twierdzenie 6.7** (1)  $\sqrt{d_{\pi}} \pi_{ij}$ ,  $\pi \in \hat{G}$ ,  $i, j = 1, \dots, d_{\pi}$  stanowią bazę ortonormalną w  $L^2(G)$ .  
 (2)  $\chi_{\pi}$  stanowią bazę ortonormalną w  $L_{\text{cent}}^2(G)$ .

## 6.6 Rozkład dowolnej reprezentacji

Niech  $(\rho, \mathcal{W})$  będzie reprezentacją grupy  $G$  zwartej na przestrzeni wymiaru  $d_{\rho} < \infty$ . Jest ona całkowicie rozkładalna, czyli można rozłożyć ją na składniki

$$\rho \simeq \bigoplus_{\pi \in \hat{G}} m_{\pi} \pi. \quad (6.15)$$

Zatem

$$d_{\rho} = \sum_{\pi \in \hat{G}} m_{\pi} d_{\pi}. \quad (6.16)$$

$m_{\pi}$  nazywamy *krotnością*  $\pi$  w  $\rho$ . Jeśli  $\rho$  jest reprezentacją unitarną, to można założyć, że suma (6.15) jest ortogonalna.

Mamy rozkład przestrzeni  $\mathcal{W}$  na sumę prostą ortogonalną  $\mathcal{W} = \bigoplus_{\pi \in \hat{G}} \mathcal{W}_{\pi}$  taki, że  $\rho|_{\mathcal{W}_{\pi}}$  jest równoważna  $m_{\pi} \pi$ , oraz rzuty ortogonalne  $Q_{\pi}$  na  $\mathcal{W}_{\pi}$ . Przestrzenie  $\mathcal{W}_{\pi}$  będziemy nazywać przestrzeniami izotypowymi. Oczywiście,  $\mathcal{W}_{\pi} = \text{Ran} Q_{\pi}$ ,

$$\sum_{\pi \in \hat{G}} Q_{\pi} = \mathbb{1}, \quad Q_{\pi}^* = Q_{\pi}, \quad Q_{\pi} Q_{\pi'} = Q_{\pi} \delta_{\pi \pi'}.$$

Będziemy czasem pisać  $Q_{\pi}(\rho)$ ,  $m_{\pi}(\rho)$  żeby podkreślić zależność od  $\rho$ .

**Twierdzenie 6.8** Dla  $\pi \in \hat{G}$

$$m_{\pi}(\rho) = \int \overline{\chi_{\pi}(g)} \chi_{\rho}(g) dg \quad (6.17)$$

$$= (\chi_{\pi} | \chi_{\rho}), \quad (6.18)$$

$$Q_{\pi}(\rho) = d_{\pi} \int \overline{\chi_{\pi}(g)} \rho(g) dg. \quad (6.19)$$

W szczególności, mamy rzut na wektory stałe

$$Q_{\iota}(\rho) = \int \rho(g) dg.$$

**Dowód.** (6.19) ma praktycznie taki sam dowód jak dla grupy skończonej. Możemy znaleźć bazę ortonormalną w  $\mathcal{W}_\pi$   $e_{\pi,i,p}$ ,  $i = 1, \dots, d_\pi$ ,  $p = 1, \dots, m_\pi$  taką, że

$$\rho(g)e_{\pi,i,p} = \sum_{j=1}^{d_\pi} \pi_{ji}(g)e_{\pi,j,p}.$$

Wtedy

$$\begin{aligned} d_\pi \int \overline{\chi_{\pi'}(g)} \rho(g) e_{\pi,i,p} dg &= d_\pi \int \sum_{k=1}^{d_{\pi'}} \sum_{j=1}^{d_\pi} \overline{\pi'_{kk}(g)} \pi_{ji}(g) e_{\pi,j,p} dg \\ &= \delta_{\pi,\pi'} \sum_{k,j=1}^{d_\pi} \delta_{kj} \delta_{ki} e_{\pi,j,p} = \delta_{\pi,\pi'} e_{\pi,i,p}. \end{aligned}$$

□

### Twierdzenie 6.9

$$m_\iota(\rho \otimes \pi) = m_{\bar{\pi}}(\rho) = \int \chi_\pi(g) \chi_\rho(g) dg, \quad (6.20)$$

$$Q_\iota(\rho \otimes \pi) = \int \rho(g) \otimes \pi(g) dg, \quad (6.21)$$

$$\text{Tr}_\pi Q_\iota(\rho \otimes \pi) = \frac{1}{d_\pi} Q_{\bar{\pi}}(\rho), \quad (6.22)$$

$$\sum_{\pi \in \hat{G}} d_\pi \text{Tr}_\pi Q_\iota(\rho \otimes \pi) = \mathbb{1}_\rho. \quad (6.23)$$

**Dowód.** (6.20) jest oczywiste.

(6.22) wynika z (6.21):

$$\begin{aligned} \text{Tr}_\pi Q_\iota(\rho \otimes \pi) &= \int \rho(g) \chi_\pi(g) dg \\ &= \int \rho(g) \overline{\chi_{\bar{\pi}}(g)} dg = \frac{1}{d_\pi} Q_{\bar{\pi}}(\rho). \end{aligned}$$

(6.23) wynika z

$$\sum_{\pi \in \hat{G}} Q_{\bar{\pi}}(\rho) = \mathbb{1}_\rho.$$

□

**Twierdzenie 6.10** Załóżmy, że  $\pi, \pi' \in \hat{G}$ ,  $\Phi \in \text{Ran} Q_\iota(\rho \otimes \pi)$  i  $\Phi' \in \text{Ran} Q_\iota(\rho \otimes \pi')$ . Wtedy

$$d_\pi \text{Tr}_\rho |\Phi\rangle\langle\Phi'| = \delta_{\pi,\pi'} (\Phi'|\Phi) \mathbb{1}_\pi. \quad (6.24)$$

**Dowód.** Oczywiście,

$$\rho(g) \otimes \pi(g)\Phi = \Phi, \quad \rho(g) \otimes \pi'(g)\Phi' = \Phi'.$$

Zatem,

$$\rho(g) \otimes \pi(g)|\Phi\rangle\langle\Phi|(\Phi'|\rho(g)^{-1} \otimes \pi'(g)^{-1} = |\Phi\rangle\langle\Phi|(\Phi'|.$$

Stąd,

$$\pi(g)\mathrm{Tr}_\rho|\Phi\rangle\langle\Phi|(\Phi'|\pi'(g)^{-1} = \mathrm{Tr}_\rho|\Phi\rangle\langle\Phi|(\Phi'|.$$

Więc, z Lematu Schura wynika, że

$$\mathrm{Tr}_\rho|\Phi\rangle\langle\Phi|(\Phi'| = \delta_{\pi,\pi'}c\mathbb{1}_\pi. \quad (6.25)$$

Biorąc ślad (6.25) dostajemy

$$(\Phi'|\Phi) = \delta_{\pi,\pi'}cd_\pi.$$

□

## 6.7 Rozkład iloczynu tensorowego reprezentacji

Szczególnie ważny jest rozkład iloczynu tensorowego dwóch reprezentacji nieprzywiedlnych. Oczywiście,  $\pi \otimes \iota \simeq \pi$ ,  $\pi \otimes \bar{\pi}$  zawiera  $\iota$  z krotnością 1.

Niech  $\pi_1, \pi_2, \pi_3 \in \hat{G}$ . Mamy wzór

$$\begin{aligned} m_{\bar{\pi}_3}(\pi_1 \otimes \pi_2) &= m_\iota(\pi_1 \otimes \pi_2 \otimes \pi_3) \\ &= \int \chi_{\pi_1}(g)\chi_{\pi_2}(g)\chi_{\pi_3}(g)dg. \end{aligned}$$

A oto wzór na odpowiednie rzuty:

$$Q_\iota(\pi_1 \otimes \pi_2 \otimes \pi_3) = \int \pi_1(g) \otimes \pi_2(g) \otimes \pi_3(g)dg, \quad (6.26)$$

$$Q_{\bar{\pi}_3}(\pi_1 \otimes \pi_2) = d_{\pi_3}\mathrm{Tr}_{\pi_3}Q_\iota(\pi_1 \otimes \pi_2 \otimes \pi_3) \quad (6.27)$$

$$= d_{\pi_3} \int \chi_{\pi_3}(g)\pi_1(g) \otimes \pi_2(g)dg. \quad (6.28)$$

## 6.8 Przykład: $\mathbb{Z}_n$

Reprezentacje są numerowane przez  $j \in \mathbb{Z}_n$ :

$$\mathbb{T} \ni k \mapsto \pi_j(\phi) := e^{2\pi ijk}$$

Mamy  $\bar{\pi}_j = \pi_{n-j}$

$$\pi_j \otimes \pi_k \simeq \pi_{j+k}.$$



## 6.9 Przykład: $\mathbb{T} := \mathbb{R}/\mathbb{Z}$

Reprezentacje są numerowane przez  $j \in \mathbb{Z}$ :

$$\mathbb{T} \ni \phi \mapsto \pi_j(\phi) := e^{2\pi i j \phi}$$

Mamy  $\bar{\pi}_j = \pi_{-j}$

$$\pi_j \otimes \pi_k \simeq \pi_{j+k}.$$

## 6.10 Przykład: $S_3$

$S_3$  ma reprezentację trywialną, signum i (2-wymiarową) standardową, którą oznaczamy przez  $\pi$ . Oto tablica charakterów:

	$\iota$	sgn	$\pi$
id	1	1	2
(12)	1	-1	0
(123)	1	1	-1

Mamy

$$\chi_{\pi \otimes \pi} = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \chi_\iota + \chi_{\text{sgn}} + \chi_\pi.$$

## 7 $SL(2, \mathbb{C})$ i $SU(2)$ i ich reprezentacje

W tym rozdziale będziemy badać zwartą grupę Liego  $SU(2)$  i zespoloną grupę Liego  $SL(2, \mathbb{C})$ . Ich algebry Liego to odpowiednio  $su(2)$  i  $sl(2, \mathbb{C})$ .  $sl(2, \mathbb{C})$  jest kompleksyfikacją  $su(2)$ .

### 7.1 Algebra wielomianów

Niech  $\mathcal{V}$  będzie skończenie wymiarową przestrzenią Hilberta. Niech  $\Theta_s$  będzie symetryzatorem. Definiujemy

$$\otimes_s^n \mathcal{V} := \Theta_s^n \otimes^n \mathcal{V}.$$

Mamy wtedy działanie łączne i przemienne:  $\Phi \in \otimes_s^n \mathcal{V}$ ,  $\Psi \in \otimes_s^m \mathcal{V}$ , przechodzi na

$$\Phi \otimes_s \Psi := \Theta_s^{n+m} \Phi \otimes \Psi \in \otimes_s^{n+m} \mathcal{V}.$$

Przykłady:

$$e \otimes_s \cdots \otimes_s e = e \otimes \cdots \otimes e, \quad (7.29)$$

$$f \otimes_s e^{\otimes(n-1)} = \frac{1}{n} (f \otimes e^{\otimes(n-1)} + \cdots + e^{\otimes(n-1)} \otimes f). \quad (7.30)$$

Jeśli  $e_1, \dots, e_d$  jest bazą w  $\mathcal{V}$ , to

$$e_1^{\otimes n_1} \otimes_s \cdots \otimes_s e_d^{\otimes n_d}, \quad n_1 + \cdots + n_d = n,$$

jest bazą w  $\otimes_s^n \mathcal{V}$ .

Wielomianem  $d$  zmiennych jednorodnym stopnia  $n$  nazywamy wyrażenie

$$\sum_{n_1+\dots+n_d=n} t_{n_1,\dots,n_d} y_1^{n_1} \cdots y_d^{n_d}.$$

Wielomiany tworzą algebrę przemienną i łączną oznaczaną czasem  $\mathbb{C}[y_1, \dots, y_d]$ . Odwzorowanie liniowe  $\bigoplus_{n=0}^{\infty} \otimes_s^n \mathcal{V}$  na  $\mathbb{C}[y_1, \dots, y_d]$ , które  $e_1^{\otimes n_1} \otimes_s \cdots \otimes_s e_d^{\otimes n_d}$  przekształca na  $y_1^{n_1} \cdots y_d^{n_d}$ , jest izomorfizmem algebr.

Niech  $G \subset U(\mathcal{V})$  będzie grupą Liego i  $\mathfrak{g} \in u(\mathcal{V})$  jej algebrą Liego. Wtedy

$$G \ni g \mapsto g \otimes \cdots g \Big|_{\otimes_s \mathcal{V}}, \quad (7.31)$$

$$\mathfrak{g} \ni X \mapsto X \otimes \mathbb{1}^{(n-1)\otimes} + \cdots + \mathbb{1}^{(n-1)\otimes} \otimes X \Big|_{\otimes_s^n \mathcal{V}} \quad (7.32)$$

są ich reprezentacjami na  $\otimes_s^n \mathcal{V}$ .

Używając bazy  $e_1, \dots, e_d$ , dla  $g \in G$ ,  $X \in \mathfrak{g}$ , te działania dają się zapisać jako

$$ge_i = e_j g_{ji}, \quad (7.33)$$

$$ge_i^{\otimes n} = (e_j g_{ji})^{\otimes n}, \quad (7.34)$$

$$gy_i^n = (y_j g_{ji})^n; \quad (7.35)$$

$$Xe_i = e_j X_{ji}, \quad (7.36)$$

$$Xe_i^{\otimes n} = n(e_j X_{ji}) \otimes_s e_i^{(n-1)\otimes}, \quad (7.37)$$

$$Xy_i^n = n(y_j X_{ji}) y_i^{n-1}. \quad (7.38)$$

Zatem reprezentacje (7.31) and (7.32) w terminach wielomianów zapisują się

$$gP = P \circ g^\#, \quad (7.39)$$

$$XP = X_{ji} y_j \partial_{y_i} P. \quad (7.40)$$

## 7.2 Reprezentacje $SL(2, \mathbb{C})$ , $sl(2, \mathbb{C})$ , $SU(2)$ , $su(2)$

$SL(2, \mathbb{C})$ ,  $sl(2, \mathbb{C})$ ,  $SU(2)$ ,  $su(2)$  mają reprezentację na  $\mathbb{C}^2$ , którą nazywamy fundamentalną.  $SL(2, \mathbb{C})$  działa w naturalny sposób w  $\mathbb{C}^2$ . Działa więc również w  $\otimes_s^{2l} \mathbb{C}^2$  dla  $l = 0, \frac{1}{2}, 1, \dots$

Oznaczmy bazę kanoniczną w  $\mathbb{C}^2$  przez  $|\uparrow\rangle$  i  $|\downarrow\rangle$ . Wprowadźmy bazę w  $\otimes_s^{2l} \mathbb{C}^2$

$$v_m := |\uparrow\rangle^{l+m} \otimes_s |\downarrow\rangle^{l-m} \quad (7.41)$$

$$= \frac{(l+m)!(l-m)!}{(2l)!} \sum_{\sigma \in S_{2l}/S_{l+m} \times S_{l-m}} \Theta(\sigma) |\uparrow\rangle^{l+m} \otimes |\downarrow\rangle^{l-m} \quad (7.42)$$

Możemy policzyć kwadrat normy:

$$(v_m | v_m) = \left( \frac{(l+m)!(l-m)!}{(2l)!} \right)^2 \#(S_{2l}/S_{l+m} \times S_{l-m}) \quad (7.43)$$

$$= \frac{(l+m)!(l-m)!}{(2l)!}. \quad (7.44)$$

W zapisie wielomianowym  $v_m$  odpowiada jednomianowi  $x_{\uparrow}^{l+m} x_{\downarrow}^{l-m}$ .

Można też używać innej bazy:

$$u_m := \sum |j_1\rangle \otimes \cdots \otimes |j_{2l}\rangle \quad (7.45)$$

$$= \sum_{\sigma \in S_{2l}/S_{l+m} \times S_{l-m}} \Theta(\sigma) |\uparrow\rangle^{l+m} \otimes |\downarrow\rangle^{l-m}, \quad (7.46)$$

gdzie w (7.45) sumujemy po wektorach składających się z  $l-m$  czynników  $|\downarrow\rangle$  i  $l+m$  czynników  $|\uparrow\rangle$ . Oczywiście,

$$v_m = \frac{(l+m)!(l-m)!}{(2l)!} u_m.$$

$$(u_m | u_m) = \frac{(2l)!}{(l+m)!(l-m)!}.$$

### 7.3 $sl(2, \mathbb{C})$ i $su(2)$

Niech  $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$  będą macierzami Pauliego.

$$\sigma_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

Spełniają one

$$\sigma_i \sigma_j = -i \epsilon_{ijk} \sigma_k + \delta_{ij} \mathbb{1}, \quad (7.47)$$

$$(\vec{a} \cdot \vec{\sigma})(\vec{b} \cdot \vec{\sigma}) = \vec{a} \cdot \vec{b} \mathbb{1} - i(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{\sigma}. \quad (7.48)$$

Stanowią one bazę algebry  $sl(2, \mathbb{C})$  i mają relacje komutacyjne

$$\left[ \frac{i\sigma_i}{2}, \frac{i\sigma_j}{2} \right] = \epsilon_{ijk} \frac{i\sigma_k}{2}. \quad (7.49)$$

Będziemy również używać alternatywnej bazy w  $sl(2, \mathbb{C})$

$$N = \frac{1}{2}\sigma_3, \quad A_{\pm} := \frac{1}{2}(\sigma_1 \pm i\sigma_2).$$

Mamy

$$A_+ = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad A_- = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\sigma_1 = A_+ + A_-, \quad \sigma_2 = -iA_+ + iA_-,$$

$$[N, A_{\pm}] = \pm A_{\pm}, \quad [A_+, A_-] = 2N.$$

Na  $sl(2, \mathbb{C})$  mamy iloczyn skalarny śladowy  $\text{Tr}XY$ ,  $X, Y \in sl(2, \mathbb{C})$ . Możemy go też ograniczyć do rzeczywistej podprzestrzeni macierzy hermitowskich bezśladowych  $isu(2, \mathbb{C})$ , wtedy jest dodatkowo określony. Alternatywnie, ten iloczyn skalarny możemy dostać z wyznacznika, mamy bowiem tożsamość

$$\det X = -\frac{1}{2}\text{Tr}X^2, \quad X \in sl(2, \mathbb{C}).$$

$i\sigma_1, i\sigma_2, i\sigma_3$  stanowią bazę ortonormalną algebry Liego  $su(2)$ .

#### 7.4 $so(3, \mathbb{C})$ i $SO(3, \mathbb{C})$

Pamiętamy, że  $A \in SL(2, \mathbb{C})$  możemy przyporządkować

$$\rho_A X := AXA^{-1}, \quad X \in sl(2, \mathbb{C})$$

Zachowuje iloczyn skalarny. Utożsamiając  $sl(2, \mathbb{C})$  z  $\mathbb{C}^3$  dostajemy homomorfizm  $SL(2, \mathbb{C})$  na  $SO(3, \mathbb{C})$  z jądrem  $\{\mathbb{1}, -\mathbb{1}\}$ .

Biorąc  $A \in SU(2)$  i ograniczając się do  $X \in isu(2)$ , dostajemy homomorfizm  $SU(2)$  na  $SO(3)$  z takim samym jądrem.

Mamy też infinitezymalne wersje tych homomorfizmów zadane przez

$$\rho_A X := [A, X].$$

Zadają one izomorfizm  $sl(2, \mathbb{C})$  na  $so(3, \mathbb{C})$  oraz  $su(2)$  na  $so(3)$ .

Bazę w  $so(3)$  stanowią

$$L_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad L_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad L_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Oczywiście,

$$[L_i, L_j] = \epsilon_{ijk} L_k, \\ \rho_{i\sigma_i/2} = L_i, \quad i = 1, 2, 3.$$

#### 7.5 Skończenie wymiarowe reprezentacje $sl(2, \mathbb{C})$

Rozważmy reprezentację  $\pi : sl(2, \mathbb{C}) \rightarrow gl(\mathcal{V})$ . Wprowadźmy operator Casimira

$$C := \frac{1}{4} \left( \pi(\sigma_1)^2 + \pi(\sigma_2)^2 + \pi(\sigma_3)^2 \right) = \pi(N)^2 + \frac{1}{2} \left( \pi(A_+) \pi(A_-) + \pi(A_-) \pi(A_+) \right) \\ = \pi(N)^2 - \pi(N) + \pi(A_+) \pi(A_-) = \pi(N)^2 + \pi(N) + \pi(A_-) \pi(A_+).$$

Sprawdzamy, że  $C$  komutuje z  $\pi(sl(2, \mathbb{C}))$ . Zatem przestrzenie własne operatora  $C$  są niezmiennicze dla  $\pi(sl(2, \mathbb{C}))$ .

Będziemy pomijać  $\pi$ .

**Twierdzenie 7.1** (1) *Dla każdego  $n = 1, 2, \dots$  istnieje jedyna, z dokładnością do równoważności, reprezentacja nieprzywiedlna  $sl(2, \mathbb{C})$  w  $\mathbb{C}^n$ . Nazywamy ją reprezentacją o spinie  $l$ , gdzie  $n = 2l + 1$ . Ma ona następujące własności:*

- (i)  $\text{spec} N = \{-l, -l + 1, \dots, l - 1, l\}$ .
- (ii)  $C = l(l + 1)$ .
- (iii) *Istnieje baza  $\{v_{-l}, \dots, v_l\}$  taka, że*

$$Nv_m = mv_m, \\ A_- v_m = (l + m)v_{m-1}, \\ A_+ v_m = (l - m)v_{m+1}. \tag{7.50}$$

(2) Reprezentacja  $sl(2, \mathbb{C})$  w przestrzeni  $\mathcal{V}$  jest ona równoważna reprezentacji o spinie  $l$  wtedy i tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

- (i) Istnieje w  $\mathcal{V}$  wektor cykliczny  $v_+$  taki, że  $A_+v_+ = 0$  i  $Nv_+ = lv_+$ . (Wektor ten nazywamy wektorem najwyższej wagi).
- (ii) Istnieje w  $\mathcal{V}$  wektor cykliczny  $v_-$  taki, że  $A_-v_- = 0$  i  $Nv_- = -lv_-$ . (Wektor ten nazywamy wektorem najniższej wagi).
- (iii) Reprezentacja jest nieprzywiedlna i  $\max \text{spec} N = l$ .
- (iv) Reprezentacja jest nieprzywiedlna i  $\min \text{spec} N = -l$ .

**Dowód.** Reprezentację o spinie  $l$  można zrealizować w przestrzeni wielomianów rozpiętych przez  $v_m := z_+^{l+m} z_-^{l-m}$ ,  $m = -l, \dots, l$ . Zadana jest przez operatory

$$\begin{aligned} N &:= \frac{1}{2}(z_+ \partial_{z_+} - z_- \partial_{z_-}), \\ A_- &:= z_- \partial_{z_+}, \\ A_+ &:= z_+ \partial_{z_-}. \end{aligned}$$

Sprawdzamy, że dostajemy wtedy reprezentację (7.50).

Pokażmy, że jest ona nieprzywiedlna. Niech  $\mathcal{V}_0$  będzie podprzestrzenią niezmienniczą. Niech  $x = \sum_{m=-l}^l x_m v_m \in \mathcal{V}_0$ . Operator  $N$  zachowuje  $\mathcal{V}_0$ . Zatem  $\prod_{m \neq n} (N - m)x = cx_n v_n \in \mathcal{V}_0$ , gdzie  $c \neq 0$ . Zatem jeśli  $x_n \neq 0$ , to  $v_n \in \mathcal{V}_0$ . Ale wtedy, działając  $A^+$  i  $A^-$  dostajemy wszystkie  $v_m$ .

Założmy teraz, że  $sl(2, \mathbb{C})$  działa nieprzywiedlnie w skończenie wymiarowej przestrzeni  $\mathcal{V}$ . Pokażmy najpierw, że jeśli  $\lambda \in \text{spec} N$ , to  $\text{spec} N \subset \lambda + \mathbb{Z}$ . W istocie,  $N$  posiada wektor własny  $v \in \mathcal{V}$ :

$$Nv = \lambda v.$$

Ponieważ  $\mathcal{V}$  jest nieprzywiedlna, dowolny wektor w  $\mathcal{V}$  jest liniową kombinacją  $A_1 \cdots A_n v$ , gdzie  $A_i = A_{\pm}$  lub  $A_i = N$ . Poza tym,

$$NA_+v = (\lambda + 1)A_+v, \quad NA_-v = (\lambda - 1)A_-v.$$

Korzystając, z tego, że  $\mathcal{V}$  jest skończenie wymiarowa, dostajemy  $\lambda_{\pm}$  takie, że  $\lambda_- = \min \text{spec} N$ ,  $\lambda_+ = \max \text{spec} N$ . Niech  $Nv_{\pm} = \lambda_{\pm}v_{\pm}$ ,  $v_{\pm} \neq 0$ . Mamy  $\lambda_+ - \lambda_- \in \mathbb{Z}$  i  $A_{\pm}v_{\pm} = 0$ . Mamy

$$\begin{aligned} Cv_+ &= (N^2 + N)v_+ = (\lambda_+^2 + \lambda_+)v_+, \\ Cv_- &= (N^2 - N)v_- = (\lambda_-^2 - \lambda_-)v_-. \end{aligned}$$

Ponieważ reprezentacja jest nieprzywiedlna,  $C$  jest liczbą. Równanie

$$\lambda_+^2 + \lambda_+ = \lambda_-^2 - \lambda_-$$

ma dwa rozwiązania:  $\lambda_+ = \lambda_- - 1$ , które odrzucamy, bo wtedy  $\lambda_+ < \lambda_-$ , i  $\lambda_- = -\lambda_+$ . Kładziemy  $l := \lambda_+$ . Oczywiście,  $2l = \lambda_+ - \lambda_- \in \mathbb{Z}$ . Rozważmy  $\text{Span}(A_-^j v_+, j = 0, \dots, 2l)$ . Korzystając z

relacji komutacyjnych sprawdzamy, że jest to niezmiennicza przestrzeń dla  $sl(2, \mathbb{C})$ . Zatem jest ona równa  $\mathcal{V}$ . Poza tym,  $A_-^{2l}v_+$  jest proporcjonalny do  $v_-$ . Kładziemy

$$v_m := \frac{(l+m)!}{(2l)!} A_-^{l-m} v_+.$$

Oczywiście,  $A_- v_m = (l+m)v_{m-1}$  i  $Nv_m = mv_m$ . Poza tym,

$$\begin{aligned} l(l+1)A_-^{l-m-1}v_+ &= (N^2 - N + A_+A_-)A_-^{l-m-1}v_+ \\ &= m(m+1)A_-^{l-m-1}v_+ + A_+A_-^{l-m}v_+. \end{aligned}$$

Stąd

$$A_+A_-^{l-m}v_+ = (l-m)(l+m+1)A_-^{l-m-1}v_+.$$

Zatem  $A_+v_m = (l-m)A_{m+1}$ . To dowodzi jedyności w punkcie (1).  $\square$

Alternatywną naturalną bazą dla reprezentacji  $sl(2, \mathbb{C})$  jest

$$u_m := \frac{(2l)!}{(l-m)!(l+m)!} v_m = \frac{A_-^{l-m}v_+}{(l-m)!}.$$

Dostajemy wtedy

$$\begin{aligned} Nu_m &= mu_m, \\ A_-u_m &= (l-m+1)u_{m-1}, \\ A_+u_m &= (l+m+1)u_{m+1}. \end{aligned}$$

## 7.6 Reprezentacje unitarne $su(2)$

**Twierdzenie 7.2** *Każda nieprzywiedlna reprezentacja infinytezymalnie unitarna  $su(2)$  jest skończenie wymiarowa. Jest ona obcięciem reprezentacji opisanych w poprzednim twierdzeniu. Bazę unitarną dostajemy kładąc*

$$|l, m\rangle = \frac{\sqrt{(2l)!}}{\sqrt{(l-m)!(l+m)!}} v_m = \frac{\sqrt{(l-m)!(l+m)!}}{\sqrt{(2l)!}} u_m.$$

Mamy wtedy

$$\begin{aligned} N|l, m\rangle &= m|l, m\rangle, \\ A_-|l, m\rangle &= \sqrt{(l+m)(l-m+1)}|l, m-1\rangle, \\ A_+|l, m\rangle &= \sqrt{(l+m+1)(l-m)}|l, m+1\rangle. \end{aligned} \tag{7.51}$$

**Dowód.** Rozważmy infinytezymalnie unitarną reprezentację nieprzywiedlną  $su(2)$ . (Nie zakładamy skończonego wymiaru przestrzeni). Operatory  $i\sigma_i$  muszą być antysamosprężone, czyli  $N$  musi być samsprężony, a  $A_+ = A_-^*$ . Operator Casimira jest dodatni. Ponieważ  $A_+A_- \geq 0$ , więc  $N^2 - N$  jest ograniczone. To pokazuje, że  $\text{spec} N$  musi być ograniczone. Zatem  $\text{Ker} A_+ \neq \{0\}$ . Z nieprzywiedlności, operator Casimira jest liczbą. Dlatego na  $\text{Ker} A_+$  mamy  $C = N^2 - N$ .  $N$

zachowuje  $\text{Ker}A_+$ . Spektrum  $N$  na  $\text{Ker}A_+$  jest najwyżej dwuelementowe. Zatem można zdiagnozować  $N$ . Zatem dostajemy te same przypadki, które były rozważane w Tw. 4.

Baza opisana w tym twierdzeniu jest ortogonalna, ale nie ortonormalna. Mamy relację

$$\begin{aligned} (A_-^{l-m}v_+ | A_-^{l-m}v_+) &= (A_-^{l-m-1}v_+ | A_+A_-A_-^{l-m-1}v_+) \\ &= (l-m)(l+m+1)(A_-^{l-m-1}v_+ | A_-^{l-m-1}v_+). \end{aligned}$$

Stąd dostajemy

$$\begin{aligned} (A_-^{l-m}v_+ | A_-^{l-m}v_+) &= (l-m) \cdots 1(l+m+1) \cdots 2l(v_+ | v_+) \\ &= \frac{(l-m)!(2l)!}{(l+m)!}(v_+ | v_+). \end{aligned} \quad (7.52)$$

Stąd, żeby dostać bazę ortonormalną, kładziemy

$$|l, m\rangle := \frac{\sqrt{(l+m)!}}{\sqrt{(l-m)!(2l)!}} A_-^{l-m}v_+. \quad (7.53)$$

□

## 7.7 Reprezentacje $SL(2, \mathbb{C})$ i $SU(2)$

**Twierdzenie 7.3** *Dla każdego  $n = 2l + 1 = 1, 2, \dots$  istnieje jedyna, z dokładnością do równoważności, ciągła reprezentacja nieprzywiedlna  $SL(2, \mathbb{C})$  w  $\mathbb{C}^n$ . Odpowiada ona reprezentacji  $sl(2, \mathbb{C})$  omawianej powyżej. Dla  $l \in \mathbb{Z}$  zadaje ona reprezentację  $SO(3, \mathbb{C})$ .*

**Dowód.** Istnienie: Oznaczmy bazę w  $\mathbb{C}^2$  przez  $|\uparrow\rangle$  i  $|\downarrow\rangle$ .  $SL(2, \mathbb{C})$  działa w naturalny sposób w  $\mathbb{C}^2$ . Działa więc również w  $\otimes_s^{2l}\mathbb{C}^2$ .

Wprowadźmy bazę w  $\otimes_s^{2l}\mathbb{C}^2$

$$v_m = \sum |j_1\rangle \otimes \cdots \otimes |j_{2l}\rangle,$$

gdzie sumujemy po wektorach składających się z  $l-m$  czynników  $|\downarrow\rangle$  i  $l+m$  czynników  $|\uparrow\rangle$ . Łatwo sprawdzamy, że dostajemy reprezentację  $SL(2, \mathbb{C})$  i że jest ona nieprzywiedlna.

Jednoznaczność: Jeśli mamy ciągłą nieprzywiedlną reprezentację  $SL(2, \mathbb{C})$  w  $\mathbb{C}^n$ , to generuje ona nieprzywiedlną reprezentację  $sl(2, \mathbb{C})$  w  $\mathbb{C}^n$ . Takie reprezentacje już zbadaliśmy. □

**Twierdzenie 7.4** *Dla każdego  $n = 2l+1 = 1, 2, \dots$  istnieje jedyna, z dokładnością do równoważności, ciągła unitarna reprezentacja nieprzywiedlna  $SU(2)$  w  $\mathbb{C}^n$ . Odpowiada ona reprezentacji  $su(2)$  omawianej powyżej. Dla  $l \in \mathbb{Z}$  zadaje ona reprezentację  $SO(3)$ .*

**Dowód.** Powtarzamy te same argumenty. Możemy jeszcze zauważyć, że jeśli  $SU(2)$  działa na  $\mathbb{C}^2$  unitarnie, to na  $\otimes_s^{2l}\mathbb{C}^2$  też. □

Mamy  $e^{i2\pi N} = (-1)^{2l}$ . Dlatego dla  $l \in \mathbb{Z}$  reprezentacje  $SU(2)$  odpowiadają reprezentacjom  $SO(3)$ .

## 7.8 $SL(2, \mathbb{C})$ jako sfera zespolona

Niech

$$(a_0, \vec{a}) \in \mathbb{C}^4, \quad A = a_0 \mathbb{1} + i\vec{a}\vec{\sigma}. \quad (7.54)$$

Wtedy

$$\det A = a_0^2 + (\vec{a})^2.$$

Zatem  $SL(2, \mathbb{C})$  jest 3-wymiarową sferą zespoloną w  $\mathbb{C}^4$ :

$$SL(2, \mathbb{C}) = \{a_0 \mathbb{1} + i\vec{a}\vec{\sigma} : a_0^2 + \vec{a}^2 = 1\}. \quad (7.55)$$

Odwzorowanie eksponencjalne przekształca  $sl(2, \mathbb{C})$  na  $SL(2, \mathbb{C})$ . W rzeczy samej, używając (7.48) dostajemy

$$e^{\frac{i}{2}\vec{\theta}\vec{\sigma}} = \cos \frac{\theta}{2} \mathbb{1} + \frac{i\vec{\theta}\vec{\sigma}}{\theta} \sin \frac{\theta}{2}, \quad \vec{\theta} \in \mathbb{C}^3,$$

gdzie  $\theta = \sqrt{\vec{\theta}^2}$ . W szczególności, jeśli  $\frac{\theta}{2} = \pi$ , to dostajemy  $-\mathbb{1}$ .

## 7.9 $SU(2)$ jako sfera rzeczywista

Mamy  $A^* = \bar{a}_0 - i\vec{a}\vec{\sigma}$ . Liczymy:

$$AA^* = |a_0|^2 + |\vec{a}|^2 + i(\bar{a}_0\vec{a} - a_0\bar{\vec{a}}) \cdot \vec{\sigma}. \quad (7.56)$$

Zatem  $AA^* = \mathbb{1}$  jest równoważne

$$|a_0|^2 + |\vec{a}|^2 = 1, \quad \bar{a}_0\vec{a} - a_0\bar{\vec{a}} = 0. \quad (7.57)$$

Drugi warunek implikuje

$$a_0 = \alpha\bar{a}, \quad \vec{a} = \alpha\bar{\vec{a}} \quad (7.58)$$

dla pewnego  $\alpha \in \mathbb{C}$ . Jeśli  $A \in SU(2)$ , to

$$1 = \det A = a_0^2 + \vec{a}^2 = \alpha(|a_0|^2 + |\vec{a}|^2) = \alpha. \quad (7.59)$$

Zatem  $(a_0, \vec{a}) \in \mathbb{R}^4$ . Czyli  $SU(2)$  jest 3-wymiarową sferą rzeczywistą:

$$SU(2) = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ -\bar{b} & \bar{a} \end{bmatrix} : |a|^2 + |b|^2 = 1 \right\} \quad (7.60)$$

$$= \{a_0 \mathbb{1} + i\vec{a}\vec{\sigma} : a_0^2 + \vec{a}^2 = 1\}. \quad (7.61)$$

A oto alternatywne wyprowadzenie tego, że  $SU(2)$  jest 3-wymiarową sferą rzeczywistą. Niech  $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$  będzie macierzą w  $SU(2)$ . Wtedy

$$\begin{aligned} |a|^2 + |b|^2 &= 1, & |c|^2 + |d|^2 &= 1, \\ a\bar{c} + b\bar{d} &= 0, & c\bar{a} + d\bar{b} &= 0, \\ ad - bc &= 1. \end{aligned}$$



Wyliczamy  $c$  z (7.62) i wstawiamy do (7.62) dostając

$$d(|a|^2 + |b|^2) = \bar{a}.$$

Stąd wynika, że

$$c = -\bar{b}, \quad d = \bar{a}, \quad |a|^2 + |b|^2 = 1.$$

Czyli  $SU(2)$  jest sferą 3-wymiarową.

Odwzorowanie eksponencjalne przekształca również  $su(2)$  na  $SU(2)$ .  $SU(2) \setminus \{\mathbb{1}, -\mathbb{1}\}$  jest sparametryzowana przez  $\vec{\theta} \in \mathbb{R}^3$ ,  $|\vec{\theta}| \in ]0, 2\pi[$ .

## 7.10 Kąty Eulera

Wyjmijmy z  $SU(2) \setminus \{\mathbb{1}, -\mathbb{1}\}$ , odpowiadające  $a = \pm 1$ ,  $b = 0$ . Wtedy można napisać

$$a = e^{i\phi} \cos \frac{\beta}{2}, \quad b = e^{i\psi} \sin \frac{\beta}{2}, \quad \beta \in ]0, 2\pi[, \quad \phi \in [0, \pi[, \quad \psi \in [0, 2\pi[.$$

(Zauważmy, że dla  $\beta \in ]0, 2\pi[$ ,  $\cos \frac{\beta}{2}$  przyjmuje oba znaki, ale  $\sin \frac{\beta}{2}$  jest zawsze dodatni). Połóżmy  $\alpha = \phi + \psi$ ,  $\gamma = \phi - \psi$ . Dostajemy wtedy parametryzację przy pomocy kątów Eulera

$$a = \cos \frac{\beta}{2} e^{\frac{i}{2}(\alpha+\gamma)}, \quad b = \sin \frac{\beta}{2} e^{\frac{i}{2}(\alpha-\gamma)}, \quad \beta \in ]0, 2\pi[, \quad \alpha, \gamma \in [0, 2\pi[.$$

Czasami stosuje się inny zasięg kątów:  $\beta \in ]0, \pi[$ ,  $\alpha \in [0, 4\pi[$ ,  $\gamma \in [0, 2\pi[$ . Gdy stosujemy kąty Eulera do parametryzacji  $SO(3)$  używamy zasięgu  $\beta \in ]0, \pi[$ ,  $\alpha, \gamma \in [0, 2\pi[$ .

Element  $SU(2)$  odpowiadający  $\alpha, \beta, \gamma$  oznaczamy przez

$$\begin{aligned} D(\alpha, \beta, \gamma) &:= \begin{bmatrix} \cos \frac{\beta}{2} e^{\frac{i}{2}(\alpha+\gamma)} & \sin \frac{\beta}{2} e^{\frac{i}{2}(\alpha-\gamma)} \\ -\sin \frac{\beta}{2} e^{\frac{i}{2}(-\alpha+\gamma)} & \cos \frac{\beta}{2} e^{\frac{i}{2}(-\alpha-\gamma)} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} e^{\frac{i}{2}\alpha} & 0 \\ 0 & e^{-\frac{i}{2}\alpha} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \frac{\beta}{2} & \sin \frac{\beta}{2} \\ -\sin \frac{\beta}{2} & \cos \frac{\beta}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{\frac{i}{2}\gamma} & 0 \\ 0 & e^{-\frac{i}{2}\gamma} \end{bmatrix} \\ &= D(\alpha, 0, 0)D(0, \beta, 0)D(0, 0, \gamma). \end{aligned}$$

**Stwierdzenie 7.5** *Oto wzór, które pozwala wyrazić  $\theta$  w kątach Eulera:*

$$\cos \frac{\theta}{2} = \cos \frac{\beta}{2} \cos \frac{\alpha + \gamma}{2}.$$

**Dowód.** Mamy

$$\begin{aligned} \cos \frac{\theta}{2} \mathbb{1} + \frac{i\vec{\theta}\vec{\sigma}}{\theta} \sin \frac{\theta}{2} &= e^{\frac{i}{2}\vec{\theta}\vec{\sigma}} = e^{\frac{i}{2}\alpha\sigma_3} e^{\frac{i}{2}\beta\sigma_1} e^{\frac{i}{2}\gamma\sigma_3} \\ &= \left( \cos \frac{\alpha}{2} \mathbb{1} + i \sin \frac{\alpha}{2} \sigma_3 \right) \left( \cos \frac{\beta}{2} \mathbb{1} + i \sin \frac{\beta}{2} \sigma_1 \right) \left( \cos \frac{\gamma}{2} \mathbb{1} + i \sin \frac{\gamma}{2} \sigma_3 \right). \end{aligned}$$

Przykładamy ślad do obu stron:

$$2 \cos \frac{\theta}{2} = 2 \cos \frac{\theta}{2} \left( \cos \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\gamma}{2} - \sin \frac{\alpha}{2} \sin \frac{\gamma}{2} \right).$$

□

## 7.11 $D$ -macierze Wignera

Niech  $D^j(\alpha, \beta, \gamma)$  oznacza operator  $D(\alpha, \beta, \gamma)$  w reprezentacji o spinie  $j$ :

$$D^j(\alpha, \beta, \gamma) = D^j(\alpha, 0, 0)D^j(0, \beta, 0)D^j(0, 0, \gamma).$$

Macierz  $D^j(\alpha, \beta, \gamma)$  w bazie  $|jm\rangle$  nazywamy  $D^j$ -macierzą Wignera.

Macierz  $D^j(\alpha, 0, 0) = D^j(0, 0, \alpha)$  jest macierzą diagonalną, która na  $m$ -tym miejscu ma  $e^{i\alpha m}$ . Bardziej skomplikowana jest tzw.  $d^j$ -macierz Wignera

$$d^j(\beta) = D^j(0, \beta, 0).$$

Wyrazimy ją najpierw w ortogonalnej ale nieortonormalnej bazie  $v_m^j = z_+^{j+m} z_-^{j-m}$ :

$$\begin{aligned} d^j(\beta) z_+^{j+m} z_-^{j-m} &= \left( z_+ \cos \frac{\beta}{2} - z_- \sin \frac{\beta}{2} \right)^{j+m} \left( z_+ \sin \frac{\beta}{2} + z_- \cos \frac{\beta}{2} \right)^{j-m} \\ &= \sum_{p=0}^{j+m} \frac{(j+m)!}{(j+m-p)!p!} z_+^{j+m-p} \left( \cos \frac{\beta}{2} \right)^{j+m-p} z_-^p \left( -\sin \frac{\beta}{2} \right)^p \\ &\quad \times \sum_{q=0}^{j-m} \frac{(j-m)!}{(j-m-q)!q!} z_+^q \left( \sin \frac{\beta}{2} \right)^q z_-^{j-m-q} \left( \cos \frac{\beta}{2} \right)^{j-m-q} \\ &= \sum_{m'} \tilde{d}_{m'm}^j(\beta) z_+^{j+m'} z_-^{j-m'}, \end{aligned}$$

gdzie

$$\begin{aligned} \tilde{d}_{m'm}^j(\beta) &:= \sum_p \frac{(j+m)!(j-m)!}{p!(m'-m+p)!(j+m-p)!(j-m'-p)!} \\ &\quad \times (-1)^{m'-m-p} \left( \cos \frac{\beta}{2} \right)^{2j+m-m'+p} \left( \sin \frac{\beta}{2} \right)^{2j-m+m'-p}, \end{aligned}$$

i sumujemy po tych wskaźnikach, dla których argumenty silni w mianowniku są nieujemne. Zamieniając bazę  $v_m^j$  na ortonormalną bazę  $|j, m\rangle$

$$d_{m'm}^j(\beta) = \tilde{d}_{m'm}^j(\beta) \frac{\sqrt{(j+m)!} \sqrt{(j-m)!}}{\sqrt{(j+m)!} \sqrt{(j-m)!}}$$

dostajemy ostatecznie

$$\begin{aligned} d_{m'm}^j(\beta) &:= \sum_p \frac{\sqrt{(j+m)!} \sqrt{(j-m)!} \sqrt{(j+m)!} \sqrt{(j-m)!}}{p!(m'-m+p)!(j+m-p)!(j-m'-p)!} \\ &\quad \times (-1)^{m'-m-p} \left( \cos \frac{\beta}{2} \right)^{2j+m-m'+p} \left( \sin \frac{\beta}{2} \right)^{2j-m+m'-p}. \end{aligned}$$

Możemy wyrazić  $d$ -macierze Wignera przez wielomiany Jacobiego:

$$\begin{aligned}
& d_{m'm}^j(\beta) \\
&= (-1)^{m'-m} \frac{\sqrt{(j+m)!}\sqrt{(j-m)!}}{\sqrt{(j+m')!}\sqrt{(j-m')!}} \left(\sin \frac{\beta}{2}\right)^{-m+m'} \left(\cos \frac{\beta}{2}\right)^{-m-m'} P_{j+m}^{-m+m', -m-m'}(\cos \beta) \\
&= \frac{\sqrt{(j+m)!}\sqrt{(j-m)!}}{\sqrt{(j+m')!}\sqrt{(j-m')!}} \left(\sin \frac{\beta}{2}\right)^{m-m'} \left(\cos \frac{\beta}{2}\right)^{m+m'} P_{j-m}^{m-m', m+m'}(\cos \beta) \\
&= \frac{\sqrt{(j+m')!}\sqrt{(j-m')!}}{\sqrt{(j+m)!}\sqrt{(j-m)!}} \left(\sin \frac{\beta}{2}\right)^{m-m'} \left(\cos \frac{\beta}{2}\right)^{-m-m'} P_{j+m'}^{m-m', -m-m'}(\cos \beta) \\
&= (-1)^{m'-m} \frac{\sqrt{(j+m')!}\sqrt{(j-m')!}}{\sqrt{(j+m)!}\sqrt{(j-m)!}} \left(\sin \frac{\beta}{2}\right)^{-m+m'} \left(\cos \frac{\beta}{2}\right)^{m+m'} P_{j-m'}^{-m+m', m+m'}(\cos \beta).
\end{aligned}$$

Zauważmy, że we wszystkich przypadkach wielomiany Jacobiego są postaci  $P_n^{\alpha, \beta}$ , gdzie

$$2n + \alpha + \beta + 1 = 2j + 1.$$

Jeśli podstawimy  $m, 0$  zamiast  $m', m$ , dostajemy zwykle harmoniki sferyczne:

$$d_{m0}^j(\beta) = (-1)^m \frac{\sqrt{(j+m)!}\sqrt{(j-m)!}}{j!} \left(\frac{\sin \beta}{2}\right)^m P_{j-m}^{m,m}(\cos \beta), \quad (7.62)$$

$$= \frac{\sqrt{(j+m)!}\sqrt{(j-m)!}}{j!} \left(\frac{\sin \beta}{2}\right)^{-m} P_{j+m}^{-m,-m}(\cos \beta), \quad (7.63)$$

$$Y_{jm}(\cos \beta, \alpha) = e^{im\alpha} d_{m0}^j(\beta). \quad (7.64)$$

## 7.12 Typ reprezentacji grupy $SL(2, \mathbb{C})$

Niech

$$\epsilon := \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Mamy  $\epsilon^2 = -\mathbb{1}$ ,

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} d & -c \\ -b & a \end{bmatrix}.$$

Zatem jeśli  $X \in SL(2, \mathbb{C})$ , to

$$\epsilon X \epsilon^{-1} = X^{\#(-1)},$$

zaś jeśli  $A \in sl(2, \mathbb{C})$ , to

$$\epsilon A \epsilon^{-1} = -A^{\#},$$

Czyli reprezentacja fundamentalna  $SL(2, \mathbb{C})$  jest równoważna swojej reprezentacji kontrgradientnej. Zatem reprezentacja fundamentalna  $SU(2)$  jest równoważna swojej zespolenie sprzężonej. Operator realizujący tę równoważność ma kwadrat  $-\mathbb{1}$ . Czyli reprezentacja fundamentalna  $SU(2)$  jest typu kwaternionowego.

Latwo sprawdzić, że reprezentacje o spinie całkowitym są typu rzeczywistego, a o spinie półowkowym, typu kwaternionowego.

### 7.13 Miara Haara na $SU(2)$

$SU(2)$  jest 3-wymiarową sferą. Miara Haara jest standardową unormowaną miarą niezmienniczą na tej sferze. Jeśli używamy parametryzacji  $\vec{\theta} = \theta\Omega \in \mathbb{R}^3$ ,  $\theta \in ]0, 2\pi[$ ,  $\Omega \in \mathbb{S}^2$  to jest ona równa

$$\frac{1}{\pi} \sin^2 \frac{\theta}{2} d\theta \frac{d\Omega}{4\pi},$$

gdzie  $\frac{d\Omega}{4\pi}$  jest unormowaną miarą na sferze 2-wymiarowej

Jeśli używamy kątów Eulera  $\alpha, \gamma \in [0, 2\pi[$ ,  $\beta \in ]0, 2\pi[$ , to jest ona równa

$$\frac{d\alpha d\gamma |\sin \beta| d\beta}{2\pi 2\pi 4}.$$

Aby to zobaczyć, wystarczy policzyć wektory styczne

$$\begin{aligned} \partial_\alpha &= \frac{i}{2} \begin{bmatrix} e^{\frac{i}{2}(\alpha+\gamma)} \cos \frac{\beta}{2} & e^{\frac{i}{2}(\alpha-\gamma)} \sin \frac{\beta}{2} \\ e^{\frac{i}{2}(-\alpha+\gamma)} \sin \frac{\beta}{2} & -e^{\frac{i}{2}(-\alpha-\gamma)} \cos \frac{\beta}{2} \end{bmatrix}, \\ \partial_\gamma &= \frac{i}{2} \begin{bmatrix} e^{\frac{i}{2}(\alpha+\gamma)} \cos \frac{\beta}{2} & -e^{\frac{i}{2}(\alpha-\gamma)} \sin \frac{\beta}{2} \\ -e^{\frac{i}{2}(-\alpha+\gamma)} \sin \frac{\beta}{2} & -e^{\frac{i}{2}(-\alpha-\gamma)} \cos \frac{\beta}{2} \end{bmatrix}, \\ \partial_\beta &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -e^{\frac{i}{2}(\alpha+\gamma)} \sin \frac{\beta}{2} & e^{\frac{i}{2}(\alpha-\gamma)} \cos \frac{\beta}{2} \\ -e^{\frac{i}{2}(-\alpha+\gamma)} \cos \frac{\beta}{2} & -e^{\frac{i}{2}(-\alpha-\gamma)} \sin \frac{\beta}{2} \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

Następnie liczymy wyznacznik macierzy Gramma

$$\det \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & \cos \beta & 0 \\ \cos \beta & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{8} \sin^2 \beta.$$

dostając miarę  $\frac{d\alpha d\gamma |\sin \beta| d\beta}{2\sqrt{2}}$ , którą następnie normujemy.

### 7.14 Charaktery reprezentacji $SU(2)$

Jeśli używamy parametryzacji  $SU(2)$  poprzez odwzorowanie eksponencjalne

$$e^{\frac{i}{2}\vec{\theta}\vec{\sigma}} = \cos \frac{\theta}{2} \mathbb{1} + \frac{i\vec{\theta}\vec{\sigma}}{\theta} \sin \frac{\theta}{2}, \quad 0 \leq \theta = |\vec{\theta}| \leq 2\pi,$$

to klasy sprzężoności elementów  $SU(2)$  są parametryzowane przez  $\theta$ . Jeśli bowiem  $\vec{\theta}_1$  ma tę samą długość co  $\vec{\theta}$ , to znajdziemy  $\vec{\mu}$  ortogonalny do  $\vec{\theta}$  taki, że

$$\vec{\theta}_1 = \cos \mu \vec{\theta} + \theta \frac{\sin \mu}{\mu} \vec{\mu}.$$

Mamy wtedy

$$e^{\frac{i}{2}\vec{\mu}\vec{\sigma}} e^{\frac{i}{2}\vec{\theta}\vec{\sigma}} e^{-\frac{i}{2}\vec{\mu}\vec{\sigma}} = e^{\frac{i}{2}(\cos \mu \vec{\theta} + \theta \frac{\sin \mu}{\mu} \vec{\mu}) \cdot \vec{\sigma}}. \quad (7.65)$$

$N = \frac{\sigma_3}{2}$  ma w  $l$ -tej reprezentacji wartości własne  $-l, -l+1, \dots, l$ . Dlatego  $\frac{|\vec{\theta}|}{2}\sigma_3$  ma w  $l$ -tej reprezentacji wartości własne  $-\theta, (-l+1)\theta, \dots, l\theta$ .  $e^{\frac{i}{2}\vec{\theta}\vec{\sigma}}$  jest sprzężone do  $e^{\frac{i}{2}\theta\sigma_3}$ . Zatem charakter  $e^{\frac{i}{2}\vec{\theta}\vec{\sigma}}$  dla reprezentacji o spinie  $l$  jest równy

$$\chi_l(\theta) = e^{-il\theta} + e^{i(-l+1)\theta} + \dots + e^{il\theta} = \frac{\sin\left((2l+1)\frac{\theta}{2}\right)}{\sin\frac{\theta}{2}}.$$

Rozważmy iloczyn tensorowy reprezentacji o spinie  $j_1$  i  $j_2$ . Jej charakter jest równy

$$\begin{aligned} \chi_{j_1}(\theta)\chi_{j_2}(\theta) &= \sum_{m_1=-j_1}^{j_1} \sum_{m_2=-j_2}^{j_2} e^{i(m_1+m_2)\theta} \\ &= \sum_{J=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2} \sum_{M=-J}^J e^{iM\theta} = \sum_{J=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2} \chi_J(\theta). \end{aligned}$$

Dlatego też mamy rozkład reprezentacji,

$$j_1 \otimes j_2 = \bigoplus_{J=|j_1-j_2|}^{j_1+j_2} J.$$

## 7.15 Współczynniki Clebscha-Gordana

Jak pamiętamy, w przestrzeni dla reprezentacji  $j$  mamy bazę ortonormalną

$$|j, m\rangle, \quad -j \leq m \leq j.$$

W przestrzeni reprezentacji  $j_1 \otimes j_2$  mamy bazę o.n.

$$|j_1 m_1\rangle \otimes |j_2 m_2\rangle =: |j_1, m_1, j_2, m_2\rangle, \quad -j_1 \leq m_1 \leq j_1, \quad -j_2 \leq m_2 \leq j_2.$$

Przestrzeń ta rozkłada się na podprzestrzenie o spinie  $|j_1 - j_2| \leq J \leq j_1 + j_2$ . W każdej z nich mamy bazę o.n.

$$|j_1 j_2 JM\rangle, \quad -J \leq M \leq J,$$

ze standardowym działaniem  $su(2)$ . Mamy rozkład

$$|j_1 j_2 JM\rangle = \sum_{m_1+m_2=M} |j_1 m_1 j_2 m_2\rangle (j_1 m_1 j_2 m_2 | JM).$$

Wzór ten definiuje współczynniki  $(j_1 m_1 j_2 m_2 | JM)$  jednoznacznie z wyjątkiem czynnika fazowego, niezależnego dla każdej trójki  $j_1, j_2, J$ . Aby go ustalić żądamy aby

$$(j_1 j_1 j_2 J - j_1 | JJ) > 0.$$

(Zauważmy, że  $|J - j_1| \leq j_2$ ).

$$(j_1 m_1 j_2 m_2 | JM) = (JM | j_1 m_1 j_2 m_2)$$

nazywają się *współczynnikami Clebscha-Gordana*. Jak pamiętamy,  $Q_J(j_1 \otimes j_2)$  oznacza rzut izotypowy w reprezentacji  $j_1 \otimes j_2$  na podreprezentację  $J$  (która ma tu krotność 1). Mamy

$$\begin{aligned} Q_J(j_1 \otimes j_2) &= \sum_M |j_1 j_2 J M\rangle \langle j_1 j_2 J M| \\ &= \sum_{M=m_1+m_2=m'_1+m'_2} |j_1 m_1 j_2 m_2\rangle \langle j_1 m_1 j_2 m_2 | J M\rangle \\ &\quad \times \langle J M | j_1 m'_1 j_2 m'_2\rangle \langle j_1 m'_1 j_2 m'_2|. \end{aligned}$$

Oto wzór rekurencyjny:

$$\begin{aligned} &\sqrt{(J \mp M)(J \pm M + 1)} \langle j_1 m_1 j_2 m_2 | J M \pm 1\rangle \\ &= \sqrt{(j_1 \mp m_1 + 1)(j_1 \pm m_1)} \langle j_1 m_1 \mp 1 j_2 m_2 | J M\rangle \\ &\quad + \sqrt{(j_2 \mp m_2 + 1)(j_2 \pm m_2)} \langle j_1 m_1 j_2 m_2 \mp 1 | J M\rangle. \end{aligned}$$

## 7.16 3j-symbole

Przestrzeń reprezentacji  $j_1 \otimes j_2 \otimes j_3$  ma bazę

$$|j_1 m_1\rangle \otimes |j_2 m_2\rangle \otimes |j_3 m_3\rangle =: |j_1 m_1 j_2 m_2 j_3 m_3\rangle.$$

Podprzestrzeń niezmiennicza w tej przestrzeni jest najwyżej jednowymiarowa. Jeśli

$$|j_1 j_2 j_3 0\rangle = \sum_{m_1+m_2+m_3=0} \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix} |j_1 m_1 j_2 m_2 j_3 m_3\rangle$$

jest takim unormowanym wektorem, to współczynniki  $\begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix}$  są zdefiniowane jednoznacznie z dokładnością do czynnika fazowego. Aby go ustalić żądamy

$$\begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ j_1 & -j_2 & -j_1 + j_2 \end{pmatrix} > 0.$$

Tak zdefiniowane współczynniki nazywają się *3j-symbolami Wignera*.

$$\begin{aligned} Q_0(j_1 \otimes j_2 \otimes j_3) &= |j_1 j_2 j_3 0\rangle \langle j_1 j_2 j_3 0| \\ &= \sum_{m_1+m_2+m_3=0} \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix} |j_1 m_1 j_2 m_2 j_3 m_3\rangle \\ &\quad \times \sum_{m'_1+m'_2+m'_3=0} \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m'_1 & m'_2 & m'_3 \end{pmatrix} \langle j_1 m'_1 j_2 m'_2 j_3 m'_3|. \end{aligned}$$

(6.28) implikuje

$$(2j_3 + 1) \text{Tr}_{j_3} Q_0(j_1 \otimes j_2 \otimes j_3) = Q_{j_3}(j_1 \otimes j_2). \quad (7.66)$$

Zatem, dla  $m'_1 + m'_2 + m_3 = m_1 + m_2 + m_3 = 0$ ,

$$(2j_3 + 1) \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix} |j_1 m_1 j_2 m_2\rangle (j_1 m'_1 j_2 m_2 | \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m'_1 & m'_2 & m_3 \end{pmatrix} \quad (7.67)$$

$$= |j_1 m_1 j_2 m_2\rangle (j_1 m_1 j_2 m_2 | j_3 - m_3\rangle (j_3 - m_3 | j_1 m'_1 j_2 m'_2\rangle (j_1 m'_1 j_2 m'_2 |. \quad (7.68)$$

Ta tożsamość prawie wystarcza aby wyprowadzić następujący związek pomiędzy współczynnikami Clebscha-Gordana a  $3j$ -symbolami:

$$(j_1 m_1 j_2 m_2 | j_3 - m_3) = (-1)^{j_1 - j_2 - m_3} \sqrt{2j_3 + 1} \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix}.$$

Jedynie znak  $(-1)^{j_1 - j_2}$  jest tu wynikiem odpowiedniej konwencji i bliższej analizy.

Wyprowadźmy teraz wzór rekurencyjny.

$$\begin{aligned} 0 &= (J^\pm \otimes \mathbb{1} \otimes \mathbb{1} + \mathbb{1} \otimes J^\pm \otimes \mathbb{1} + \mathbb{1} \otimes \mathbb{1} \otimes J^\pm) \\ &\quad \times \sum_{m_1 + m_2 + m_3 = 0} \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix} |j_1 m_1 j_2 m_2 j_3 m_3\rangle \\ &= \sum_{m_1 + m_2 + m_3 = 0} \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix} \sqrt{(j_1 \mp m_1)(j_1 \pm m_1 + 1)} |j_1 m_1 \pm 1 j_2 m_2 j_3 m_3\rangle + \dots \\ &= \sum_{m_1 + m_2 + m_3 = \pm 1} \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1 \mp 1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix} \sqrt{(j_1 \mp m_1 + 1)(j_1 \pm m_1)} |j_1 m_1 j_2 m_2 j_3 m_3\rangle + \dots \end{aligned}$$

Stąd dla każdej trójki  $m_1, m_2, m_3$  spełniającej  $m_1 + m_2 + m_3 = \pm 1$  mamy związek rekurencyjny

$$\begin{aligned} 0 &= \sqrt{(j_1 \mp m_1 + 1)(j_1 \pm m_1)} \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1 \mp 1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix} \\ &\quad + \sqrt{(j_2 \mp m_2 + 1)(j_2 \pm m_2)} \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1 & m_2 \mp 1 & m_3 \end{pmatrix} \\ &\quad + \sqrt{(j_3 \mp m_3 + 1)(j_3 \pm m_3)} \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \mp 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Ustalmy trójkę  $j_1, j_2, j_3$ . Nośnik  $3j$ -symbolu leży w przestrzeni  $m_1 + m_2 + m_3 = 0$  i jest zawarty w części wspólnej trzech pasów

$$-j_1 \leq m_1 \leq j_1, \quad -j_2 \leq m_2 \leq j_2, \quad -j_3 \leq m_3 \leq j_3$$

przecinających się pod kątem  $\frac{2\pi}{3}$ . Warunek

$$j_1 \leq j_2 + j_3, \quad j_2 \leq j_3 + j_1, \quad j_3 \leq j_1 + j_2$$

oznacza, że to przecięcie ma sześć wierzchołków (być może pokrywających się) typu

$$\begin{aligned} & (j_1, -j_2, -j_1 + j_2), \\ & (j_2 - j_3, -j_2, j_3), \\ & (-j_1, j_1 - j_3, j_3), \\ & (-j_1, j_2, j_1 - j_2), \\ & (-j_2 + j_3, j_2, -j_3), \\ & (j_1, -j_1 + j_3, -j_3). \end{aligned}$$

Rozwiązywanie rekurencji można zacząć od brzegu, gdzie jest ona 2-elementowa i kontynuować ją do wewnątrz.

Zastosowanie wzoru (6.26) daje

$$Q_0(j_1 \otimes j_2 \otimes j_3) = \int D_{j_1}(g) \otimes D_{j_2}(g) \otimes D_{j_3}(g) dg. \quad (7.69)$$

Jeśli obłożymy (7.69) przez  $(j_1 m_1 j_2 m_2 j_3 m_3 | i | j_1 k_1 j_2 k_2 j_3 k_3)$ , i wyrazimy  $g$  przez kąty Eulera, dostaniemy

$$\begin{aligned} & \frac{1}{16\pi^2} \int_0^{2\pi} d\alpha \int_0^{2\pi} d\gamma \int_0^{2\pi} |\sin \beta| d\beta D_{m_1 k_1}^{j_1}(\alpha, \beta, \gamma) D_{m_2 k_2}^{j_2}(\alpha, \beta, \gamma) D_{m_3 k_3}^{j_3}(\alpha, \beta, \gamma) \\ & = \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Możemy ograniczyć całkowanie względem  $\beta$  do  $[0, \pi]$ , zastępując  $\frac{1}{16\pi^2}$  przez  $\frac{1}{8\pi^2}$ . Oto wniosek:

$$\begin{aligned} & \int d\Omega Y_{j_1, m_1}(\Omega) Y_{j_2, m_2}(\Omega) Y_{j_3, m_3}(\Omega) \\ & = \sqrt{\frac{(2j_1 + 1)(2j_2 + 1)(2j_3 + 3)}{4\pi}} \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Oto inne własności

### Twierdzenie 7.6

$$\begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix} = \text{sgn}(\sigma)^{j_1 + j_2 + j_3} \begin{pmatrix} j_{\sigma(1)} & j_{\sigma(2)} & j_{\sigma(3)} \\ m_{\sigma(1)} & m_{\sigma(2)} & m_{\sigma(3)} \end{pmatrix}, \quad (7.70)$$

$$\begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ m_1 & m_2 & m_3 \end{pmatrix} = (-1)^{j_1 + j_2 + j_3} \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j_3 \\ -m_1 & -m_2 & -m_3 \end{pmatrix}. \quad (7.71)$$

$$(2j + 1) \sum_{m_1, m_2} \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j \\ m_1 & m_2 & m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j' \\ m_1 & m_2 & m' \end{pmatrix} = \delta_{jj'} \delta_{mm'}, \quad (7.72)$$

$$\sum_{j, m} (2j + 1) \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j \\ m_1 & m_2 & m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} j_1 & j_2 & j \\ m'_1 & m'_2 & m \end{pmatrix} = \delta_{m_1 m'_1} \delta_{m_2 m'_2}. \quad (7.73)$$



**Dowód.** Stosujemy (6.24) do  $|j_1 j_2 j' 0\rangle, |j_1 j_2 j' 0\rangle$ :

$$(2j+1)\text{Tr}_{j_1 \otimes j_2} |j_1 j_2 j' 0\rangle \langle j_1 j_2 j' 0| = \delta_{jj'} \mathbb{1}_j(j_1 j_2 j' 0 | j_1 j_2 j' 0), \quad (7.74)$$

aby dostać (7.72).

Stosujemy (6.23)

$$\sum_j (2j+1)\text{Tr}_j Q_0(j_1 \otimes j_2 \otimes j) = \mathbb{1}_{j_1 \otimes j_2} \quad (7.75)$$

aby dostać (7.73).  $\square$

### 7.17 Iloczyn tensorowy z reprezentacją o spinie $\frac{1}{2}$

Szczególnie łatwy jest przypadek gdy jeden ze spinów jest równy  $\frac{1}{2}$ . Można wtedy ograniczyć się do dwuelementowych relacji rekurencyjnych:

$$\begin{aligned} \sqrt{2j+1} \begin{pmatrix} j+\frac{1}{2} & j & \frac{1}{2} \\ j-\frac{1}{2} & -j & \frac{1}{2} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} j+\frac{1}{2} & j & \frac{1}{2} \\ j+\frac{1}{2} & -j & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} &= 0, & j+\frac{1}{2}, -j, \frac{1}{2}; \\ \sqrt{j+m+1} \begin{pmatrix} j+\frac{1}{2} & j & \frac{1}{2} \\ -m+\frac{1}{2} & m-1 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} + \sqrt{j+m} \begin{pmatrix} j+\frac{1}{2} & j & \frac{1}{2} \\ -m-\frac{1}{2} & m & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} &= 0, & -m-\frac{1}{2}, m-1, \frac{1}{2}; \\ \begin{pmatrix} j+\frac{1}{2} & j & \frac{1}{2} \\ -j-\frac{1}{2} & j & \frac{1}{2} \end{pmatrix} + \sqrt{2j+1} \begin{pmatrix} j+\frac{1}{2} & j & \frac{1}{2} \\ -j+\frac{1}{2} & j & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} &= 0, & -j-\frac{1}{2}, j, -\frac{1}{2}; \\ \sqrt{j-m+1} \begin{pmatrix} j+\frac{1}{2} & j & \frac{1}{2} \\ -m-\frac{1}{2} & m+1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} + \sqrt{j-m} \begin{pmatrix} j+\frac{1}{2} & j & \frac{1}{2} \\ -m+\frac{1}{2} & m & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} &= 0, & -m-\frac{1}{2}, m+1, -\frac{1}{2}; \end{aligned}$$

Dostajemy stąd

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} j+\frac{1}{2} & j & \frac{1}{2} \\ -m+\frac{1}{2} & m & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} &= \frac{(-1)^{j+m} \sqrt{j-m+1}}{\sqrt{(2j+1)(2j+2)}} \\ \begin{pmatrix} j+\frac{1}{2} & j & \frac{1}{2} \\ -m-\frac{1}{2} & m & \frac{1}{2} \end{pmatrix} &= \frac{(-1)^{-j-m+1} \sqrt{j+m+1}}{\sqrt{(2j+1)(2j+2)}}. \end{aligned}$$

Zauważmy, że

$$\begin{aligned} &\sum_{m=-j}^j \left( \begin{pmatrix} j+\frac{1}{2} & j & \frac{1}{2} \\ -m+\frac{1}{2} & m & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \right)^2 + \sum_{m=-j}^j \left( \begin{pmatrix} j+\frac{1}{2} & j & \frac{1}{2} \\ -m-\frac{1}{2} & m & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \right)^2 \\ &= \sum_{m=-j}^j \frac{(j-m+1) + (j+m+1)}{(2j+1)(2j+2)} = 1. \end{aligned}$$

A oto odpowiadające im współczynniki Clebscha-Gordana:

$$\begin{aligned} \left(jm \frac{1}{2} \frac{1}{2} \middle| j+\frac{1}{2} \ m+\frac{1}{2}\right) &= \frac{\sqrt{j+m+1}}{\sqrt{2j+1}}, \\ \left(jm \frac{1}{2} \ -\frac{1}{2} \middle| j+\frac{1}{2} \ m-\frac{1}{2}\right) &= \frac{\sqrt{j-m+1}}{\sqrt{2j+1}}, \\ \left(jm \frac{1}{2} \frac{1}{2} \middle| j-\frac{1}{2} \ m+\frac{1}{2}\right) &= -\frac{\sqrt{j-m}}{\sqrt{2j+1}}, \\ \left(jm \frac{1}{2} \ -\frac{1}{2} \middle| j-\frac{1}{2} \ m-\frac{1}{2}\right) &= \frac{\sqrt{j+m}}{\sqrt{2j+1}}. \end{aligned}$$

## 8 Kwaterniony

### 8.1 Definicje

Algebra nad  $\mathbb{R}$  oznaczana przez  $\mathbb{H}$  z bazą  $1, i, j, k$  spełniająca relacje

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1, \quad ij = k, \quad jk = i, \quad ki = j,$$

nazywa się algebrą *kwaternionów*. Jest wyposażona w  $*$  działającą jako

$$1^* = 1, \quad i^* = -i, \quad j^* = -j, \quad k^* = -k.$$

$*$  jest *inwolucją*:  $x^{**} = x$ ,  $(xy)^* = y^*x^*$ ,  $x, y \in \mathbb{H}$ .

Dla  $x \in \mathbb{H}$  kładziemy

$$\operatorname{Re}x := \frac{1}{2}(x + x^*), \quad |x| := \sqrt{x^*x}.$$

(Zauważmy, że  $x^*x$  jest zawsze dodatnie rzeczywiste)

Jeśli  $x = x_1 + x_i i + x_j j + x_k k$ , gdzie  $x_1, x_i, x_j, x_k \in \mathbb{R}$ , to

$$\operatorname{Re}x = x_1, \quad |x| = \sqrt{x_1^2 + x_i^2 + x_j^2 + x_k^2}.$$

Zauważmy, że  $|\cdot|$  jest normą na  $\mathbb{H}$ . Jeśli  $x, y \in \mathbb{H}$ , to  $|xy| = |x||y|$ .

$\mathbb{H}$  posiada kwaternionowy iloczyn skalarny  $x^*y$  i rzeczywisty iloczyn skalarny

$$\langle x|y \rangle := \operatorname{Re}x^*y = x_1y_1 + x_iy_i + x_jy_j + x_ky_k, \quad x, y \in \mathbb{H}.$$

$\mathbb{H}$  ma tę własność, że wszystkie niezerowe elementy są odwracalne. Algebry z tą własnością są zwane *algebrami z dzieleniem*.

*Kwaterniony jednostkowe*, czyli  $\{x \in \mathbb{H} : |x| = 1\}$  tworzą grupę izomorficzną z  $SU(2)$ . Grupa automorfizmów kwaternionów jest izomorficzna z  $SO(3)$ . Każdy automorfizm jest postaci

$$\mathbb{H} \ni x \mapsto uxu^{-1} \in \mathbb{H}, \tag{8.76}$$

gdzie  $u$  jest jednostkowym kwaternionem.

## 8.2 Zanurzanie liczb zespolonych w kwaternionach

Oczywiście, istnieje dokładnie jeden ciągły injektywny homomorfizm  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{H}$ . Jego obrazem jest centrum algebry  $\mathbb{H}$ , które identyfikujemy z  $\mathbb{R}$ .

Ale istnieje wiele ciągłych injektywnych homomorfizmów  $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{H}$ . Aby go ustalić, trzeba wybrać  $i \in \mathbb{C}$  w  $\mathbb{H}$ . Też go nazywamy  $i$ .

Kwaterniony można zdefiniować, jako algebra nad  $\mathbb{C}$  rozpięta na  $1, j$ , spełniająca relacje

$$zj = j\bar{z}. \quad (8.77)$$

Ustala to homomorfizm  $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{H}$ .  $\mathbb{H}$  jest wtedy przestrzenią wektorową nad ciałem  $\mathbb{C}$  o wymiarze 2. Odwzorowanie

$$\mathbb{H} \ni x \mapsto \frac{1}{2}(x - izi) \in \mathbb{C} \quad (8.78)$$

jest rzutem.  $\mathbb{H}$  ma zespolony półtoraliniowy iloczyn skalarny

$$(x|y) := \frac{1}{2}(yx^* - iyx^*i) \quad (8.79)$$

(W rzeczy samej, na mocy (8.78), wartości tego iloczynu skalarnego są w  $\mathbb{C}$ . Rachunek

$$\begin{aligned} (x|zy) &= \frac{1}{2}(zyx^* - izyx^*i) = z(x|y), \\ (zx|y) &= \frac{1}{2}(yx^*\bar{z} - iyx^*\bar{z}i) = (x|y)\bar{z}, \quad z \in \mathbb{C}, \end{aligned}$$

pokazuje, że (8.78) jest półtoraliniowy.

$1, j$  jest przykładem bazy ortonormalnej w  $\mathbb{H}$  ze względu na (8.79).

## 8.3 Macierzowa reprezentacja kwaternionów

Kwaterniony mogą być reprezentowane przez macierze Pauliego pomnożone przez  $i$ :

$$\pi(1) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \pi(i) = \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}, \quad \pi(j) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \pi(k) = \begin{bmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{bmatrix}.$$

W ten sposób dostajemy reprezentację kwaternionów w przestrzeni Hilberta  $\mathbb{C}^2$

$$\pi : \mathbb{H} \rightarrow B(\mathbb{C}^2). \quad (8.80)$$

W tej reprezentacji,

$$\pi(x^*) = \pi(x)^*, \quad |x| = \sqrt{\det \pi(x)}. \quad (8.81)$$

Mamy

$$\pi(\mathbb{H}) = \{\lambda U : U \in SU(2), \lambda \in [0, \infty[ \}.$$

Inną użyteczną relacją, która zależy od powyższej reprezentacji jest

$$\pi(\mathbb{H}) = \{A \in B(\mathbb{C}^2) : A = \pi(j)\bar{A}\pi(j)^{-1}\}, \quad (8.82)$$

gdzie  $\bar{A}$  oznacza zwykłe zespolone sprzężenie macierzy  $A$ .

Zastępując (8.80) przez  $W\pi(\cdot)W^{-1}$  dla jakiegoś odwracalnego  $W$ , zastępujemy  $\pi(j)$  przez  $R := W\pi(j)\bar{W}^{-1}$ . Zauważmy, że mamy

$$R\bar{R} = -\mathbb{1}. \quad (8.83)$$

## 8.4 Wyznacznik kwaternionowy

Jeśli  $A \in L(\mathbb{H}^n)$ , to możemy zdefiniować *wyznacznik kwaternionowy* jako

$$\det A := \det \pi(A),$$

gdzie z prawej strony mamy zwykły wyznacznik (w sensie macierzy zespolonej). Zauważmy, że  $\det AB = \det A \det B$ .  $\det A$  nie zależy od zanurzenia  $\mathbb{C}$  w  $\mathbb{H}$  i ma zawsze wartość rzeczywistą  $\geq 0$ .

## 8.5 Rzeczywiste proste algebry

Przypomnijmy, że algebra, która nie posiada nietrywialnych ideałów i jest różna od  $\mathbb{K}$  z zerowym iloczynem nazywa się algebrą prostą.

Dobrze wiadomo, że można sklasyfikować wszystkie proste skończenie wymiarowe algebry nad  $\mathbb{C}$  i  $\mathbb{R}$ . Przypadek zespolony jest szczególnie łatwy:

**Twierdzenie 8.1** *Niech  $\mathfrak{A}$  będzie zespoloną skończenie wymiarową algebrą prostą. Wtedy istnieje  $n \in \mathbb{N}$  taki, że  $\mathfrak{A}$  jest izomorficzny do  $L(\mathbb{C}^n)$ .*

Odpowiadająca temu klasyfikacja rzeczywista jest bardziej skomplikowana:

**Twierdzenie 8.2** *Niech  $\mathfrak{A}$  będzie rzeczywistą skończenie wymiarową algebrą prostą. Wtedy istnieje  $n \in \mathbb{N}$  taki, że  $\mathfrak{A}$  jest izomorficzna z  $L(\mathbb{C}^n)$ ,  $L(\mathbb{R}^n)$  lub  $L(\mathbb{H}^n)$ .*

W szczególności, można zanurzyć  $L(\mathbb{R}^n)$  w  $L(\mathbb{C}^n)$ :

$$L(\mathbb{R}^n) = \{A \in L(\mathbb{C}^n) : A = \overline{A}\}.$$

$L(\mathbb{H}^n)$  można zanurzyć w  $L^2(\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^n)$ . wtedy

$$L(\mathbb{H}^n) = \{A \in L(\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^n) : RA = \overline{AR}\},$$

gdzie  $R = \pi(j) \otimes \mathbb{1}$ .

## 8.6 Kwaternionowe przestrzenie wektorowe

Mówimy, że  $(\mathcal{V}, +, 0, -)$  jest *kwaternionową przestrzenią wektorową*, gdy jest to grupa abelowa wyposażona w działania

$$\mathbb{H} \times \mathcal{V} \ni (x, v) \mapsto xv \in \mathcal{V}, \quad \mathcal{V} \times \mathbb{H} \ni (v, x) \mapsto vx \in \mathcal{V},$$

takie, że

$$(x + y)v = xv + yv, \quad (xy)v = x(yv), \quad x, y \in \mathbb{H}, \quad v \in \mathcal{V}.$$

$$v(x + y) = vx + vy, \quad v(xy) = (vx)y, \quad x, y \in \mathbb{H}, \quad v \in \mathcal{V}.$$

Przykładem kwaternionowych przestrzeni są  $\mathbb{H}^n$ . Kwaternionowe przestrzenie wektorowe izomorficzne z  $\mathbb{H}^n$  nazywamy *przestrzeniami wymiaru  $n$*

Transformacje  $\mathbb{H}$ -liniowe z prawej/z lewej na kwaternionowej przestrzeni wektorowej mają oczywistą definicję. Zbiór transformacji  $\mathbb{H}$ -liniowych z prawej z  $\mathcal{V}$  do  $\mathcal{W}$  oznaczamy przez  $L(\mathcal{V}, \mathcal{W})$ . Jak zwykle  $L(\mathcal{V}) := L(\mathcal{V}, \mathcal{V})$ .

Transformacje z  $L(\mathbb{H}^n, \mathbb{H}^m)$  można w oczywisty sposób reprezentować macierzami  $m \times n$  o elementach kwaternionowych.

Niech  $\mathcal{V}$  będzie kwaternionową przestrzenią wektorową.  $\mathbb{R}$ -liniowe odwzorowanie

$$\mathcal{V} \ni v \mapsto f(v) \in \mathbb{H}$$

jest antyliniowe z prawej/z lewej gdy

$$f(v\lambda) = f(v)\lambda^* / f(\lambda w) = \lambda^* f(w), \quad v \in \mathcal{V}, \quad \lambda \in \mathbb{H}.$$

Mówimy, że

$$\mathcal{V} \times \mathcal{V} \ni (v, w) \mapsto (v|w) \in \mathbb{H}$$

jest kwaternionową formą hermitowską jeśli jest ono anty-liniowe z prawej ze względu na pierwszy argument i liniowe ze względu na drugi argument i

$$(v|w) = (w|v)^* \tag{8.84}$$

Jeśli zamiast (8.84) mamy

$$(v|w) = -(w|v)^* \tag{8.85}$$

Mówimy, że jest ona *antyhermitowska*.

Formę hermitowską spełniającą  $(v|v) \geq 0$  nazywamy  *dodatnio określoną*. Jeśli jest w dodatku niezdegenerowana, nazywamy ją *kwaternionowym iloczynem skalarnym*. Każda skończenie wymiarowa przestrzeń kwaternionowa z kwaternionowym iloczynem skalarnym jest izomorficzna z  $\mathbb{H}^n$  i

$$(v|w) := \sum v_i^* w_i, \quad v, w \in \mathbb{H}^n.$$

Jeśli ustalimy zanurzenie (8.78), wtedy kwaternionowe przestrzenie wektorowe można zreinterpretować jako zespolone przestrzenie wektorowe, zaś kwaternionowe przestrzenie Hilberta jako zespolone przestrzenie Hilberta

Jeśli  $\mathcal{V}$  jest kwaternionową przestrzenią wektorową, to  $\mathcal{V}_{\mathbb{C}}$  będzie oznaczało  $\mathcal{V}$  rozumianą jako zespoloną przestrzeń. Będzie ona zwana *zespoloną formą przestrzeni  $\mathcal{V}$* .

## 9 Koincydencje wśród grup macierzowych

### 9.1 $SL(2, \mathbb{K}) = Sp(1, \mathbb{K})$

Niech

$$J := \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Zauważmy, że dla  $A \in L(\mathbb{K}^2)$  mamy

$$\begin{aligned} A^{\#} J A &= (\det A) J, \\ A^{\#} J + J A &= (\text{Tr} A) J. \end{aligned}$$

Stąd  $SL(2, \mathbb{K}) = Sp(1, \mathbb{K})$  i  $sl(2, \mathbb{K}) = sp(1, \mathbb{K})$ . Dla późniejszych referencji zanotujmy następujące tożsamości dla macierzy  $2 \times 2$ :

$$\frac{1}{2} \text{Tr} JA^\# JA = -\det A, \quad \text{Tr} A = 0 \quad \Rightarrow \quad JA^\# J = A. \quad (9.86)$$

## 9.2 $SU(2)/\mathbb{Z}_2 \simeq SO(3)$

Utożsamiamy  $\mathbb{R}^3$  z macierzami hermitowskimi  $2 \times 2$  o śladzie 0:

$$\mathbb{R}^3 \ni (x, y, z) \mapsto X = \begin{bmatrix} z & x + iy \\ x - iy & -z \end{bmatrix}.$$

Zauważmy, że

$$\frac{1}{2} \text{Tr} X_1 X_2 = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2$$

zadaje standardowy iloczyn skalarny. Alternatywnie, możemy iloczyn skalarny zdefiniować poprzez wyznacznik:

$$-\det X = x^2 + y^2 + z^2.$$

Dla  $A \in SU(2)$  kładziemy

$$\rho_A X := AXA^*.$$

Wtedy

$$\det \rho_A X = \det X.$$

Zatem  $\rho_A$  zachowuje iloczyn skalarny.

$$SU(2) \ni A \mapsto \rho_A \in SO(3).$$

jest surjektywnym homomorfizmem. Jego jądrem jest  $\pm \mathbb{1}$ .

Dla  $Y \in su(2)$  kładziemy

$$\rho_Y X := YX + XY^* = [Y, X].$$

(Pamiętajmy, że  $Y = -Y^*$ ).

## 9.3 $SL(2, \mathbb{R})/\mathbb{Z}_2 \simeq SO_0(1, 2)$ , $SL(2, \mathbb{C})/\mathbb{Z}_2 \simeq SO(3, \mathbb{C})$ ,

Utożsamiamy  $\mathbb{K}^3$  z macierzami  $2 \times 2$  o śladzie 0:

$$\mathbb{K}^3 \ni (x, y, z) \mapsto X = \begin{bmatrix} z & x + y \\ -x + y & -z \end{bmatrix}.$$

Zauważmy, że

$$\frac{1}{2} \text{Tr} X_1 X_2 = -x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2$$

Czyli dla  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  dostajemy iloczyn pseudoskalarny o sygnaturze  $(1, 2)$ . Dla  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$  jest to zwykły iloczyn skalarny. Alternatywnie można użyć wyznacznika:

$$-\det X = -x^2 + y^2 + z^2.$$

Dla  $A \in SL(2, \mathbb{K})$  kładziemy

$$\rho_A X := AXA^{-1}.$$

Wtedy

$$\det \rho_A X = \det X.$$

Zatem  $\rho_A$  zachowuje iloczyn (pseudo-)skalarny.

$$SL(2, \mathbb{R}) \ni A \mapsto \rho_A \in SO_0(1, 2),$$

$$SL(2, \mathbb{C}) \ni A \mapsto \rho_A \in SO(3, \mathbb{C}),$$

są surjektywnymi homomorfizmami. Ich jądrem jest  $\pm \mathbb{1}$ .

Dla  $Y \in sl(2, \mathbb{K})$

$$\rho_Y X := [Y, X].$$

#### 9.4 $SL(2, \mathbb{C})/\mathbb{Z}_2 \simeq SO_0(1, 3)$

Utożsamiamy  $\mathbb{R}^4$  z macierzami  $2 \times 2$  hermitowskimi

$$\mathbb{R}^4 \ni (t, x, y, z) \mapsto X = \begin{bmatrix} t+z & x+iy \\ x-iy & t-z \end{bmatrix}.$$

Zauważmy, że

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \text{Tr} JX_1 JX_2 &= -t_1 t_2 + x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2, \\ -\det X &= -t^2 + x^2 + y^2 + z^2. \end{aligned}$$

Czyli dostajemy iloczyn pseudo-skalarny o sygnaturze  $(1, 3)$ .

Dla  $A \in SL(2, \mathbb{C})$  kładziemy

$$\rho_A X := AXA^*.$$

Wtedy

$$\det \rho_A X = \det X.$$

Zatem  $\rho_A$  zachowuje iloczyn pseudo-skalarny.

$$SL(2, \mathbb{C}) \ni A \mapsto \rho_A \in SO_0(1, 3).$$

jest surjektywnym homomorfizmem. Jego jądrem jest  $\pm \mathbb{1}$ .

#### 9.5 $(SL(2, \mathbb{R}) \times SL(2, \mathbb{R})) / \mathbb{Z}_2 \simeq SO_0(2, 2)$ , $(SL(2, \mathbb{C}) \times SL(2, \mathbb{C})) / \mathbb{Z}_2 \simeq SO(4, \mathbb{C})$ ,

Utożsamiamy  $\mathbb{K}^4$  z macierzami  $2 \times 2$ :

$$\mathbb{K}^4 \ni (t, x, y, z) \mapsto X = \begin{bmatrix} t+z & x+y \\ x-y & t-z \end{bmatrix}.$$

Zauważmy, że

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\mathrm{Tr}JX_1JX_2 &= -t_1t_2 + x_1x_2 - y_1y_2 + z_1z_2, \\ -\det X &= -t^2 + x^2 - y^2 + z^2.\end{aligned}$$

Czyli dostajemy iloczyn pseudo-skalarny o sygnaturze  $(2, 2)$ .

Dla  $(A, B) \in SL(2, \mathbb{K}) \times SL(2, \mathbb{K})$  kładziemy

$$\rho_{(A,B)}X := AXB^{-1}.$$

Wtedy

$$\det \rho_{(A,B)}X = \det X.$$

Zatem  $\rho_{(A,B)}$  zachowuje iloczyn (pseudo-)skalarny.

$$\begin{aligned}SL(2, \mathbb{R}) \times SL(2, \mathbb{R}) \ni (A, B) &\mapsto \rho_{(A,B)} \in SO_0(2, 2), \\ SL(2, \mathbb{C}) \times SL(2, \mathbb{R}) \ni (A, B) &\mapsto \rho_A \in SO(4, \mathbb{C}),\end{aligned}$$

są surjektywnymi homomorfizmami. Ich jądrem jest  $\pm(\mathbb{1}, \mathbb{1})$ .

## 9.6 $(SU(2) \times SU(2)) / \mathbb{Z}_2 \simeq SO(4)$

Niech  $J := \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ . Utożsamiamy  $\mathbb{R}^4$  z macierzami zespolonymi  $2 \times 2$  spełniającymi  $J\bar{X} = XJ$  (czyli kwaternionami) w następujący sposób:

$$\mathbb{R}^4 \ni (t, x, y, z) \mapsto X = \begin{bmatrix} t + iz & ix + y \\ ix - y & t - iz \end{bmatrix}.$$

Zauważmy, że

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}\mathrm{Tr}X_1^*X_2 &= t_1t_2 + x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2, \\ \det X &= t^2 + x^2 + y^2 + z^2.\end{aligned}$$

Czyli zadaje standardowy iloczyn skalarny.

Dla  $(A, B) \in SU(2) \times SU(2)$  kładziemy

$$\rho_{(A,B)}X := AXB^*.$$

Wtedy

$$\det \rho_{(A,B)}X = \det X.$$

Zatem  $\rho_{(A,B)}$  zachowuje iloczyn skalarny.

$$SU(2) \times SU(2) \ni (A, B) \mapsto \rho_{(A,B)} \in SO(4).$$

jest surjektywnym homomorfizmem. Jego jądrem jest  $\pm(\mathbb{1}, \mathbb{1})$ .



## 10 Struktura klasycznych prostych algebr Liego

### 10.1 Reprezentacje przemiennych algebr Liego

Niech  $A$  będzie operatorem na skończonej wymiarowej przestrzeni  $\mathcal{V}$ . Definiujemy wtedy jego spektrum jako

$$\text{spec}(A) := \{\lambda \in \mathbb{C} : \exists v \in \mathcal{V}, v \neq 0, Av = \lambda v\}.$$

Mamy wtedy rozkład przestrzeni na podprzestrzenie pierwiastkowe:

$$\mathcal{V}_{\lambda,k}(A) := \text{Ker}(A - \lambda)^k, \quad \mathcal{V}_\lambda(A) := \bigcup_{k=0}^{\infty} \mathcal{V}_{\lambda,k}(A), \quad \mathcal{V} = \bigoplus_{\lambda \in \text{spec}(A)} \mathcal{V}_\lambda(A).$$

Niech teraz  $A_1, \dots, A_n$  komutują ze sobą. Wtedy łatwo widać, że  $\mathcal{V}_{\lambda,k}(A_1)$  jest podprzestrzenią niezmienniczą dla  $A_2, \dots, A_n$ . Połóżmy

$$\text{spec}(A_1, \dots, A_n) := \{(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{C}^n : \exists v \in \mathcal{V}, v \neq 0, A_i v = \lambda_i v, i = 1, \dots, n\}, \quad (10.87)$$

$$\mathcal{V}_{(\lambda_1, \dots, \lambda_n)}(A_1, \dots, A_n) := \bigcap_{i=1}^n \mathcal{V}_{\lambda_i}(A_i).$$

Wtedy

$$\mathcal{V} = \bigoplus_{(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \text{spec}(A_1, \dots, A_n)} \mathcal{V}_{(\lambda_1, \dots, \lambda_n)}(A_1, \dots, A_n).$$

Jeśli  $A = c_1 A_1 + \dots + c_n A_n$ , to

$$\text{spec} A = \{c_1 \lambda_1 + \dots + c_n \lambda_n : (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \text{spec}(A_1, \dots, A_n)\}.$$

Zatem definicję (10.87) można przeformułować. Niech  $\mathfrak{h} := \mathbb{C}^n$ .  $\mathfrak{h}$  jest oczywiście przemienną algebrą Liego z bazą kanoniczną  $e_j, j = 1, \dots, n$ . Kładąc  $\pi_j(e_j) := A_j$  dostajemy reprezentację  $\pi$ . Wtedy

$$\text{spec}(\pi(\mathfrak{h})) := \{\alpha \in \mathfrak{h}^\# : \exists v \in \mathcal{V}, v \neq 0, Av = \alpha(A)v\}.$$

nazywamy zbiorem wag reprezentacji  $\pi$  a

$$\mathcal{V}_\alpha := \{v \in \mathcal{V} : Av = \alpha(A)v\}$$

przestrzenią wagową.

### 10.2 Proste algebry Liego

Mówimy, że algebra Liego  $\mathfrak{g}$  jest prosta jeśli nie posiada różnych od siebie samej ideałów przemiennych. (Zatem zgodnie z tą definicją  $\mathbb{K}$  nie jest prosta).

**Twierdzenie 10.1** *Każda prosta algebra Liego posiada niezdegenerowany niezmienniczy iloczyn skalarny zdefiniowany z dokładnością do stałej. Można go wybrać dodatnio określonym wtedy i tylko wtedy gdy odpowiadająca jej grupa Liego jest zwarta. Mówimy, że algebra Liego jest zwarta. Każda zespolona algebra Liego posiad zwartą formę rzeczywistą.*

Niech  $\mathfrak{g}$  będzie zespoloną prostą algebrą Liego. Każda maksymalna przemienna podalgebra nazywa się algebrą Cartana.

**Twierdzenie 10.2** *Niech  $\mathfrak{h}_1, \mathfrak{h}_2$  będą dwiema algebrami Cartana w  $\mathfrak{g}$ . Wtedy istnieje automorfizm  $\alpha$  algebry  $\mathfrak{g}$  taki, że  $\alpha(\mathfrak{h}_1) = \mathfrak{h}_2$ .*

### 10.3 Pierwiastki i wagi

W dalszym ciągu wyróżniamy pewną algebrę Cartana w prostej algebrze Liego  $\mathfrak{g}$ . Załóżmy, że  $\rho : \mathfrak{g} \rightarrow gl(\mathcal{V})$  jest reprezentacją na skończonej wymiarowej przestrzeni  $\mathcal{V}$ . Można ją obciąć do  $\mathfrak{h}$ . Wtedy  $\text{spec}(\rho(\mathfrak{h})) \subset \mathfrak{h}^\#$  nazywamy zbiorem wag reprezentacji  $\rho$ .

Jedną z reprezentacji jest reprezentacja dołączona na samej  $\mathfrak{g}$ .

$$\pi_{\text{ad}}(B)A := [B, A].$$

W szczególności, w reprezentacji dołączonej mamy zerową wagę. Jej przestrzeń wektorów własnych to dokładnie cała algebra Cartana  $\mathfrak{h}$ . Niezerowe wagi dla reprezentacji dołączonej nazywamy pierwiastkami algebry  $\mathfrak{g}$ . Oznaczmy przez  $\mathcal{R} \subset \mathfrak{h}^\#$  zbiór pierwiastków. Czyli dla każdego  $\alpha \in \mathcal{R}$  istnieje  $A \in \mathfrak{g}$  taki, że

$$[A, H] = \alpha(H)A, \quad H \in \mathfrak{h}.$$

Ten operator nazywamy operatorem pierwiastkowym. Kratę składającą się z całkowitoliczbowych kombinacji liniowych  $\mathcal{R}$  nazywamy kratą pierwiastkową.

Jeśli ustalimy iloczyn skalarny na  $\mathfrak{g}$ , możemy traktować  $\mathfrak{h}$  jako przestrzeń euklidesową. Możemy utożsamić  $\mathfrak{h}^\#$  z  $\mathfrak{h}$ . Element  $\mathfrak{h}$  który dostajemy przez to utożsamienie z  $\alpha \in \mathcal{R}$  nazywamy kopierwiastkiem i oznaczamy  $H_\alpha$ .

**Stwierdzenie 10.3** *Niech  $\rho$  będzie reprezentacją. Niech  $\beta$  będzie wagą pewnej tej reprezentacji. Niech  $A \in \mathfrak{g}_\alpha$ . Wtedy*

$$\rho(A)\mathcal{V}_\beta \subset \mathcal{V}_{\beta+\alpha}$$

**Dowód.**

$$\begin{aligned} \rho(H)\rho(A)v &= \rho([H, A])v + \rho(A)\rho(H)v \\ &= \alpha(H)\rho(A)v + \beta(H)\rho(A)v. \end{aligned}$$

□

W szczególności, jeśli  $\rho$  jest reprezentacją nieprzywiedlną, to wagi reprezentacji należą do  $\beta$ -kratą pierwiastkową.

### 10.4 $sl(n, \mathbb{C})$

$$\begin{aligned} sl(n, \mathbb{C}) &= \{A \in gl(n, \mathbb{C}) : \text{Tr}A = 0\}, \\ su(n) &= \{A \in gl(n, \mathbb{C}) : \text{Tr}A = 0, \quad A^* = -A\}. \end{aligned}$$

$sl(n, \mathbb{C})$  jest kompleksyfikacją  $su(n)$ . To znaczy,

$$sl(n, \mathbb{C}) = su(n) + isu(n).$$

$A \in sl(n, \mathbb{C})$  rozkłada się na  $A = \frac{1}{2}(A - A^*) + \frac{i}{2i}(A + A^*)$ .

Wprowadzamy iloczyn skalarny

$$\langle X|Y \rangle := \text{Tr}XY.$$

Oznaczmy

$$A_{ij} := |i\rangle\langle j|.$$

Niech

$$\mathfrak{h} := \left\{ \sum_{i=1}^n c_i A_{ii} : \sum_{i=1}^n c_i = 0 \right\}.$$

$\mathfrak{h}$  jest maksymalną przemienną podalgebrą w  $sl(n, \mathbb{C})$  – jest to przykład *algebry Cartana*. Położmy

$$H_{ij} := A_{ii} - A_{jj} = -H_{ji}.$$

Mamy

$$\begin{aligned} [H_{kl}, A_{ij}] &= \alpha_{ij}(H_{kl})A_{ij}, \\ \alpha_{ij}(H_{kl}) &= \delta_{ik} + \delta_{jl} - \delta_{jk} - \delta_{il} = \langle H_{ij}|H_{kl} \rangle. \end{aligned}$$

Czyli  $A_{ij}$  są *operatorami pierwiastkowymi*, czyli wektorami własnymi dla działania algebry Cartana, a  $\alpha_{ij} \in \mathfrak{h}^\#$  są wartościami własnymi, zwanymi *pierwiastkami*. Korzystając z dwoistości zadanej przez iloczyn skalarny, można pierwiastki utożsamić z *kopierwiastkami*  $H_{ij}$ , elementami algebry Cartana.

W szczególności,

$$\langle H_{ij}|H_{ij} \rangle = 2, \quad \langle H_{ij}|H_{kj} \rangle = 1, \quad \langle H_{ij}|H_{jk} \rangle = -1, \quad i \neq k. \quad (10.88)$$

Jako bazę kraty pierwiastkowej można przyjąć  $H_{12}, H_{23}, \dots, H_{n-1,n}$ . Mają one wszystkie długość  $\sqrt{2}$  i są prostopadłe do siebie z wyjątkiem

$$\angle(H_{12}, H_{23}) = \dots = \angle(H_{n-2,n-1}, H_{n-1,n}) = \frac{2\pi}{3}.$$

Kratę wagową definiujemy jako podzbiór funkcjonałów w  $\mathfrak{h}^\#$  przyjmujących całkowite wartości na  $H_{ij}$ .

Dla każdego  $i < j$  mamy podalgebrę izomorficzną z  $sl(2, \mathbb{C})$  rozpiętą na  $H_{ij}, A_{ij}, A_{ji}$ :

$$[A_{ji}, A_{ji}] = H_{ij}, \quad [H_{ij}, A_{ij}] = 2A_{ij}, \quad [H_{ij}, A_{ji}] = -2A_{ji}.$$

Zatem wartości własne  $H_{ij}$  muszą być liczbami całkowitymi. Stąd wynika, że wagi każdej reprezentacji muszą należeć do kraty wagowej. Z (10.88) widać, że krata pierwiastkowa jest zawarta w kracie wagowej.

Niech

$$L_n := \frac{1}{n}(H_{12} + 2H_{23} + \cdots + (n-1)H_{n-1n}),$$

$$L_j := H_{jj+1} + \cdots + H_{n-1n} + L_n.$$

Zauważmy, że

$$\langle L_k | H_{ij} \rangle = \text{Tr} |j\rangle \langle j| H_{ij} = \delta_{ki} - \delta_{kj}.$$

Krata wagowa jest rozpięta przez  $L_1, \dots, L_{n-1}$ .

### 10.5 $so(n, \mathbb{C})$

Jeśli przyjmiemy, że iloczyn skalarny ma postać

$$\langle x | y \rangle = \sum x_i y_j,$$

to mamy

$$so(n, \mathbb{C}) = \{A \in gl(n, \mathbb{C}) : A^\# = -A\},$$

$$so(n, \mathbb{R}) = \{A \in gl(n, \mathbb{R}) : A^\# = -A\}.$$

$so(n, \mathbb{C})$  jest kompleksyfikacją  $so(n, \mathbb{R})$ :

$$so(n, \mathbb{C}) = so(n, \mathbb{R}) \oplus iso(n, \mathbb{R}).$$

$A = \text{Re}A + i\text{Im}A$ . Wprowadzamy iloczyn skalarny  $\frac{1}{2}\text{Tr}XY$ . Bazę ortonormalną stanowią

$$L_{ij} = |i\rangle \langle j| - |j\rangle \langle i|, \quad 1 \leq i < j \leq n.$$

Zatem, wymiar  $so(n, \mathbb{C})$  jest równy  $\frac{n(n-1)}{2}$ .

### 10.6 $so(2m)$

Załóżmy, że  $n = 2m$ . Wygodnie jest przyjąć inną postać iloczynu skalarnego w  $\mathbb{C}^{2m}$ . Niech współrzędne będą indeksowane przez  $\pm i$ ,  $i = 1, \dots, m$ .

$$\langle z | w \rangle = \sum_i z_i w_{-i} = \sum_{i=1}^m 2z_i w_{-i}.$$

Aby przejść do współrzędnych kartezjańskich kładziemy

$$z_{\pm j} = x_{2j-1} \pm ix_{2j}.$$

Wprowadzamy iloczyn skalarny  $\frac{1}{2}\text{Tr}XY$ .

Wprowadźmy operatory

$$B_{ij} := |i\rangle \langle -j| - |j\rangle \langle -i|.$$

Oczywiście,  $B_{ij} = -B_{ji}$ . W szczególności,  $B_{ii} = 0$ . Kładziemy

$$N_i := B_{i-i} = |i\rangle\langle i| - |-i\rangle\langle -i|. \quad (10.89)$$

Niech  $\mathfrak{h}$  będzie rozpięta przez  $N_i$ ,  $i = 1, \dots, m$ , które stanowią bazę ortonormalną. Jest to algebra Cartana.

Bazę  $so(2m, \mathbb{C})$  stanowią  $N_i$ ,  $i = 1, \dots, m$ , oraz

$$B_{ij}, \quad 1 \leq |i| < |j| \leq m.$$

Kładziemy dla  $|i| \neq |j|$ ,

$$N_{ij} = N_{ji} = -N_{-i-j} = -N_{-j-i} = \operatorname{sgn}(i)N_i + \operatorname{sgn}(j)N_j.$$

Mamy dla  $k = 1, \dots, m$ ,

$$\begin{aligned} [N_k, B_{ij}] &= \beta_{ij}(N_k)B_{ij}, \\ \beta_{ij}(N_k) &= \operatorname{sgn}(i)\delta_{|i|k} + \operatorname{sgn}(j)\delta_{|j|k} = \langle N_{ij}|N_k\rangle. \end{aligned}$$

$$\langle N_{ij}|N_{ij}\rangle = 2, \quad \langle N_{ij}|N_{i-j}\rangle = 0, \quad \langle N_{ij}|N_{ik}\rangle = 1, \quad |j| \neq |k|.$$

Czyli  $B_{ij}$  są operatorami pierwiastkowymi,  $\beta_{ij}$  są pierwiastkami, wreszcie  $N_{ij}$  są kopierwiastkami. Mają one długość  $\sqrt{2}$ .

Jako bazę kraty pierwiastkowej można wybrać  $N_{12}, \dots, N_{m-2, m-1}, N_{m-1, m}, N_{m-1, -m}$ . Są wzajemnie prostopadłe z wyjątkiem

$$\angle(N_{12}, N_{23}) = \dots = \angle(N_{m-2, m-1}, N_{m-1, m}) = \angle(N_{m-2, m-1}, N_{m-1, -m}) = \frac{2\pi}{3}.$$

Definiujemy kratę wagową jako zbiór funkcjonałów liniowych przyjmujących całkowite wartości na operatorach  $N_{ij}$ .

Mamy podalgebry izomorficzne z  $sl(2, \mathbb{C})$ :  $\operatorname{Span}(N_{ij}, B_{ij}, B_{-i-j})$ :

$$[B_{ji}, B_{-j-i}] = N_{ij}, \quad [N_{ij}, B_{ij}] = 2B_{ij}, \quad [N_{ij}, B_{-i-j}] = -2A_{-i-j}.$$

Dlatego też wagi skończeniowymiarowych reprezentacji są zawarte w kratce wagowej.

## 10.7 $so(2m+1)$

Do  $\mathbb{C}^{2m}$  dodajemy współrzędną indeksowaną przez 0. Iloczyn skalarny ma postać

$$\langle z|w\rangle = \sum_i z_i w_{-i} = z_0 w_0 + \sum_{i=1}^m 2z_i w_i.$$

Aby przejść do współrzędnych kartezjańskich kładziemy

$$z_{\pm j} = x_{2j-1} \pm ix_{2j}, \quad z_0 = x_{2m+1}.$$

Prócz operatorów  $B_{ij}$  wprowadźmy operatory

$$B_j := B_{0j} = |0\rangle\langle -j| - |j\rangle\langle 0|, \quad 1 \leq |j| \leq m.$$

Algebra Cartana  $\mathfrak{h}$  jest nadal rozpięta przez  $N_i$ ,  $i = 1, \dots, m$ .  
Bazę  $so(2m+1, \mathbb{C})$  stanowią  $N_i$ ,  $i = 1, \dots, m$ , oraz

$$B_{ij}, \quad 1 \leq |i| < |j| \leq m,$$

$$B_j, \quad 1 \leq |j| \leq m.$$

Mamy dodatkowe w porównaniu z  $so(2m)$  relacje dla  $k = 1, \dots, m$

$$\begin{aligned} [N_k, B_j] &= \beta_j(N_k)B_j, \\ \beta_j(N_k) &= \operatorname{sgn}(j)\delta_{|j|k} = \langle N_j | N_k \rangle. \end{aligned}$$

$$\langle N_i | N_i \rangle = 1, \quad \langle N_i | N_{ij} \rangle = 1,$$

Czyli  $B_{ij}$  i  $B_j$  są operatorami pierwiastkowymi,  $\beta_{ij}$  i  $\beta_j$  są pierwiastkami, wreszcie  $N_{ij}$  i  $N_j$  są kopierwiastkami.  $N_j$  mają długość 1.

Jako bazę kraty pierwiastkowej można wybrać  $N_{12}, \dots, N_{m-2, m-1}, N_{m-1, m}, N_m$ . Mają one długość  $\sqrt{2}$  z wyjątkiem ostatniego, który ma długość 1. Są wzajemnie prostopadłe z wyjątkiem

$$\angle(N_{12}, N_{23}) = \dots = \angle(N_{m-2, m-1}, N_{m-1, m}) = \frac{2\pi}{3}, \quad \angle(N_{m-1, m}, N_m) = \frac{3\pi}{4}.$$

Definiujemy kratę wagową jako zbiór funkcjonałów liniowych przyjmujących całkowite wartości na operatorach  $N_j$ . Mamy dodatkowe podalgebry izomorficzne z  $sl(2, \mathbb{C})$ :  $\operatorname{Span}(B_{0i}, B_{0, -i}, N_j)$ . Dlatego też wagi skończeniowymiarowych reprezentacji są zawarte w kratce wagowej.

## 10.8 $sp(2m, \mathbb{C})$

Współrzędne będą indeksowane przez  $\pm i$ ,  $i = 1, \dots, m$ :

$$\omega = \sum_i \operatorname{sgn}(i)|i\rangle\langle -i|.$$

Wprowadźmy operatory

$$C_{ij} := \operatorname{sgn}(i)|i\rangle\langle -j| + \operatorname{sgn}(j)|j\rangle\langle -i|.$$

$$C_i := C_{ii} = 2|i\rangle\langle -i|, \quad 1 \leq |i| \leq m.$$

Niech  $N_i$  będą zdefiniowane jak dla  $so(n)$ . Zauważmy, że

$$N_i = C_{i-i} = |i\rangle\langle i| - |-i\rangle\langle -i|, \quad i = 1, \dots, m. \quad (10.90)$$

Bazę  $sp(2m, \mathbb{C})$  stanowią  $N_i$ ,  $i = 1, \dots, m$ , oraz

$$C_{ij}, \quad 1 \leq |i| < |j| \leq m, \quad C_j, \quad 1 \leq j \leq m.$$

Wprowadzamy iloczyn skalarny  $\frac{1}{2}\text{Tr}XY$ . Niech  $\mathfrak{h}$  będzie rozpięta przez  $N_i$ ,  $i = 1, \dots, m$ , które stanowią bazę ortonormalną. Niech  $N_{ij}$ ,  $\beta_{ij}$ ,  $\beta_j$  będą zdefiniowane jak dla  $so(n)$ . Mamy dla  $k = 1, \dots, m$

$$\begin{aligned}[N_k, C_{ij}] &= \beta_{ij}(N_k)C_{ij}, \\ [N_k, C_j] &= 2\beta_j(N_k)C_j.\end{aligned}$$

Czyli  $C_{ij}$  i  $C_j$  są operatorami pierwiastkowymi,  $\beta_{ij}$  i  $2\beta_j$  są pierwiastkami, wreszcie  $N_{ij}$  i  $2N_j$  są kopierwiastkami. Mają one długość, odpowiednio,  $\sqrt{2}$  i 2.

Jako bazę kraty pierwiastkowej można wybrać  $N_{12}, \dots, N_{m-2, m-1}, N_{m-1, m}, 2N_m$ . Jest to prawie ta sama baza co dla  $so(2m+1)$ . W szczególności, ma te same kąty.

## 10.9 Koincydencje

$$\phi : so(3, \mathbb{C}) \rightarrow sl(2, \mathbb{C})$$

$$\phi(N_{12}) = H_{12}/2, \quad \phi(B_{12}) = A_{12}, \quad \phi(B_{-1-2}) = A_{21}.$$

$$\phi : so(4, \mathbb{C}) \rightarrow sl(2, \mathbb{C}) \oplus sl(2, \mathbb{C})$$

$$\begin{aligned}\phi(N_{12}) &= H_{12}/2, & \phi(B_{12}) &= A_{12}, & \phi(B_{-1-2}) &= A_{21}, \\ \phi(N_{1-2}) &= H_{-1-2}/2, & \phi(B_{-12}) &= A_{-1-2}, & \phi(B_{1-2}) &= A_{-2-1}.\end{aligned}$$

$$\phi : so(5, \mathbb{C}) \rightarrow sp(4, \mathbb{C})$$

$$\begin{aligned}\phi(N_{12}) &= N_{12}, & \phi(B_{12}) &= C_{12}, & \phi(B_{-1-2}) &= C_{21}, \\ \phi(N_{1-2}) &= N_{1-2}, & \phi(B_{-12}) &= C_{-12}, & \phi(B_{1-2}) &= C_{2-1}, \\ & & \phi(B_i) &= C_i.\end{aligned}$$

$$\phi : so(6, \mathbb{C}) \rightarrow sl(4, \mathbb{C})$$

Jeśli  $(ij)$  jest parą w zbiorze  $\{1, 2, 3, 4\}$ , wtedy  $\overline{(ij)}$  będzie oznaczało taką parę  $(kl)$ , że  $ijkl$  jest parzystą permutacją 1234.

Poniżej,  $ij$  są parami w zbiorze  $\{1, 2, 3\}$ .

$$\begin{aligned}\phi(N_{ij}) &= H_{ij}/2, & \phi(B_{ij}) &= A_{ij}, & \phi(B_{-i-j}) &= A_{ji}, \\ \phi(N_{i-j}) &= H_{\overline{ij}}/2, & \phi(B_{-ij}) &= A_{\overline{ij}}, & \phi(B_{i-j}) &= A_{\overline{ji}}.\end{aligned}$$

## 11 Grupa $SU(3)$ i jej zastosowanie w fizyce cząstek

### 11.1 Reprezentacje $su(3)$

Każda skończenie wymiarowa reprezentacja  $su(3)$  rozszerza się do reprezentacji  $sl(3, \mathbb{C})$  w tym samym wymiarze. I na odwrót, dla każdej skończenie wymiarowej reprezentacji  $sl(3, \mathbb{C})$  można dobrać iloczyn skalarny tak, by jej ograniczenie do  $su(3)$  było infinytezymalnie unitarne. Reprezentacja  $su(3)$  jest nieprzywiedlna wtedy i tylko wtedy gdy taka jest reprezentacja  $sl(3, \mathbb{C})$ .

Wśród reprezentacji nieprzywiedlnych  $sl(3, \mathbb{C})$  uprzywilejowane miejsce zajmuje reprezentacja *fundamentalna* na  $\mathbb{C}^3$  i jej reprezentacja kontrgradientna. Tę ostatnią będziemy nazywać reprezentacją *antyfundamentalną*. Będziemy pisać, że działa na  $\mathbb{C}^{3\#}$ . Dla  $su(3)$  reprezentacja kontrgradientna jest tożsama z reprezentacją zespolenie sprzężoną. Wtedy też można pisać  $\overline{\mathbb{C}^3}$  zamiast  $\mathbb{C}^{3\#}$ .

Wszystkie skończone wymiarowe reprezentacje nieprzywiedlne  $sl(3, \mathbb{C})$  można łatwo opisać. Tworzymy iloczyn tensorowy

$$\otimes_s^p \mathbb{C}^3 \otimes \otimes_s^q \mathbb{C}^{3\#}.$$

Elementami tej przestrzeni są tensory

$$\sum e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_p} \otimes e^{j_1} \otimes \cdots \otimes e^{j_q} t_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p},$$

które są w skrócie zapisywane jako  $[t_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p}]$ . Mamy zwężenie

$$[t_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p}] \mapsto [t_{j_1, \dots, j_{q-1}, k}^{i_1, \dots, i_{p-1}, k}],$$

gdzie stosujemy konwencję sumacyjną Einsteina. Operator zwężenia splata reprezentację na  $\otimes_s^p \mathbb{C}^3 \otimes \otimes_s^q \mathbb{C}^{3\#}$  z reprezentacją na  $\otimes_s^{p-1} \mathbb{C}^3 \otimes \otimes_s^{q-1} \mathbb{C}^{3\#}$ . Jądro tego operatora jest niezmienniczą przestrzenią. Są to wszystkie reprezentacje nieprzywiedlne dla  $sl(3, \mathbb{C})$ .

Oczywiście,  $sl(3, \mathbb{C})$  można również reprezentować w antysymetrycznym iloczynie tensorowym. Nie prowadzi to jednak do dodatkowych reprezentacji. Zauważmy bowiem, że  $\otimes_a^3 \mathbb{C}^3$  i  $\otimes_a^3 \mathbb{C}^{3\#}$  są jednowymiarowe, zatem  $sl(3, \mathbb{C})$  są na niej trywialne. Natomiast reprezentacja na  $\otimes_a^2 \mathbb{C}^3$  jest równoważna reprezentacji antyfundamentalnej, zaś na  $\otimes_a^2 \mathbb{C}^{3\#}$  — fundamentalnej.

## 11.2 Algebra Cartana

$sl(3, \mathbb{C})$  jest oczywisty sposób zanurzona w  $gl(3, \mathbb{C})$ , która jest rozpięta przez operatory  $A_{ij} := |i\rangle\langle j|$ .  $gl(3, \mathbb{C})$  posiada naturalny iloczyn skalarny

$$\langle A|B \rangle = \text{Tr} A^\# B, \quad (11.91)$$

w którym  $A_{ij}$  stanowią bazę ortonormalną.

Zbiór elementów diagonalnych algebry  $sl(3, \mathbb{C})$  nazywamy *algebrą Cartana* dla  $sl(3, \mathbb{C})$  i oznaczamy przez  $\mathfrak{h}$ . Jest to maksymalna przemienna podalgebra w  $sl(3, \mathbb{C})$ . Jest ona rozpięta przez  $H_{ij} = -H_{ji} = A_{ii} - A_{jj}$ ,  $i \neq j$ . Oczywiście,

$$H_{12} + H_{23} + H_{31} = 0.$$

$\mathfrak{h}$  ma 2 wymiary i jako jej bazę można wybrać  $H_{12}$ ,  $H_{23}$ . Zauważmy, że  $\langle H_{12}|H_{23} \rangle = -1$ ,  $\langle H_{12}|H_{12} \rangle = \langle H_{23}|H_{23} \rangle = 2$ . Dlatego też kąt między  $H_{12}$  i  $H_{23}$  wynosi  $\frac{2\pi}{3}$ . Zbiór elementów  $\mathfrak{h}^\#$ , które na  $H_{ij}$ ,  $H_{jk}$ ,  $H_{ki}$  przyjmują wartości całkowite nazywa się *kratą wagową*  $\mathcal{W}$ .



### 11.3 Wagi reprezentacji

Założmy, że mamy reprezentację  $\pi$  algebry Liego  $su(3)$  (albo  $sl(3, \mathbb{C})$ ) w skończonej wymiarowej przestrzeni  $\mathcal{V}$ . Dla  $A \in sl(2, \mathbb{C})$  będziemy pisać  $A$  zamiast  $\pi(A)$ . Wektory w  $\mathcal{V}$  które są wektorami własnymi dla algebry Cartana nazywamy *wektorami wagowymi* tej reprezentacji. Ich wartości własne zależą liniowo od  $\mathfrak{h}$ , można więc je interpretować jako elementy  $\mathfrak{h}^\#$ . Nazywamy je *wagami*. Oznaczmy przez  $\mathcal{V}_\beta$  przestrzeń wektorów własnych dla wagi  $\beta \in \mathfrak{h}^\#$ . Mamy

$$Hv = \langle \beta | H \rangle v, \quad v \in \mathcal{V}_\beta, \quad H \in \mathfrak{h}.$$

### 11.4 Reprezentacja fundamentalna i antyfundamentalna

Wagi reprezentacji fundamentalnej  $L_i$  spełniają dla różnych  $i, j, k$

$$\langle L_i | H_{ij} \rangle = 1, \quad \langle L_i | H_{jk} \rangle = 0, \quad \langle L_i | H_{ki} \rangle = -1.$$

Zatem

$$L_i = \frac{1}{3}(H_{ij} + H_{ik}), \quad H_{ij} = L_i - L_j.$$

Oczywiście,  $L_1 + L_2 + L_3 = 0$ . Jeśli wybierzemy  $L_1, L_2$  jako bazę, to

$$\begin{aligned} H_{12} &= L_1 - L_2, \\ H_{23} &= L_2 - L_3 = L_1 + 2L_2, \\ H_{31} &= L_3 - L_1 = -2L_1 - L_2. \end{aligned}$$

Wektory  $L_i$  rozpinają kratę wagową. Razem z wektorami  $-L_i$  leżą na wierzchołkach sześciokąta foremego:

$$\begin{array}{ccc} & -L_3 & \\ L_2 & & L_1 \\ -L_1 & & -L_2 \\ & L_3 & \end{array}$$

### 11.5 Pierwiastki

Elementy  $A_{ij}$  dla  $i \neq j$  należą do  $sl(3, \mathbb{C})$  i nazywamy je *operatorami pierwiastkowymi*. Elementy  $A_{ij}, A_{ji}$  i  $H_{ij}$  spełniają relacje  $sl(2, \mathbb{C})$

$$[A_{ij}, A_{ji}] = H_{ij}, \quad [H_{ij}, A_{ij}] = 2A_{ij}, \quad [H_{ij}, A_{ji}] = -2A_{ji}.$$

Zatem wartości własne  $H_{ij}$  muszą być liczbami całkowitymi. Stąd wynika, że wagi każdej reprezentacji muszą należeć do kraty wagowej.

Jedną z reprezentacji jest reprezentacja dołączona, czyli reprezentacja dla której przestrzenią jest samo  $sl(3, \mathbb{C})$  zaś działaniem jest komutator. Dla reprezentacji dołączonej mamy wagę zerową, dla której wektorami wagowymi jest algebra Cartana. Operatory pierwiastkowe spełniają

$$[H, A_{ij}] = \alpha_{ij}(H)A_{ij}, \quad H \in \mathfrak{h},$$

gdzie  $\alpha_{ij}$  jest funkcjonałem liniowym na  $\mathfrak{h}$  zwanym *pierwiastkiem*. Innymi słowy, pierwiastek  $\alpha_{ij}$  jest wagą dla  $A_{ij}$  w reprezentacji dołączonej. Jeśli  $i, j, k$  są różne, można to zapisać jako

$$\alpha_{ij}(H_{ij}) = 2, \quad \alpha_{ij}(H_{jk}) = -1, \quad \alpha_{ij}(H_{ki}) = -1.$$

Identyfikując  $\mathfrak{h}^\#$  z  $\mathfrak{h}$  przy pomocy iloczynu skalarnego (11.91) dostajemy utożsamienie  $\alpha_{ij} = H_{ij}$ . Zbiór elementów  $\mathfrak{h}^\#$  będących całkowitoliczbowymi kombinacjami liniowymi pierwiastków nazywamy *kratą pierwiastkową*  $\mathcal{U}$ . Oczywiście,  $\mathcal{U} \subset \mathcal{W}$ .

Niech  $\beta \in \mathcal{W}$  będzie wagą pewnej reprezentacji. Mamy

$$A_{ij}\mathcal{V}_\beta \subset \mathcal{V}_{\beta+\alpha_{ij}}.$$

Oczywiście, elementy algebry Cartana zachowują  $\mathcal{V}_\beta$ . Dlatego, jeśli reprezentacja jest nieprzywiedlna i ma wagę  $\beta \in \mathcal{W}$ , to wszystkie inne wagi należą do  $\beta + \mathcal{U}$ .

## 11.6 Trialność

Krata  $\mathcal{W}$  dzieli się na trzy podkraty:

$$\mathcal{W}_k := \{n_1L_1 + n_2L_2 : n_1 + n_2 \in 3\mathbb{Z} + k\}.$$

Równoważnie,

$$\mathcal{W}_0 = \mathcal{U}, \quad \mathcal{W}_1 = L_1 + \mathcal{U}, \quad \mathcal{W}_2 = 2L_1 + \mathcal{U}.$$

$k \in \mathbb{Z}_3$  nazywa się *trialnością* kraty. Wagi reprezentacji typu  $(p, q)$  leżą na kracie  $\mathcal{W}_{p-q}$ .

$SU(3)$  ma centrum  $\{e^{i\frac{2\pi k}{3}} \mathbb{1} : k = 0, 1, 2\} \simeq \mathbb{Z}_3$ .  $\mathbb{Z}_3$  ma 3 reprezentacje nieprzywiedlne, też numerowane przez  $\mathbb{Z}_3$ . Trialność danej reprezentacji odpowiada reprezentacji centrum.

## 11.7 Pierwiastki ujemne i dodatnie

Wśród operatorów pierwiastkowych wyróżniamy pierwiastki ujemne:

$$A_{12}, A_{13}, A_{23}$$

i pierwiastki dodatnie:

$$A_{21}, A_{31}, A_{32}.$$

Wektor najwyższej wagi to taki, który jest zabijany przez pierwiastki ujemne. Każda reprezentacja nieprzywiedlna posiada dokładnie jeden (z dokładnością do czynnika) wektor najwyższej wagi  $\Psi$ . Wtedy każdy wektor jest kombinacją liniową wektorów postaci  $B_1 \cdots B_n \Psi$ , gdzie  $B_1, \dots$  są pierwiastkami dodatnimi.

Niech  $e_1, e_2, e_3$  będzie bazą  $\mathbb{C}^3$  a  $e^1, e^2, e^3$  bazą dualną w  $\mathbb{C}^{\#3}$ . Reprezentacja nieprzywiedlna na  $\otimes_{\mathbb{C}}^p \mathbb{C}^3 \otimes \otimes_{\mathbb{C}}^q \mathbb{C}^{\#3}$  ma wektor najwyższej wagi  $\otimes^p e_1 \otimes \otimes^q e^3$  z wagą  $pL_1 - qL_3 = (p+q)L_1 + qL_2$ .

## 11.8 Diagramy wagowe przykładowych reprezentacji

$\mathbb{C}^3$ : wagi  $\{L_i\}$ , najwyższa waga  $L_1$

$$\begin{array}{ccc} 1 & & \underline{1} \\ & & 1 \end{array}$$

$\otimes_s^2 \mathbb{C}^3$ : wagi  $\{L_i + L_j\}$ , najwyższa waga  $2L_1$

$$\begin{array}{ccc} 1 & 1 & \underline{1} \\ & 1 & 1 \\ & & 1 \end{array}$$

$\otimes_s^3 \mathbb{C}^3$ : wagi  $\{L_i + L_j + L_k\}$ , najwyższa waga  $3L_1$

$$\begin{array}{cccc} 1 & 1 & 1 & \underline{1} \\ & 1 & 1 & 1 \\ & & 1 & 1 \\ & & & 1 \end{array}$$

$\mathbb{C}^{3\#}$ : wagi  $\{-L_i\}$ , najwyższa waga  $-L_3$

$$\begin{array}{ccc} & & \underline{1} \\ & & 1 \\ 1 & & 1 \end{array}$$

$\otimes_s^2 \mathbb{C}^{3\#}$ : wagi  $\{-L_i - L_j\}$ , najwyższa waga  $-2L_3$

$$\begin{array}{ccc} & & \underline{1} \\ & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{array}$$

$\otimes_s^3 \mathbb{C}^{3\#}$ : wagi  $\{-L_i - L_j - L_k\}$ , najwyższa waga  $-3L_3$

$$\begin{array}{cccc} & & & \underline{1} \\ & 1 & 1 & \\ & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array}$$

reprezentacja dołączona, działa w  $\mathbb{C}^3 \otimes \mathbb{C}^{3\#}$ , wagi  $\{L_i - L_j, i \neq j; 2 \times 0\}$ , najwyższa waga  $L_1 - L_3$

$$\begin{array}{ccc} 1 & & \underline{1} \\ 1 & 2 & 1 \\ & 1 & 1 \end{array}$$

reprezentacja w  $\otimes_s^2 \mathbb{C}^3 \otimes \mathbb{C}^{3\#}$ , wagi  $\{2L_i - L_j, i \neq j; -2L_i; 2 \times L_i\}$  najwyższa waga  $2L_1 - L_3$

$$\begin{array}{cccc} 1 & 1 & \underline{1} & \\ 1 & 2 & 2 & 1 \\ & 1 & 2 & 1 \\ & & 1 & 1 \end{array}$$

Zbiór wag reprezentacji wraz z krotnościami musi spełniać następujące własności:

- (1) Jest symetryczny względem odbicia w każdej z osi zadanej przez  $L_k$ .
  - (2) Po przecięciu dowolną prostą prostopadłą do  $L_k$  dostajemy krotności pewnej reprezentacji  $SU(2)$ .
  - (3) Jeśli reprezentacja jest nieprzywiedlna, to jej wagi znajdują się w jednej z podkrat  $\mathcal{W}_0$ ,  $\mathcal{W}_1$  lub  $\mathcal{W}_2$ .
- (1) wynika z tego, że  $B \mapsto W_{ij} A W_{ij}^{-1}$  jest izomorfizmem algebry  $sl(3, \mathbb{C})$ , gdzie

$$W_{ij} = W_{ij}^{-1} := A_{kk} + A_{ij} + A_{ji}.$$

Ten izomorfizm zamienia  $H_{ij}$  na  $-H_{ji}$  i  $H_{ik}$  na  $H_{jk}$ .

(2) Wynika z tego, że jeśli  $\mathcal{H}_\beta$  jest przestrzenią wagową, to  $\oplus \mathcal{H}_{\beta+\mu}$  gdzie  $\mu$  to kombinacje liniowe  $\alpha_{ij}$  rozpinają reprezentację  $sl(2, \mathbb{C})$ .

Mamy następującą regułę dla krotności wag (wymiaru przestrzeni wagowych) reprezentacji nieprzywiedlnych. Wagi na obrzeżach mają krotność 1. W każdej następnej warstwie zwiększają się o 1, chyba że dochodzimy do warstwy w formie trójkąta, i wtedy nie zwiększamy krotności. W szczególności, dla reprezentacji w  $\otimes_s^n \mathbb{C}^3$  i  $\otimes_s^n \mathbb{C}^{3\#}$ , które mają obrzeża trójkątne, wszystkie krotności są równe 1.

## 11.9 Symetrie w mechanice kwantowej

Niech  $\mathcal{H}$  będzie przestrzenią Hilberta a  $G \ni g \mapsto U(g) \in U(\mathcal{H})$  reprezentacją unitarną grupy.

Najczęstsze zastosowanie teorii grup to *symetrie przybliżone*. Załóżmy, że  $A_1, \dots, A_n$  jest układem komutujących samosprężonych obserwabli, które powoli zmieniają się z czasem. Na przykład, jeśli  $H = H_0 + V$  jest hamiltonianem i  $V$  jest w odpowiednim sensie małe, to jedną z tych obserwabli może być  $H_0$ . Załóżmy, że  $U(g)$ ,  $g \in G$ , komutują z  $A_1, \dots, A_n$ . Wtedy przestrzenie własne dla  $A_1, \dots, A_n$  są niezmiennicze dla  $G$ .

Inne zastosowanie to *grupy cechowania*. Oznacza to, że zarówno hamiltonian  $H$  jak i wszystkie obserwabli fizyczne komutują z  $U(g)$ ,  $g \in G$ .

## 11.10 Konwencje

Reprezentacje unitarne  $u(1)$  są jednowymiarowe i zadane są przez  $q \in \mathbb{R}$ , zwany ładunkiem

$$u(1) \ni \theta \mapsto e^{i\theta q}.$$

Przy iloczynie tensorowym ładunki się dodają.

Reprezentacje nieprzywiedlne  $su(n)$ ,  $so(n)$  są z reguły oznaczane liczbami odpowiadającymi ich wymiarowi. Dla reprezentacji sprzężonej dopisujemy kreskę. Tak więc reprezentacja fundamentalna  $su(n)$  jest oznaczana przez  $n$  a antyfundamentalna przez  $\bar{n}$ .

## 11.11 Zachowane ładunki

Każda cząstka pozostawiona samej sobie w końcu rozpadnie się na fotony, neutrina, elektrony, protony i ich antycząstki.

Następujące wielkości nie zależą od kanałów rozpadu: ładunek elektryczny

$$Q := \#p + \#\bar{e} - \#\bar{p} - \#e,$$

i ładunek barionowy

$$B := \#p - \#\bar{p}.$$

Są to liczby, które są zawsze zachowane.

## 11.12 Izospin

Proton  $p$  i neutron  $n$  mają podobne masy i własności nie związane z oddziaływaniem elektromagnetycznym. Podobnie mezony  $\pi^+$ ,  $\pi^0$ ,  $\pi^-$ .

Heisenberg zaproponował, że hamiltonian ma rozkład

$$H = H_{\text{strong}} + H_{\text{em}},$$

gdzie  $H_{\text{strong}}$  to hamiltonian oddziaływań silnych niezmienniczy względem grupy  $SU(2)$ , w odróżnieniu od hamiltonianu elektromagnetycznego  $H_{\text{em}}$ . Oznaczmy przez  $I_1, I_2, I_3$  generatory  $su(2)$ , zwane izospinem. Oddziaływanie elektromagnetyczne komutuje jedynie z  $I_3$ .

Proton  $p$  i neutron  $n$  byłyby wektorami własnymi  $I_3$  należącymi do reprezentacji fundamentalnej  $SU(2)$ . Przyjmujemy, że proton i neutron należą do reprezentacji o izospinie  $\frac{1}{2}$ :

$$I_3 p = \frac{1}{2} p, \quad I_3 n = -\frac{1}{2} n.$$

Podobnie, mezony  $\pi$  należą do reprezentacji o izospinie 1:

$$I_3 \pi^+ = \pi^+, \quad I_3 \pi^0 = 0, \quad I_3 \pi^- = -\pi^-.$$

Ogólniej, zaobserwowano, że możemy pogrupować cząstki w multiplety izospinowe. W obrębie tego samego multipletu izospinowego cząstki są bardzo podobne pod względem masy i innych własności, natomiast mają inny ładunek elektryczny i  $I_3$ .

Zauważono, że oddziaływania między cząstkami można podzielić na silne, które następują bardzo szybko, słabe, które są znacznie wolniejsze i elektromagnetyczne. Izospin zachowywany jest w oddziaływaniach silnych, ale nie słabych, np:

$$\pi^+ \rightarrow \mu^+ + \nu_\mu, \quad \mu^+ \rightarrow e^+ + \nu_e + \bar{\nu}_\mu.$$

Biorąc pod uwagę oddziaływania silne każdej cząstce można przypisać wartość  $I_3$ .

Zwróć uwagę na to, że dla multipletu nukleonowego i pionowego zachodzi związek

$$Q = I_3 + \frac{1}{2} B. \tag{11.92}$$

### 11.13 Dziwność

Zauważono, że istnieje jeszcze jedna liczba, która jest zachowana w reakcjach silnych, a w reakcjach słabych zmienia się o  $\pm 1$ . Nazwano ją dziwnością i oznaczono przez  $S$ . Przyjęto, że “standardowe cząstki” takie jak  $p, n, \pi, e$  mają dziwność zero.

Okazało się, że cząstki oddziałujące silnie można pogrupować w większe multiplety, w obrębie których cząstki różnią się o wartość  $S$  i  $I_3$ . W obrębie multipletów mamy stosunkowo podobne masy, ten sam spin i tę samą liczbę barionową. Okazało się, że multiplety te mają symetryczną postać, jeśli za współrzędne wybierze się  $I_3$  i hiperładunek

$$Y = B + S.$$

Znaleziono też związek zwany formułą Gell-Manna – Nishijimy uogólniający (11.92):

$$Q = I_3 + \frac{1}{2}Y.$$

Hadrony z zerowym ładunkiem barionowym nazywane są mezonami. Na poniższych diagramach na osi pionowej odkładamy  $Y$ , na osi poziomej  $I_3$ .

Najważniejsze multiplety mezonów ( $B = 0$ ):

Nonet pseudoskalarny składa się z oktetu

$$\begin{array}{ccc} & K^0 & K^+ \\ \pi^- & \pi^0, \eta & \pi^+ \\ & K^- & K^{\bar{0}} \end{array}$$

i singletu  $\eta'$ .

Nonet pseudowektorowy składa się z oktetu

$$\begin{array}{ccc} & K^{*0} & K^{*+} \\ \rho^- & \rho^0, \omega & \rho^+ \\ & K^{*-} & K^{*\bar{0}} \end{array}$$

i singletu  $\omega'$ .

Oto podstawowe multiplety barionów ( $B = 1$ ):

Oktet ze spinem  $\frac{1}{2}$ :

$$\begin{array}{ccc} & n & p \\ \Sigma^- & \Sigma^0, \Lambda^0 & \Sigma^+ \\ & \Xi^- & \Xi^0 \end{array}$$

Dekuplet ze spinem  $\frac{3}{2}$ :

$$\begin{array}{cccc}
 \Delta^- & \Delta^0 & \Delta^+ & \Delta^{++} \\
 & \Sigma^{*-} & \Sigma^{*0} & \Sigma^{*+} \\
 & & \Xi^{*-} & \Xi^{*0} \\
 & & & \Omega^-
 \end{array}$$

### 11.14 Kwarki

Wprowadźmy 3 kwarki:  $u$ ,  $d$  i  $s$ . Traktujemy je jako wektory wagowe dla fundamentalnej reprezentacji  $SU(3)$ :

$$\begin{array}{cc}
 d & u \\
 & s
 \end{array}$$

Mamy też antykwarki odpowiadające reprezentacji antyfundamentalnej:

$$\begin{array}{cc}
 \bar{s} \\
 \bar{u} & \bar{d}
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 Q &= \frac{1}{3}(2\#u - \#d - \#s), \\
 B &= \frac{1}{3}(\#u + \#d + \#s), \\
 S &= -\#s, \\
 Y &= \frac{1}{3}(\#u + \#d - 2\#s), \\
 I_3 &= \frac{1}{2}(\#u - \#d).
 \end{aligned}$$

Rozważmy grupę  $SU(3)_{\text{fl}}$  opisującą flawory  $u, d, s$ , grupę  $SU(2)_{\text{spin}}$  opisującą spin i  $SU(3)_{\text{col}}$  odpowiedzialna za kolor. Kwarki można traktować jako elementy  $\mathbb{C}_{\text{fl}}^3 \otimes \mathbb{C}_{\text{spin}}^2 \otimes \mathbb{C}_{\text{col}}^3$ , zaś antykwarki jako elementy  $\bar{\mathbb{C}}_{\text{fl}}^3 \otimes \bar{\mathbb{C}}_{\text{spin}}^2 \otimes \bar{\mathbb{C}}_{\text{col}}^3$ . Działa na nich grupa  $SU(3)_{\text{fl}} \times SU(2)_{\text{spin}} \times SU(3)_{\text{col}}$

Kwarki są fermionami, zatem stany są opisywane przez elementy

$$\otimes_a^p (\mathbb{C}_{\text{fl}}^3 \otimes \mathbb{C}_{\text{spin}}^2 \otimes \mathbb{C}_{\text{col}}^3) \otimes \otimes_a^q (\bar{\mathbb{C}}_{\text{fl}}^3 \otimes \bar{\mathbb{C}}_{\text{spin}}^2 \otimes \bar{\mathbb{C}}_{\text{col}}^3). \quad (11.93)$$

Hipoteza *uwięzienia* mówi, że w fizyce realizowane są tylko stany “bezbarwne”, czyli takie na które grupa kolorowa działa trywialnie. Jeśli zanurzymy (11.93) w przestrzeni

$$\otimes^p (\mathbb{C}_{\text{fl}}^3 \otimes \mathbb{C}_{\text{spin}}^2) \otimes \otimes^q (\bar{\mathbb{C}}_{\text{fl}}^3 \otimes \bar{\mathbb{C}}_{\text{spin}}^2) \otimes \left( \otimes^p \mathbb{C}_{\text{col}}^3 \otimes \otimes^q \bar{\mathbb{C}}_{\text{col}}^3 \right), \quad (11.94)$$

to będą one postaci  $\Psi \otimes \Phi$ , gdzie  $\Phi$ , odpowiadające “kolorowym” stopniom swobody, jest singletem względem  $SU(3)$ .

Wśród  $\otimes^p \mathbb{C}_{\text{col}}^3 \otimes \otimes^q \bar{\mathbb{C}}_{\text{col}}^3$  reprezentacje singletowe z najmniejszymi  $(p, q) \neq (0, 0)$  znajdziemy dla  $(1 \otimes 1)$  (mezony),  $(3, 0)$  (bariony) i  $(0, 3)$  (antybariony).

W szczególności, mezony są elementami

$$\begin{aligned} & \mathbb{C}_{\text{fl}}^3 \otimes \mathbb{C}_{\text{spin}}^2 \otimes \mathbb{C}_{\text{col}}^3 \otimes \bar{\mathbb{C}}_{\text{fl}}^3 \otimes \bar{\mathbb{C}}_{\text{spin}}^2 \otimes \bar{\mathbb{C}}_{\text{col}}^3 \\ &= \left( \mathbb{C}_{\text{fl}}^3 \otimes \mathbb{C}_{\text{spin}}^2 \otimes \bar{\mathbb{C}}_{\text{fl}}^3 \otimes \bar{\mathbb{C}}_{\text{spin}}^2 \right) \otimes \left( \mathbb{C}_{\text{col}}^3 \otimes \bar{\mathbb{C}}_{\text{col}}^3 \right). \end{aligned}$$

Warunek bezbarwności daje

$$\Psi \otimes \frac{1}{\sqrt{3}} (|1, \bar{1}\rangle + |2, \bar{2}\rangle + |2, \bar{2}\rangle),$$

gdzie 1,2,3 odpowiada 3 kolorom i

$$\Psi \in \mathbb{C}_{\text{fl}}^3 \otimes \mathbb{C}_{\text{spin}}^2 \otimes \bar{\mathbb{C}}_{\text{fl}}^3 \otimes \bar{\mathbb{C}}_{\text{spin}}^2 \simeq (\mathbb{C}_{\text{fl}}^3 \otimes \bar{\mathbb{C}}_{\text{fl}}^3) \otimes (\mathbb{C}_{\text{spin}}^2 \otimes \bar{\mathbb{C}}_{\text{spin}}^2).$$

Dla reprezentacji  $SU(3)_{\text{fl}}$  mamy  $3 \otimes \bar{3} = 8 + 1$ . Dla reprezentacji  $SU(2)_{\text{spin}}$  mamy  $2 \otimes 2 = 3 + 1$ , co daje spin 0 i 1. Zatem dostajemy oba nonety mezonów.

Oto “zawartość kwarkowa” nonetów mezonowych:

$$\begin{array}{ccc} d\bar{s} & & u\bar{s} \\ d\bar{u} & d\bar{d}, u\bar{u}, s\bar{s} & u\bar{d} \\ s\bar{u} & & s\bar{d} \end{array}$$

Mezony o zerowym ładunku różnią się kwarkami:

$$\begin{aligned} \pi^0 &= \frac{1}{\sqrt{2}} (d\bar{d} - u\bar{u}), \\ \eta &= \frac{1}{\sqrt{6}} (2s\bar{s} - d\bar{d} - u\bar{u}), \\ \eta' &= \frac{1}{\sqrt{3}} (s\bar{s} + d\bar{d} + u\bar{u}). \end{aligned}$$

Bariony są elementami

$$\begin{aligned} & \otimes_a^3 (\mathbb{C}_{\text{fl}}^3 \otimes \mathbb{C}_{\text{spin}}^2 \otimes \mathbb{C}_{\text{col}}^3) \\ \subset & \otimes^3 (\mathbb{C}_{\text{fl}}^3 \otimes \mathbb{C}_{\text{spin}}^2) \otimes \otimes^3 \mathbb{C}_{\text{col}}^3. \end{aligned}$$

Warunek bezbarwności daje

$$\Psi \otimes \frac{1}{\sqrt{3!}} (|1, 2, 3\rangle + |2, 3, 1\rangle + |3, 1, 2\rangle - |1, 3, 2\rangle - |3, 2, 1\rangle - |1, 3, 2\rangle).$$



Kolorowa część wektora jest antysymetryczna. Zatem  $\Psi$  musi być elementem  $\otimes_s^3(\mathbb{C}_{fl}^3 \otimes \mathbb{C}_{spin}^2)$ , która ma wymiar  $\frac{6 \cdot 7 \cdot 8}{1 \cdot 2 \cdot 3} = 56$ . Ze względu na działanie grupy  $SU(3)_{fl} \times SU(2)_{spin}$ , na pewno w  $\otimes_s^3(\mathbb{C}_{fl}^3 \otimes \mathbb{C}_{spin}^2)$  znajdziemy reprezentację  $\otimes_s^3 \mathbb{C}_{fl}^3 \otimes \otimes_s^3 \mathbb{C}_{spin}^2$ . Ma ona wymiar  $10 \times 4$ . Zatem została reprezentacja  $56 - 40 = 16$ -wymiarowa. Odpowiada ona reprezentacji dołączonej  $SU(3)_{rmfl}$  razy  $\mathbb{C}^2$ . Czyli mamy rozkład

$$\mathbb{C}^{10} \otimes \mathbb{C}^4 \oplus \mathbb{C}^8 \otimes \mathbb{C}^2,$$

co odpowiada dekupletowi (reprezentacji  $\otimes_s^3 \mathbb{C}^3$ ) o spinie  $\frac{3}{2}$  i oktetowi (reprezentacji dołączonej) o spinie  $\frac{1}{2}$ .

A oto “zawartość kwarkowa” multipletów barionowych:

$$\begin{array}{cccc} ddd & ddu & duu & uuu \\ & dds & dus & uus \\ & & dss & uss \\ & & & sss \end{array}$$

A oto stany spinowe barionów leżących w środku diagramu, gdzie występuje największa degeneracja:

$$\begin{array}{l} \Sigma^{*0} \quad d \uparrow u \uparrow s \uparrow, \\ \quad \frac{1}{\sqrt{3}}(d \uparrow u \uparrow s \downarrow + d \uparrow u \downarrow s \uparrow + d \downarrow u \uparrow s \uparrow), \\ \quad \frac{1}{\sqrt{3}}(d \downarrow u \downarrow s \uparrow + d \uparrow u \downarrow s \downarrow + d \downarrow u \uparrow s \downarrow), \\ \quad d \downarrow u \downarrow s \downarrow; \\ \Sigma^0 \quad \frac{1}{\sqrt{6}}(2d \uparrow u \uparrow s \downarrow - d \uparrow u \downarrow s \uparrow - d \downarrow u \uparrow s \uparrow), \\ \quad \frac{1}{\sqrt{6}}(2d \downarrow u \downarrow s \uparrow - d \uparrow u \downarrow s \downarrow - d \downarrow u \uparrow s \downarrow); \\ \Lambda^0 \quad \frac{1}{\sqrt{2}}(d \uparrow u \downarrow s \uparrow - d \downarrow u \uparrow s \uparrow), \\ \quad \frac{1}{\sqrt{2}}(d \uparrow u \downarrow s \downarrow - d \downarrow u \uparrow s \downarrow). \end{array}$$

Ażeby dostać stany np.  $\Sigma^{*-}$  i  $\Sigma^-$  należy zamienić wszędzie  $u$  na  $d$  i odrzucić  $\Lambda^0$ .

Wszystkie fizycznie realizowane reprezentacje  $SU(3)_{fl}$  mają tryalność 0 – to wynika z “bezbarności”.

## 12 Algebry Clifforda i grupy Spin

### 12.1 Algebry Clifforda

Będziemy oznaczać przez  $\mathbb{K}(n)$  algebrę macierzy  $n \times n$  nad  $\mathbb{K} = \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}$ .

Niech  $\phi_1, \dots, \phi_n$  spełniają relacje

$$[\phi_i, \phi_j]_+ = 2\delta_{ij}\mathbb{1}. \quad (12.95)$$

Algebra łączna nad  $\mathbb{R}$  generowana przez  $\mathbb{1}, \phi_1, \dots, \phi_n$  spełniająca te relacje nazywa się (*rzeczywistą*) *algebrą Clifforda*  $\text{Cl}^+(\mathbb{R}^n) = \text{Cl}^+(n)$ .

Niech  $\gamma_1, \dots, \gamma_n$  spełniają relacje

$$[\gamma_i, \gamma_j]_+ = -2\delta_{ij}\mathbb{1}. \quad (12.96)$$

Algebra łączna nad  $\mathbb{R}$  generowana przez  $\mathbb{1}, \gamma_1, \dots, \gamma_n$  spełniająca te relacje nazywa się (*rzeczywistą*) *algebrą Clifforda*  $\text{Cl}^-(\mathbb{R}^n) = \text{Cl}^-(n)$ .

Algebra łączna nad  $\mathbb{C}$  generowana przez  $\mathbb{1}, \phi_1, \dots, \phi_n$  spełniająca (12.95) nazywa się *zespoloną algebrą Clifforda* i będzie oznaczana przez  $\text{Cl}(\mathbb{C}^n)$ . Jest ona izomorficzna algebrze nad  $\mathbb{C}$  generowanej przez  $\mathbb{1}, \gamma_1, \dots, \gamma_n$  spełniających (12.96), gdzie izomorfizm jest zadany przez

$$\gamma_i := i\phi_i. \quad (12.97)$$

Zarówno  $\text{Cl}^+(\mathbb{R}^n)$  jak i  $\text{Cl}^-(\mathbb{R}^n)$  są rzeczywistymi podalgebrami w  $\text{Cl}(\mathbb{C}^n) = \text{Cl}(n, \mathbb{C})$ . W dalszym ciągu będziemy traktować algebry  $\text{Cl}^+(\mathbb{R}^n)$  i  $\text{Cl}(\mathbb{C}^n)$  jako podstawowe obiekty, ponieważ  $\text{Cl}^-(\mathbb{R}^n)$  można otrzymać przez (12.97).

Bazę algebry  $\text{Cl}^+(\mathbb{R}^n)$  stanowią elementy  $\phi_{i_1} \cdots \phi_{i_k}$ , gdzie  $i_1 < \dots < i_k$ .

## 12.2 Algebry Clifforda jako \*-algebry

**Definicja 12.1** *Mówimy, że algebra  $\mathfrak{A}$  nad  $\mathbb{C}$  jest \*-algebrą gdy jest wyposażona w antyliniowe odwzorowanie  $\mathfrak{A} \ni A \mapsto A^* \in \mathfrak{A}$  takie, że  $(AB)^* = B^*A^*$ ,  $A^{**} = A$  i  $A \neq 0$  implikuje  $A^*A \neq 0$ . \* nazywa się inwolucją lub gwiazdką.*

**Definicja 12.2** *Jeśli  $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$  są \*-algebrami, to homomorfizm  $\pi : \mathfrak{A} \rightarrow \mathfrak{B}$  spełniający  $\pi(A^*) = \pi(A)^*$  nazywa się \*-homomorfizmem. (Również definiujemy \*-izomorfizmy, \*-automorfizmy, \*-ideały, etc.)*

Zespolone algebry Clifforda są \*-algebrami, jeśli wyposażymy je w inwolucję jednoznacznie zdefiniowaną przez  $\phi_i^* = \phi_i$ . W szczególności, można zdefiniować *unitarne* elementy algebry Clifforda, które spełniają  $A^*A = AA^* = \mathbb{1}$ , a także samosprężone elementy, spełniające  $A = A^*$ .

## 12.3 Parzyste algebry Clifforda

Odwzorowanie  $\phi_i \mapsto -\phi_i$  (lub równoważnie  $\gamma_i \mapsto -\gamma_i$ ) rozszerza się jednoznacznie do automorfizmu algebr Clifforda oznaczanego przez  $\alpha$ . Elementy zachowywane przez ten automorfizm nazywają się parzystymi. Podalgebrę parzystych elementów w  $\text{Cl}(\mathbb{C}^n)$  oznaczamy przez  $\text{Cl}_0(\mathbb{C}^n)$ .

Jeśli rozpatrujemy  $\text{Cl}^+(\mathbb{R}^n)$  i  $\text{Cl}^-(\mathbb{R}^n)$  jako podalgebry  $\text{Cl}(\mathbb{C}^n)$ , to zbiór parzystych elementów w obu algebrach się pokrywa. Będziemy go oznaczali przez  $\text{Cl}_0(\mathbb{R}^n)$  (nie wskazując na znak  $\pm$ ).

Mamy izomorfizm

$$\text{Cl}_0(\mathbb{R}^n) \simeq \text{Cl}^-(\mathbb{R}^{n-1}).$$

Aby się o nim przekonać zauważmy, że  $\text{Cl}_0(\mathbb{R}^n)$  jest generowana przez  $\psi_j := \phi_j \phi_n, j = 1, \dots, n-1$ , spełniające relacje

$$[\psi_j, \psi_k]_+ = -2\delta_{jk}\mathbb{1}.$$

Podobnie,

$$\text{Cl}_0(\mathbb{C}^n) \simeq \text{Cl}(\mathbb{C}^{n-1}).$$

## 12.4 Element objętości

Następujący element  $\text{Cl}^+(\mathbb{R}^n)$  nazywa się czasem *elementem objętości*:

$$\omega := \phi_1 \cdots \phi_n.$$

Oczywiście,  $\text{Cl}^+(\mathbb{R}^n)$  jest generowane przez  $\phi_1, \dots, \phi_{n-1}, \omega$ . Mamy

$$\omega^2 = (-\mathbb{1})^{\frac{1}{2}n(n-1)}, \quad \omega\phi_i = -(-1)^n\phi_i\omega.$$

W  $\text{Cl}^-(\mathbb{R}^n)$  mamy zamiast tego

$$i^n\omega = \gamma_1 \cdots \gamma_n.$$

Jeśli  $n$  jest parzyste, to  $\omega$  (jak również  $i\omega$ ) implementuje automorfizm  $\alpha$ :

$$\omega A \omega^{-1} = \alpha(A), \quad A \in \text{Cl}(\mathbb{C}^n). \quad (12.98)$$

## 12.5 Konstrukcja Jordana-Wignera

Niech  $n = 2m$ . Rozważmy przestrzeń  $\otimes^m \mathbb{C}^2$ . Wprowadźmy w niej operatory

$$\begin{aligned} \phi_1 &:= \sigma_1, & \phi_2 &:= \sigma_2, \\ \dots & & & \\ \phi_{2m-1} &:= \sigma_3^{\otimes(m-1)} \otimes \sigma_1, & \phi_{2m} &:= \sigma_3^{\otimes(m-1)} \otimes \sigma_2. \end{aligned}$$

Latwo sprawdzić, że  $\phi_1, \dots, \phi_{2m}$  spełniają relacje algebry Clifforda  $\text{Cl}(\mathbb{C}^{2m})$ . Dostajemy zatem reprezentację tej algebry na  $\otimes^m \mathbb{C}^2$ . Korzystając z  $\sigma_1\sigma_2 = i\sigma_3$  dostajemy

$$\omega = i^m \sigma_3^{\otimes m}.$$

**Stwierdzenie 12.3** *Obraz tej reprezentacji jest równy  $L(\otimes^m \mathbb{C}^2) = \mathbb{C}(2^m)$ .*

**Dowód.** Wiemy, że  $\mathbb{1}, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3 = i\sigma_1\sigma_2$  rozpinają  $\mathbb{C}(2)$ . Zatem, posługując się konstrukcją Jordana-Wignera,

$$\mathbb{1}, \quad \phi_1 \cdots \phi_{2k} \phi_{2k+1}, \quad \phi_1 \cdots \phi_{2k} \phi_{2k+2}, \quad \phi_1 \cdots \phi_{2k} \phi_{2k+1} \phi_{2k+2}$$

rozpinają  $\mathbb{1}_{\mathbb{C}^2}^{\otimes k} \otimes \mathbb{C}(2)$ .  $\square$

Dla  $n = 2m + 1$  dodajemy

$$\phi_{2m+1} := \pm \sigma_3^{\otimes(m+1)}.$$

$\phi_1, \dots, \phi_{2m+1}$  spełniają relacje algebry Clifforda  $\text{Cl}(\mathbb{C}^{2m+1})$ . Dostajemy zatem dwie nierównoważne reprezentacje tej algebry na  $\otimes^m \mathbb{C}^2$ . Wtedy

$$\omega = \pm i^m \mathbb{1}^{\otimes m} \otimes \sigma_3.$$

**Twierdzenie 12.4** *Mamy izomorfizmy*

$$\text{Cl}(\mathbb{C}^{2m}) \simeq \mathbb{C}(2^m), \quad (12.99)$$

$$\text{Cl}(\mathbb{C}^{2m+1}) \simeq \mathbb{C}(2^m) \oplus \mathbb{C}(2^m). \quad (12.100)$$

**Dowód.** Najpierw pokazujemy, że  $\text{Cl}(\mathbb{C}^{2m})$  jest izomorficzna z  $\mathbb{C}(2^m)$ .

Następnie kładziemy

$$\pi_{\pm} := \phi_1 \cdots \phi_{2m} \frac{(\phi_{2m+1} \pm \mathbb{1})}{2}.$$

Wtedy  $\pi_{\pm}$  komutują z  $\text{Cl}(\mathbb{C}^{2m+1})$ , mamy relacje  $\pi_{\pm}^2 = \pi_{\pm}$ ,  $\pi_+ \pi_- = 0$ ,  $\pi_+ + \pi_- = \mathbb{1}$ . Poza tym,  $\text{Cl}(\mathbb{C}^{2m+1})$  jest generowana przez  $\text{Cl}(\mathbb{C}^{2m}) \simeq \mathbb{C}(2^m)$  i  $\pi_{\pm}$ . To pokazuje (12.100).  $\square$

## 12.6 Reprezentacja Foka algebry Clifforda

Algebrę Clifforda można zinterpretować jako algebrę generowaną przez fermionowe operatory kreacji i anihilacji.

Załóżmy, że  $n = 2m$ . Definiujemy następujące elementy  $\text{Cl}(\mathbb{C}^n)$ :

$$a_i := \frac{1}{2}(\phi_{2i-1} + i\phi_{2i}), \quad a_i^* := \frac{1}{2}(\phi_{2i-1} - i\phi_{2i}).$$

Mamy wtedy

$$[a_1, a_j]_+ = [a_i^*, a_j^*]_+ = 0, \quad [a_i, a_j^*]_+ = \delta_{ij} \mathbb{1}.$$

Takie relacje, a dodatkowo  $a_i \Omega = 0$ , są spełnione przez standardowe fermionowe operatory kreacji i anihilacji na  $\Gamma_a(\mathbb{C}^m)$ . Dostajemy zatem reprezentację  $\text{Cl}(\mathbb{C}^{2m})$  na  $\Gamma_a(\mathbb{C}^m)$ .

Mamy operator liczby cząstek

$$N = \sum_{i=1}^m a_i^* a_i$$

i operator parzystości

$$(-1)^N = (-1)^{\sum_i a_i^* a_i} = \prod_{i=1}^m (-1)^{a_i^* a_i} = \prod_i (\mathbb{1} - 2a_i^* a_i).$$

Mamy

$$[(-1)^N, a_i]_+ = [(-1)^N, a_i^*]_+ = 0, \quad \left( (-1)^N \right)^2 = \mathbb{1}.$$

Zatem  $\pm(-1)^N$  spełniają razem z  $\phi_1, \dots, \phi_{2m}$  relacje (12.95). Dostajemy zatem dwie nierównoważne reprezentacje  $\text{Cl}^{\pm}(\mathbb{R}^{2m+1})$  i  $\text{Cl}(\mathbb{C}^{2m+1})$  na  $\Gamma_a(\mathbb{C}^m)$ .

Oczywiście, można również te algebry reprezentować na  $\Gamma_a(\mathbb{C}^{m+1})$  dostajemy wtedy reprezentację będącą sumą prostą powyższych reprezentacji.

## 12.7 Postać algebr Clifforda

Używając rezultatów otrzymanych powyżej można dostać następującą tabelkę:

$n$	$\text{Cl}^+(\mathbb{R}^n)$	$\text{Cl}^-(\mathbb{R}^n)$	$\text{Cl}_0(\mathbb{R}^n)$	$\text{Cl}(\mathbb{C}^n)$	$\text{Cl}_0(\mathbb{C}^n)$
0	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$		$\mathbb{C}$	
1	$\mathbb{R} \oplus \mathbb{R}$	$\mathbb{C}$ ,	$\mathbb{R}$	$\mathbb{C} \oplus \mathbb{C}$	$\mathbb{C}$
2	$\mathbb{R}(2)$	$\mathbb{H}$	$\mathbb{C}$	$\mathbb{C}(2)$	$\mathbb{C} \oplus \mathbb{C}$
3	$\mathbb{C}(2)$	$\mathbb{H} \oplus \mathbb{H}$ ,	$\mathbb{H}$	$\mathbb{C}(2) \oplus \mathbb{C}(2)$	$\mathbb{C}(2)$
4	$\mathbb{H}(2)$	$\mathbb{H}(2)$	$\mathbb{H} \oplus \mathbb{H}$	$\mathbb{C}(4)$	$\mathbb{C}(2) \oplus \mathbb{C}(2)$
5	$\mathbb{H}(2) \oplus \mathbb{H}(2)$	$\mathbb{C}(4)$	$\mathbb{H}(2)$	$\mathbb{C}(4) \oplus \mathbb{C}(4)$	$\mathbb{C}(4)$
6	$\mathbb{H}(4)$	$\mathbb{R}(8)$	$\mathbb{C}(4)$	$\mathbb{C}(8)$	$\mathbb{C}(4) \oplus \mathbb{C}(4)$
7	$\mathbb{C}(8)$	$\mathbb{R}(8) \oplus \mathbb{R}(8)$	$\mathbb{R}(8)$	$\mathbb{C}(8) \oplus \mathbb{C}(8)$	$\mathbb{C}(8)$
8	$\mathbb{R}(16)$	$\mathbb{R}(16)$	$\mathbb{R}(8) \oplus \mathbb{R}(8)$	$\mathbb{C}(16)$	$\mathbb{C}(8) \oplus \mathbb{C}(8)$

Rozważmy na przykład  $\text{Cl}^-(4)$ .  $i := \gamma_1$ ,  $j := \gamma_2$ ,  $k := \gamma_1\gamma_2$  daje identyfikację  $\text{Cl}^-(2)$  z  $\mathbb{H}$ .  $\pi_{\pm} := \frac{1}{2}(1 \pm \gamma_1\gamma_2\gamma_3)$  i  $\gamma_3\gamma_4$  komutują z  $\text{Cl}^-(2)$ . Poza tym,

$$\pi_+\gamma_3\gamma_4 = \gamma_3\gamma_4\pi_-.$$

Mamy homomorfizm

$$\mathbb{H}(2) \ni \begin{bmatrix} x_{++} & x_{+-} \\ x_{-+} & x_{--} \end{bmatrix} \mapsto x_{++}\pi_+ + x_{--}\pi_- + x_{+-}\pi_-\gamma_3\gamma_4 + x_{-+}\pi_+\gamma_3\gamma_4 \in \text{Cl}^-(4).$$

A oto bardziej systematyczne wyprowadzenie powyższej tabelki. Rozważmy najpierw  $n = 2m$ . Połóżmy

$$\eta_+ := i^m \phi_2 \phi_4 \cdots \phi_{2m}, \quad \eta_- := \phi_1 \phi_3 \cdots \phi_{2m-1}, \quad .$$

W reprezentacji Jordana-Wignera  $\eta_+$  i  $\eta_-$  są rzeczywiste. Poza tym,

$$\begin{aligned} \eta_+^2 &= (-1)^{\frac{m(m+1)}{2}}, & \eta_-^2 &= (-1)^{\frac{m(m-1)}{2}}; \\ \eta_+\phi_i &= (-1)^m \phi_i \eta_+ = (-1)^m \bar{\phi}_i \eta_+, & \eta_-\phi_i &= -(-1)^m \phi_i \eta_- = (-1)^m \bar{\phi}_i \eta_-, \quad i = 1, 3, \dots, 2m-1; \\ \eta_+\phi_i &= -(-1)^m \phi_i \eta_+ = -(-1)^m \bar{\phi}_i \eta_+, & \eta_-\phi_i &= (-1)^m \phi_i \eta_- = -(-1)^m \bar{\phi}_i \eta_-, \quad j = 2, 4, \dots, 2m. \end{aligned}$$

Wiemy, że  $\text{Cl}(\mathbb{C}^{2m}) = \mathbb{C}(2^m)$ . Zatem

$$\begin{aligned} m \equiv 0 \pmod{4}, & \quad \eta_+^2 = \mathbb{1}, & \text{Cl}(\mathbb{R}^{2m}) &= \{A \in \text{Cl}(\mathbb{C}^{2m}) : \eta_+ A = \bar{A} \eta_+\} = \mathbb{R}(2^m); \\ m \equiv 1 \pmod{4}, & \quad \eta_+^2 = \mathbb{1}, & \text{Cl}(\mathbb{R}^{2m}) &= \{A \in \text{Cl}(\mathbb{C}^{2m}) : \eta_- A = \bar{A} \eta_-\} = \mathbb{R}(2^m); \\ m \equiv 2 \pmod{4}, & \quad \eta_+^2 = -\mathbb{1}, & \text{Cl}(\mathbb{R}^{2m}) &= \{A \in \text{Cl}(\mathbb{C}^{2m}) : \eta_+ A = \bar{A} \eta_+\} = \mathbb{H}(2^{m-1}); \\ m \equiv 3 \pmod{4}, & \quad \eta_+^2 = -\mathbb{1}, & \text{Cl}(\mathbb{R}^{2m}) &= \{A \in \text{Cl}(\mathbb{C}^{2m}) : \eta_- A = \bar{A} \eta_-\} = \mathbb{H}(2^{m-1}). \end{aligned}$$

Załóżmy, że  $n = 2m + 1$  jest nieparzyste. Wtedy  $\omega$  należy do centrum  $\text{Cl}^+(\mathbb{R}^{2m+1})$  a  $i\omega$  należy do centrum  $\text{Cl}^-(\mathbb{R}^{2m+1})$ .

Mamy  $\omega^2 = (-1)^m$ ,  $(i\omega)^2 = (-1)^{m+1}$ . Dlatego mamy izomorfizmy

$$\begin{aligned} m \equiv 0 \pmod{2}, \quad \text{Cl}^+(\mathbb{R}^{2m}) \oplus \text{Cl}^+(\mathbb{R}^{2m}) &\ni (A_1, A_2) \mapsto \frac{\mathbb{1} + \omega}{2} A_1 + \frac{\mathbb{1} - \omega}{2} A_2 \in \text{Cl}^+(\mathbb{R}^{2m+1}), \\ m \equiv 2 \pmod{2}, \quad \mathbb{C}\text{Cl}^+(\mathbb{R}^{2m}) &\ni (A_1 + iA_2) \mapsto A_1 + \omega A_2 \in \text{Cl}^+(\mathbb{R}^{2m+1}). \end{aligned}$$

Stąd

$$\begin{aligned} m \equiv 0 \pmod{4}, \quad \omega^2 = \mathbb{1}, \quad \text{Cl}(\mathbb{R}^{2m+1}) &= \text{Cl}(\mathbb{R}^{2m}) \oplus \text{Cl}(\mathbb{R}^{2m}) = \mathbb{R}(2^m) \oplus \mathbb{R}(2^m); \\ m \equiv 1 \pmod{4}, \quad \omega^2 = -\mathbb{1}, \quad \text{Cl}(\mathbb{R}^{2m+1}) &= \mathbb{C}\text{Cl}(\mathbb{R}^{2m}) = \mathbb{C}(2^m); \\ m \equiv 2 \pmod{4}, \quad \omega^2 = \mathbb{1}, \quad \text{Cl}(\mathbb{R}^{2m+1}) &= \text{Cl}(\mathbb{R}^{2m}) \oplus \text{Cl}(\mathbb{R}^{2m}) = \mathbb{H}(2^{m-1}) \oplus \mathbb{H}(2^{m-1}); \\ m \equiv 3 \pmod{4}, \quad \omega^2 = -\mathbb{1}, \quad \text{Cl}(\mathbb{R}^{2m+1}) &= \mathbb{C}\text{Cl}(\mathbb{R}^{2m}) = \mathbb{C}(2^m). \end{aligned}$$

## 12.8 Grupa Pin i Spin

Niech  $v \in \mathbb{R}^n$ . *Odbiciem względem  $v$*  nazywamy odwzorowanie

$$R_v y := y - 2 \frac{\langle v|y \rangle}{\langle v|v \rangle} v.$$

Oczywiście,  $R_v^2 = \mathbb{1}$  i  $R_v \in O(\mathbb{R}^n) \setminus SO(\mathbb{R}^n)$ .

**Twierdzenie 12.5** *Odbicia generują  $O(\mathbb{R}^n)$ . Zbiór parzystych iloczynów odbić jest równy  $SO(\mathbb{R}^n)$ .*

**Dowód.** Niech  $A \in O(\mathbb{R}^n)$ . Po kompleksyfikacji, można zastosować twierdzenie spektralne. Prowadzi ono do wniosku, że

$$\mathbb{R}^n = \bigoplus_{\phi \in [0, \pi]} \mathcal{V}_\phi, \quad A = \bigoplus_{\phi \in [0, \pi]} A_\phi,$$

gdzie na  $\mathcal{V}_\phi$  dla  $\phi \in \{0, \pi\}$ ,  $A_\phi = e^{i\phi}$  a dla  $\phi \in ]0, \pi[$ ,

$$A_\phi = \begin{bmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix}.$$

(ew. razy identyczność). Zatem wystarczy zanalizować te przypadki.  $\square$

Dla  $v \in \mathbb{R}^n$ , zdefiniujemy element  $\text{Cl}^+(\mathbb{R}^n)$ , odp.  $\text{Cl}^-(\mathbb{R}^n)$

$$\phi(v) := \sum_i v_i \phi_i, \quad \gamma(v) := \sum_i v_i \gamma_i.$$

Oczywiście,

$$\phi(v)^* = \phi(v), \quad \gamma(v)^* = -\gamma(v), \quad \phi(v)\phi(v)^* = \gamma(v)\gamma(v)^* = \langle v|v \rangle,$$

Załóżmy, że  $\langle v|v \rangle = 1$ . Wtedy  $\pm\phi(v)$  i  $\pm\gamma(v)$  są unitarnymi nieparzystymi elementami  $\text{Cl}^+(\mathbb{R}^n)$ , odp.  $\text{Cl}^-(\mathbb{R}^n)$  i

$$(\pm\phi(v))\phi(y)(\pm\phi(v))^* = -\phi(R_v y), \tag{12.101}$$

$$(\pm\gamma(v))\gamma(y)(\pm\gamma(v))^* = -\gamma(R_v y). \tag{12.102}$$

Niech  $Pin^+(\mathbb{R}^n)$  będzie grupą w  $Cl^+(\mathbb{R}^n)$  generowaną przez  $\phi(v)$ ,  $\langle v|v \rangle = 1$ . Analogicznie, niech  $Pin^-(\mathbb{R}^n)$  będzie grupą w  $Cl^-(\mathbb{R}^n)$  generowaną przez  $\gamma(v)$ ,  $\langle v|v \rangle = 1$ .

Oczywiście, wszystkie elementy  $Pin^\pm(\mathbb{R}^n)$  są unitarne. Definiujemy też grupę  $Spin(\mathbb{R}^n)$  składającą się z parzystych elementów w  $Pin^\pm(\mathbb{R}^n)$ .

Jeśli  $U \in Spin(\mathbb{R}^n)$ , to istnieje  $R_U \in SO(\mathbb{R}^n)$  taki, że

$$U\phi(y)U^* = \phi(R_U y),$$

Jeśli  $U \in Pin^\pm(\mathbb{R}^n) \setminus Spin(\mathbb{R}^n)$ , to istnieje  $R_U \in O(\mathbb{R}^n) \setminus SO(\mathbb{R}^n)$  taki, że

$$U\phi(y)U^* = -\phi(R_U y).$$

Mamy równoważną definicję  $Pin^\pm(\mathbb{R}^n)$ : jest to zbiór elementów unitarnych w  $Cl^\pm(\mathbb{R}^n)$  takich, że

$$\{U\phi(v)U^* : v \in \mathbb{R}^n\} = \{\phi(v) : v \in \mathbb{R}^n\}.$$

Zauważmy, że  $R_U = R_{-U}$ .  $U \mapsto R_U$  definiują dwukrotne nakrycia:

$$\begin{aligned} 1 \rightarrow \mathbb{Z}_2 \rightarrow Spin(\mathbb{R}^n) \rightarrow SO(\mathbb{R}^n) \rightarrow 1, \\ 1 \rightarrow \mathbb{Z}_2 \rightarrow Pin^\pm(\mathbb{R}^n) \rightarrow O(\mathbb{R}^n) \rightarrow 1. \end{aligned}$$

## 12.9 Koïncydencje niskowymiarowe

W niskich wymiarach mamy koïcydencje:

$$\begin{aligned} Spin(\mathbb{R}^2) &\simeq SO(\mathbb{R}^2), \\ Spin(\mathbb{R}^3) &\simeq SU(\mathbb{C}^2), \\ Spin(\mathbb{R}^4) &\simeq SU(\mathbb{C}^2) \times SU(\mathbb{C}^2), \\ Spin(\mathbb{R}^5) &\simeq SU(\mathbb{H}^2), \\ Spin(\mathbb{R}^6) &\simeq SU(\mathbb{C}^4). \end{aligned}$$

Pokażmy drugą koïcydencję.

$$Spin(\mathbb{R}^3) = \{a_0 \mathbb{1} + a_1 \phi_2 \phi_3 + a_2 \phi_3 \phi_1 + a_3 \phi_1 \phi_2 : a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = 1\}, \quad (12.103)$$

$$SU(2) = \{a_0 \mathbb{1} + a_1 \sigma_1 + a_2 \sigma_2 + a_3 \sigma_3 : a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 = 1\}. \quad (12.104)$$

Niech

$$U(Cl_0(\mathbb{R}^n)) := \{A \in Cl_0(\mathbb{R}^n) : A^* A = \mathbb{1}\}.$$

Zauważmy, że

$$Spin(\mathbb{R}^n) = U(Cl_0(\mathbb{R}^n)), \quad n = 1, 2, 3, 4, 5, 6 \quad (12.105)$$

$$Spin(\mathbb{R}^n) \subsetneq U(Cl_0(\mathbb{R}^n)), \quad n \geq 6. \quad (12.106)$$

Aby to zobaczyć, wystarczy zauważyć, że inkluzja  $\subset$  w (12.105) jest oczywista. Następnie należy policzyć wymiary. W tym celu przypomnijmy sobie:

$$\dim SO(n) = \frac{n(n-1)}{2}, \quad (12.107)$$

$$\dim SU(\mathbb{C}^n) = (n+1)(n-1), \quad U(\mathbb{C}^n) = n^2, \quad (12.108)$$

$$\dim SU(\mathbb{H}^n) = n(2n+1). \quad (12.109)$$

Dostajemy (drobne oszustwo!)

$n$	$\dim SO(n) = \dim Spin(n)$	$\dim U(Cl_0(\mathbb{R}^n))$
1	0	$0 = \dim O(1)$
2	1	$1 = \dim U(1),$
3	3	$3 = \dim SU(\mathbb{H}) = \dim SU(2),$
4	6	$6 = \dim SU(\mathbb{H}) \times SU(\mathbb{H}) = \dim SU(2) \times SU(2),$
5	10	$10 = \dim SU(\mathbb{H}^2),$
6	15	$15 = \dim SU(4),$
7	21	$28 = \dim O(8).$

## 12.10 Reprezentacje grupy $Spin(n)$

Grupa  $Spin(2m)$  ma reprezentację w przestrzeni  $\Gamma_a(\mathbb{C}^m)$ . Jest ona przywiedlna – rozkłada się na reprezentację o parzystej liczbie “cząstek” i reprezentację o nieparzystej liczbie. Te reprezentacje są już nieprzywiedlne.

Grupa  $Spin(2m+1)$  ma reprezentację nieprzywiedlną w  $\Gamma_a(\mathbb{C}^m)$ .

Wszystkie te reprezentacje nazywają się spinorowymi. Nie odpowiadają one reprezentacjom  $SO(n)$ .

# 13 Zastosowanie teorii grup w modelu standardowym i modelach wielkiej unifikacji

## 13.1 Model standardowy

Model standardowy oparty jest na grupie cechowania  $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ .

Oznaczmy (samosprężone) generatory  $su(2)$  przez  $T_1, T_2, T_3$ . Stanowią one generatory tzw. słabego izospinu. Samosprężony generator  $u(1)$  oznaczamy przez  $Y$ . Jest to tzw. słaby hiperładunek, nie mylić z hiperładunkiem, który ma to samo oznaczenie.

Podstawowym założeniem modelu Weinberga-Salama (który jest częścią modelu standardowego opisującą oddziaływania słabe i elektromagnetyczne) jest to, że ładunek elektryczny  $Q$  pochodzi częściowo z  $SU(2)$  a częściowo z  $U(1)$ . Wyrazić to można wzorem

$$Q = T_3 + Y. \quad (13.110)$$

(Stosujemy konwencję z podręcznika Srednicki’ego. Często zastępuje się  $Y$  przez  $2Y$ , tak by był spełniony wzór  $Q = T_3 + \frac{Y}{2}$ , analogiczny do wzoru Gell-Manna – Nishijimy).



Poza bozonami cechowania – odpowiadającymi algebrze Liego  $su(3) \oplus su(2) \oplus u(1)$  – w lagranżjanie występują naładowane cząstki odpowiadające różnym nieprzywiedlnym reprezentacjom (multipletom) grupy  $SU(3) \oplus SU(2) \oplus U(1)$ . Każda z nich posiada antycząstki posiadające odwrotną chiralność i ładunki. Można je podzielić następująco:

- (1) Multiplet (albo więcej multipletów) zespolonych skalarnych bozonów (Higgsa) służących do złamania symetrii cechowania  $SU(2) \times U(1)$ .
- (2) Kilka multipletów weylowskich (chiralnych) fermionów. Każdy multiplet występuje w 3 generacjach. Multiplety fermionów można podzielić na dwie rodziny
  - (i) Leptony, które nie uczestniczą w oddziaływaniach silnych, czyli są singletami ze względu na  $SU(3)$ .
  - (ii) Kwarki, które transformują się nietrywialnie względem  $SU(3)$ .

(Multiplet – nieprzywiedlna, na ogół wielowymiarowa reprezentacja grupy cechowania).

Istnieją dwie wersje modelu standardowego: pierwotna wersja, którą oznaczamy  $SM$ , nie zawierała neutrin prawochiralnych. W nowszej wersji, oznaczanej przez  $\nu SM$  są dodatkowo neutrina prawochiralne.

Będziemy stosowali nazewnictwo odnoszące się do pierwszej generacji.

## 13.2 Leptony

Leptony można podzielić na elektrony i neutrina. Elektrony są zarówno lewo- i prawochiralne. Mają tę samą masę. Z punktu widzenia oddziaływań e.m. i silnych można traktować je jako fermiony dirakowskie, czyli para fermion lewochiralny i prawochiralny. Oznaczone są przez  $e = (e_L, e_R)$ , Mają one  $Q = -1$ . Antycząstka dla elektronu nazywa się pozytonem i jest oznaczana przez  $\bar{e}$ .

Neutrina mają  $Q = 0$ . Neutrina elektronowe, oznaczane  $\nu_e$  lub  $\nu_{e,L}$ , w SM są lewochiralne i mają masę zerową,

$(e_L, \nu_{e,L})$  tworzą dublet ze względu na  $SU(2)$ . Mamy

$$T_3 e_L = -\frac{1}{2} e_L, \quad T_3 \nu_{e,L} = \frac{1}{2} \nu_{e,L}.$$

Korzystając z (13.110), dostajemy stąd

$$Y e_L = -\frac{1}{2} e_L, \quad Y \nu_{e,L} = -\frac{1}{2} \nu_{e,L}.$$

$e_R$  jest singletem dla  $SU(2)$ . Dlatego też (13.110) implikuje

$$Y e_R = -e_R.$$

Przy zestawianiu multipletów, wygodnie jest odwoływać się wyłącznie do multipletów lewochiralnych. Dlatego zamiast elektronu prawochiralnego bierzemy pod uwagę pozyton lewochiralny. Ma on  $Q = 1$  i  $T_3 = 0$ . Oto jego hiperładunek:

$$Y \bar{e}_R = \bar{e}_R.$$

W  $\nu SM$  wprowadza się dodatkowe neutrino prawochiralne  $\nu_{e,R}$ , które transformują się trywialnie ze względu na grupę cechowania. Przy zestawianiu multipletów bierzemy pod uwagę jego antycząstkę  $\bar{\nu}_{e,R}$ , która jest lewochiralna.

Reasumując, mamy następujące multiplety lewochiralnych leptonów:

$$\begin{aligned} L &:= (e_L, \nu_{e,L}) \quad (1, 2, -\frac{1}{2}), \\ \bar{E} &:= \bar{e}_R \quad (1, 1, 1), \\ \bar{N} &:= \bar{\nu}_{e,R} \quad (1, 1, 0). \end{aligned}$$

### 13.3 Skalar Higgsa

Aby zbudować niezmiennicze człony masowe w lagranżjanie potrzebujemy dodatkowego skalaru,  $\phi$ , który jest singletem dla  $SU(3)$ , dubletem dla  $SU(2)$  i ma  $Q = 0$ . Zatem  $Y = -\frac{1}{2}$ . Czyli jego reprezentacja to

$$(1, 2, -\frac{1}{2}).$$

### 13.4 Kwarki

Mamy dwa kwarki,  $u$  i  $d$ . Na przykład, proton i neutron są zbudowane następująco:

$$p = uud, \quad n = udd.$$

Oto ich ładunek elektryczny:

$$Qu = \frac{2}{3}u, \quad Qd = -\frac{1}{3}d.$$

Są one trypletami ze względu na  $SU(3)$  – transformują się wzgl. reprezentacji fundamentalnej.

Mamy też antykwarki:

$$Q\bar{u} = -\frac{2}{3}\bar{u}, \quad Q\bar{d} = \frac{1}{3}\bar{d}.$$

Transformują się wzgl. reprezentacji antyfundamentalnej.

Lewochiralne kwarki są dubletem ze wzgl. na  $SU(2)$ :

$$T_3 u_L = \frac{1}{2}u_L, \quad T_3 d_L = -\frac{1}{2}d_L.$$

Stąd

$$Y u_L = \frac{1}{6}u_L, \quad Y d_L = \frac{1}{6}d_L.$$

Prawochiralne kwarki są singletami dla  $SU(2)$ . Dla nich

$$T_3 u_R = 0, \quad T_3 d_R = 0.$$

Stąd

$$Y u_R = \frac{2}{3}u_R, \quad Y d_R = -\frac{1}{3}d_R.$$

Reasumując, mamy następujące multiplety lewochiralnych kwarków:

$$\begin{aligned} Q &= (u_L, d_L) & (3, 2, \frac{1}{6}), \\ \bar{U} &= \bar{u}_R & (\bar{3}, 1, -\frac{2}{3}), \\ \bar{D} &= \bar{d}_R & (\bar{3}, 1, \frac{1}{3}). \end{aligned}$$

### 13.5 Lagranżjan modelu standardowego

Lagranżjan modelu standardowego jest singletem ze względu na grupę cechowania. Można wyróżnić w nim następujące człony:

- (1) Człon kinetyczny dla pól cechowania.
- (2) Człony kinetyczne dla fermionów.
- (3) Człon kinetyczny dla bozonów skalarnych.
- (4) Potencjał dla bozonów skalarnych (“kapelusze meksykański”?) – ze względu na renormalizowalność powinien to być wielomian maksymalnie 4 stopnia. Zakładamy, że jest niezmienniczy przy zamianie  $\phi$  na  $-\phi$ .
- (5) Wyrazy masowe – wyrazy 2-liniowe w fermionach. Muszą być singletami ze względu na grupę cechowania, i dlatego z reguły mnożone są przez bozon skalarny.

Niech  $\psi, \psi'$  transformują się zgodnie z reprezentacją fundamentalną SU(3). Wtedy niezmiennicze dwuliniowe wyrażenia zbudowane z  $\psi, \psi'$  są postaci

$$\bar{\psi}^\alpha \psi'_\alpha$$

i wyrażenia sprzężone.

Niech  $\psi, \psi'$  transformują się zgodnie z reprezentacją fundamentalną SU(2). Wtedy niezmiennicze dwuliniowe wyrażenia zbudowane z  $\psi, \psi'$  są postaci

$$\begin{aligned} \bar{\psi}^i \psi'_i, \\ \epsilon^{ij} \psi_i \psi'_j, \end{aligned}$$

i wyrażenia sprzężone.

Jeśli mamy  $\psi_1, \dots, \psi_n$  mające ładunki  $y_1, \dots, y_n$  ze względu na  $U(1)$ , to  $\psi_1 \cdots \psi_n$  jest niezmiennicze jeśli  $y_1 + \dots + y_n = 0$ . Dlatego też mamy następujące możliwe wyrazy niekinetyczne w lagranżjanie  $\nu$  SM (uwzględniamy jedynie fermiony lewochiralne)

$$\bar{\phi}_i \phi^i, \quad (\bar{\phi}_i \phi^i)^2, \tag{13.111}$$

$$\epsilon^{ij} \phi_i \bar{E} L_j, \quad \epsilon^{ij} \phi_i \bar{D}^\alpha Q_{\alpha j}, \quad \bar{\phi}^i \bar{U}^\alpha Q_{\alpha i}, \tag{13.112}$$

$$\bar{\phi}^i L_i \bar{N}, \quad \bar{N} C \bar{N}. \tag{13.113}$$

Fermiony prawochiralne występują w wyrażeniach sprzężonych do (13.112) i (13.113).  $\alpha$  przebiega indeks kolorowy,  $i, j$  przebiegają indeksy 1, 2.  $C$  jest macierzą sprzężenia ładunkowego. W SM tylko (13.111) i (13.112) są możliwe.

### 13.6 $SU(n)$

$SU(n)$  ma reprezentację fundamentalną  $\mathbb{C}^n$  i antyfundamentalną  $\overline{\mathbb{C}}^n$ . Wśród reprezentacji nieprzywiedlnych są

$$\otimes_s^p \mathbb{C}^n, \quad p = 1, 2, \dots, \quad \dim \otimes_s^n \mathbb{C}^d = \frac{(d+n-1)!}{(d-1)!n!}.$$

$$\otimes_a^q \mathbb{C}^n, \quad q = 1, \dots, n-1, \quad \dim \otimes_a^n \mathbb{C}^d = \frac{n!}{d!(n-d)!}.$$

Mamy

$$\begin{aligned} \otimes_a^q \mathbb{C}^n &\simeq \otimes_a^{n-q} \overline{\mathbb{C}}^n. \\ \otimes^2 \mathcal{Z} &= \otimes_s^2 \mathcal{Z} \oplus \otimes_a^2 \mathcal{Z}. \end{aligned}$$

A oto użyteczne relacje dla dowolnych dwóch przestrzeni  $\mathcal{Z}, \mathcal{W}$ :

$$\otimes_{s/a}^p (\mathcal{Z} \oplus \mathcal{W}) \simeq \bigoplus_{j=0}^p \otimes_{s/a}^j \mathcal{Z} \oplus \otimes_{s/a}^{p-j} \mathcal{W}.$$

### 13.7 Rozszerzanie $SU(3) \otimes SU(2) \times U(1)$ do $SU(5)$

Poniższa analiza jest oparta częściowo na książce Srednicki'ego i artykule Baez-Huerta.

Mamy inkluzję

$$su(5) \supset su(3) \oplus su(2) \oplus u(1),$$

gdzie generator  $u(1)$  ma postać

$$Y = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & & & & \\ & -\frac{1}{3} & & & \\ & & -\frac{1}{3} & & \\ & & & \frac{1}{2} & \\ & & & & \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

Fundamentalną reprezentację  $SU(5)$  rozkłada się następująco:

$$5 \rightarrow (3, 1, -\frac{1}{3}) \oplus (1, 2, \frac{1}{2}).$$

Stąd,

$$\otimes_a^4 5 = \overline{5} \rightarrow (\overline{3}, 1, \frac{1}{3}) \oplus (1, 2, -\frac{1}{2}). \quad (13.114)$$

Względem  $SU(5)$ , mamy  $\otimes_a^2 5 = 10$ . Względem  $SU(3)$  mamy  $\otimes_a^2 3 = \overline{3}$ . Zatem

$$\begin{aligned} 10 &= \otimes_a^2 5 \rightarrow \otimes_a^2 (3, 1, -\frac{1}{3}) \oplus (3, 1, -\frac{1}{3}) \otimes (1, 2, \frac{1}{2}) \oplus \otimes_a^2 (1, 2, \frac{1}{2}) \\ &= (\overline{3}, 1, -\frac{2}{3}) \oplus (3, 2, \frac{1}{6}) \oplus (1, 1, 1). \end{aligned} \quad (13.115)$$

Wszystkie multiplety lewochiralne SM względem  $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$  znajdziemy w następujących dwóch multipletach względem  $SU(5)$ : (13.114) i (13.115).

### 13.8 Pola w GUT opartej na $SU(5)$

W GUT opartym na  $SU(5)$ , bez prawoskrętnego neutrina, poza bozonami cechowania parametryzowanymi przez  $su(5)$ , mamy następujące pola:

(1) Zespolone bozony skalarne

(1) Bozon  $\Phi$  w reprezentacji dołączonej odpowiedzialny za łamanie  $SU(5)$  do  $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ . Sprzęga się tylko do bozonów cechowania i  $\phi$ .

(2) Bozon  $\phi$  w reprezentacji fundamentalnej odpowiedzialny za łamanie  $SU(2) \times U(1)$  do  $U(1)$ .

(3) Weylowskie lewochiralne fermiony

(1) Multiplet  $\psi = (L, \bar{D}) = (e_L, \nu_L, \bar{d}_R)$  w reprezentacji  $\bar{5}$  (antyfundamentanej).

(2) Multiplet  $\chi = (\bar{E}, Q, \bar{U}) = (\bar{e}_R, u_L, d_L, \bar{u}_R)$  w reprezentacji 10 (antysymetrycznej).

Możliwe wyrazy niekinetyczne w lagranżjanie:

$$\begin{aligned} & \text{Tr}\Phi^2, \text{Tr}\Phi^4, (\text{Tr}\Phi)^2, \\ & \bar{\phi} \cdot \phi, (\bar{\phi} \cdot \phi)^2, \bar{\phi} \cdot \Phi^2 \phi, \\ & \phi^i \psi^j \chi_{ij}, \epsilon^{ijklm} \bar{\phi}_i \chi_{jk} \chi_{lm}. \end{aligned}$$

Jeśli chcemy, żeby neutrina miały masę, musimy dodać pole  $\nu_R$  będące singletem dla  $SU(5)$  i wyraz

$$\bar{\phi}_i \psi^i \bar{\nu}_R.$$

### 13.9 Rozszerzanie $SU(3) \otimes SU(2) \times U(1)$ do $Spin(10)$

Wszystkie multiplety lewochiralne SM względem  $SU(3) \times SU(2) \times U(1)$  znajdziemy w następujących dwóch multipletach względem  $SU(5)$ :  $\otimes_a^4 5$  (13.114) i  $\otimes_a^2 5$  (13.115). Żeby dostać antycząstki wystarczy dodać  $\otimes_a^1 5$  i  $\otimes_a^3 5$ . Aby dodać neutrina prawochiralne i ich antycząstki wystarczy dołączyć  $\otimes_a^0 5$  i  $\otimes_a^5 5$ . Dostajemy przestrzeń  $\Gamma_a(\mathbb{C}^5)$ . Przestrzeń ta rozkłada się na dwie nieprzywiedlne reprezentacje  $Spin(10)$  (dwukrotnego nakrycia  $SO(10)$ ) odpowiadające lewochiralnym i prawochiralnym cząstkom.

W poniższej liście  $c$  oznacza jeden z kolorów  $r, g, b$ , zaś  $c, c', c''$  jest jedną z cyklicznych permutacji  $r, g, b$ . Piszemy  $a_1 \cdots a_n$  zamiast  $\frac{1}{\sqrt{n!}} a_1 \wedge \cdots \wedge a_n$ .

1, L	5, R	10, L	$\bar{10}$ , R	$\bar{5}$ , L	1, R
$\bar{\nu}_R = 1$	$\bar{e}_L = u$	$\bar{e}_R = ud$	$e_R = cc'c''$	$e_L = cc'c''d$	$\nu_R = cc'c''ud$
	$\bar{\nu}_L = d$	$u_L^c = cu$	$\bar{u}_L^c = c'c''d$	$\nu_L = cc'c''u$	
	$d_R^c = c$	$d_L^c = cd$	$\bar{d}_L^c = c'c''u$	$\bar{d}_R^c = c'c''ud$	
		$\bar{u}_R^c = c'c''$	$u_R^c = cud$		

### 13.10 Rozszerzanie $SU(3) \otimes SU(2) \times U(1)$ do $SU(2) \times SU(2) \times SU(4)$

W Teorii Pati-Salama zakładamy, że istnieje czwarty kolor “biały”, oznaczany przez  $w$  reprezentujący leptony. Grupa  $SU(4)$  działa w dwóch reprezentacjach: fundamentalnej z bazą  $r, g, b, w$  i antyfundamentalnej z bazą  $\bar{r}, \bar{g}, \bar{b}, \bar{w}$ .

“Lewa” grupa  $SU(2)$  działa na  $\mathbb{C}^2$  z bazą  $u_L, d_L$ . “Prawa” grupa  $SU(2)$  działa na  $\mathbb{C}^2$  z bazą  $u_R, d_R$ . Oznaczenia  $u$  i  $d$  odnoszą się teraz do “izospinu”. Sprzężenie ładunkowe zamienia “izospin” i chiralność. Dlatego  $\bar{u}_L = d_R, \bar{d}_L = u_R$ .

Cząstki materii (łącznie z prawym neutrinem) organizujemy w cztery reprezentacje grupy  $SU(2) \times SU(2) \times SU(4)$ :

$(2, 1, 4)$	$(1, 2, 4)$	$(2, 1, \bar{4})$	$(1, 2, \bar{4})$
$\nu_L = u_L \otimes w$	$\nu_R = u_R \otimes w$	$\bar{e}_R = u_L \otimes \bar{w}$	$\bar{e}_L = u_R \otimes \bar{w}$
$e_L = d_L \otimes w$	$e_R = d_R \otimes w$	$\bar{\nu}_R = d_L \otimes \bar{w}$	$\bar{\nu}_L = d_R \otimes \bar{w}$
$u_L^c = u_L \otimes c$	$u_R^c = u_R \otimes c$	$\bar{d}_R^c = u_L \otimes \bar{c}$	$\bar{d}_L^c = u_R \otimes \bar{c}$
$d_L^c = d_L \otimes c$	$d_R^c = d_R \otimes c$	$\bar{u}_R^c = d_L \otimes \bar{c}$	$\bar{u}_L^c = d_R \otimes \bar{c}$

Możemy przeorganizować

$$\mathbb{C}^4 \oplus \bar{\mathbb{C}}^4 \simeq \mathbb{C} \oplus \mathbb{C}^3 \oplus \mathbb{C}^3 \oplus \mathbb{C} \simeq \Gamma_a(\mathbb{C}^3),$$

używając słownika

$$\begin{aligned} w &= rgb, & \bar{w} &= 1, \\ \bar{r} &= gb, & \bar{g} &= br, & \bar{b} &= rg. \end{aligned}$$

To daje  $SU(4) \simeq Spin(6)$ .

Również mamy

$$\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C} \oplus \mathbb{C} \otimes \mathbb{C}^2 \simeq \mathbb{C} \oplus \mathbb{C}^2 \oplus \mathbb{C} \simeq \Gamma_a(\mathbb{C}^2).$$

To daje  $SU(2) \times SU(2) \simeq Spin(4)$ . Zatem grupa  $SU(2) \times SU(2) \times SU(4)$  to to samo co grupa  $Spin(4) \times Spin(6)$ . Oczywiście,  $Spin(4) \times Spin(6)/\mathbb{Z}_2$  jest podgrupą  $Spin(10)$ .

## 14 Struktura algebr Liego

### 14.1 Nilpotentne i rozwiązalne algebry Liego

Niższą serią centralną nazywamy podalgebry  $\mathcal{D}_k \mathfrak{g}$  zdefiniowane indukcyjnie

$$\mathcal{D}_1 \mathfrak{g} := [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}], \quad \mathcal{D}_k \mathfrak{g} := [\mathfrak{g}, \mathcal{D}_{k-1} \mathfrak{g}].$$

Serią pochodną nazywamy podalgebry

$$\mathcal{D}^1 \mathfrak{g} := [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}], \quad \mathcal{D}^k \mathfrak{g} := [\mathcal{D}^{k-1} \mathfrak{g}, \mathcal{D}^{k-1} \mathfrak{g}].$$

$[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] = \mathcal{D} \mathfrak{g} = \mathcal{D}_1 \mathfrak{g} = \mathcal{D}^1 \mathfrak{g}$  nazywamy pochodną algebry  $\mathfrak{g}$ .

Na przykład,  $Dt(\mathbb{K}^n) = n(\mathbb{K}^n)$ .

**Twierdzenie 14.1**  $\mathcal{D}^k \mathfrak{g}$  i  $\mathcal{D}_k \mathfrak{g}$  są ideałami charakterystycznymi w  $\mathfrak{g}$ . Jeśli  $\phi : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{h}$  jest homomorfizmem, to  $\phi(\mathcal{D}^k \mathfrak{g}) = \mathcal{D}^k \phi(\mathfrak{g})$ ,  $\phi(\mathcal{D}_k \mathfrak{g}) = \mathcal{D}_k \phi(\mathfrak{g})$ .

**Stwierdzenie 14.2** (1) Jeśli  $\mathfrak{a}$  jest ideałem w  $\mathfrak{g}$  i  $\mathfrak{g}/\mathfrak{a}$  jest przemienna, to  $\mathfrak{a} \supset [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ .

(2) Jeśli  $\mathfrak{a}$  jest przestrzenią liniową taką, że  $\mathfrak{g} \supset \mathfrak{a} \supset [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ , to  $\mathfrak{a}$  jest ideałem i  $\mathfrak{g}/\mathfrak{a}$  jest przemienna.

**Dowód.** (1): Jeśli  $A + \mathfrak{a}, B + \mathfrak{a} \in \mathfrak{g}/\mathfrak{a}$ , to  $[A + \mathfrak{a}, B + \mathfrak{a}] = \mathfrak{a}$  oznacza  $[A, B] \in \mathfrak{a}$ . Więc  $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] \subset \mathfrak{a}$ .

(2) wynika z  $[\mathfrak{a}, \mathfrak{g}] \subset [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] \subset \mathfrak{a}$  i z (1).  $\square$

Mówimy, że algebra  $\mathfrak{g}$  jest *nilpotentna*, jeśli  $\mathcal{D}_k \mathfrak{g} = \{0\}$  dla pewnego  $k$  i *rozwiązalna*, jeśli  $\mathcal{D}^k \mathfrak{g} = \{0\}$  dla pewnego  $k$ . Mówimy, że  $\mathfrak{g}$  jest *półprosta*, jeśli nie ma rozwiązalnych ideałów.

**Stwierdzenie 14.3** (1)  $\mathfrak{h}$  jest rozwiązalna  $\Leftrightarrow \mathbb{C}\mathfrak{h}$  jest rozwiązalna.

(2)  $\mathfrak{h}$  jest nilpotentna  $\Leftrightarrow \mathbb{C}\mathfrak{h}$  jest nilpotentna.

(3)  $\mathfrak{h}$  jest półprosta  $\Leftrightarrow \mathbb{C}\mathfrak{h}$  jest półprosta.

**Dowód.** 5)  $\Leftarrow$ . Niech  $\mathfrak{a}$  będzie niezerowym ideałem rozwiązalnym w  $\mathbb{C}\mathfrak{h}$ . Wtedy  $\bar{\mathfrak{a}}$  też. Również  $\mathfrak{b} := \mathfrak{a} + \bar{\mathfrak{a}}$  jest rozwiązalny. Wtedy  $\mathbb{C}(\mathfrak{b} \cap \mathfrak{h}) = \mathfrak{b}$ .  $\mathfrak{b} \cap \mathfrak{h}$  jest niezerowym ideałem rozwiązalnym w  $\mathfrak{h}$ .  $\square$

Algebra  $\mathfrak{n}(\mathbb{K}^n)$  ściśle górnótrójkątnych macierzy jest nilpotentna, jak również każda jej podalgebra. Można pokazać, że każda algebra nilpotentna jest izomorficzna do podalgebry  $\mathfrak{n}(\mathbb{K}^n)$ .

**Twierdzenie 14.4** (1) Każda podalgebra, obraz homomorficzny, suma prosta algebr nilpotentnych jest nilpotentna.

(2) Niech  $\mathfrak{a}$  będzie podprzestrzenią w  $\mathfrak{z}(\mathfrak{g})$  (a więc ideałem w  $\mathfrak{g}$ ). Jeśli  $\mathfrak{g}/\mathfrak{a}$  jest nilpotentna, to  $\mathfrak{g}$  też.

(3)  $\mathfrak{g}$  jest nilpotentna  $\Leftrightarrow \text{ad}(\mathfrak{g})$  jest nilpotentna.

**Dowód.** (2) Wiemy, że dla pewnego  $n$ ,  $\mathcal{D}_n(\mathfrak{g}/\mathfrak{a}) = \{0\}$ . Z tego wynika, że  $\mathcal{D}_n \mathfrak{g} \subset \mathfrak{a}$ . Zatem  $\mathcal{D}_{n+1} \mathfrak{g} = \{0\}$ .

(3)  $\Rightarrow$  jest oczywiste. By pokazać  $\Leftarrow$  zauważmy, że  $\text{ad}(\mathfrak{g}) = \mathfrak{g}/\mathfrak{z}(\mathfrak{g})$  i zastosujemy (2).  $\square$

Algebra  $t(\mathbb{K}^n)$  górnótrójkątnych macierzy jest rozwiązalna jak również każda jej podalgebra. Można pokazać, że każda algebra rozwiązalna jest izomorficzna do podalgebry  $t(\mathbb{K}^n)$ . Każda reprezentacja algebry rozwiązalnej na przestrzeni  $\mathcal{V}$  ma obraz izomorficzny do podalgebry w  $t(\mathcal{V})$ .

**Twierdzenie 14.5** (1) Każda podalgebra, obraz homomorficzny, suma prosta algebr rozwiązalnych jest rozwiązalny.

(2) Niech  $\mathfrak{a}$  będzie ideałem w  $\mathfrak{g}$ . Jeśli  $\mathfrak{a}$  i  $\mathfrak{g}/\mathfrak{a}$  są rozwiązalne, to  $\mathfrak{g}$  też.

(3)  $\mathfrak{g}$  jest rozwiązalna  $\Leftrightarrow \text{ad}(\mathfrak{g})$  jest rozwiązalna.

**Dowód.** (2) Niech  $\pi : \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}/\mathfrak{a}$  będzie kanonicznym homomorfizmem.

Niech  $\mathcal{D}^n(\mathfrak{g}/\mathfrak{a}) = 0$ . Mamy  $\pi(\mathcal{D}^n \mathfrak{g}) \subset \mathcal{D}^n(\mathfrak{g}/\mathfrak{a})$ . Zatem  $\mathcal{D}^n(\mathfrak{g}) \subset \ker \pi = \mathfrak{a}$ .

Niech  $\mathcal{D}^k \mathfrak{a} = \{0\}$ . Wtedy  $\mathcal{D}^{k+n} \mathfrak{g} = \mathcal{D}^k \mathcal{D}^n \mathfrak{g} \subset \mathcal{D}^k \mathfrak{a} = \{0\}$ .

(2) implikuje (3).  $\square$

W twierdzeniu tym nie można zamienić “rozwiązalny” przez “nilpotentny”, co pokazuje przykład  $0 \rightarrow n(\mathbb{K}^n) \rightarrow t(\mathbb{K}^n) \rightarrow d(\mathbb{K}^n) \rightarrow 0$ .

**Twierdzenie 14.6** *Niech  $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$  będą ideałami w  $\mathfrak{g}$ .*

(1) *Jeśli  $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$  są rozwiązalne, to  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$  też.*

(2) *Jeśli  $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$  są nilpotentne, to  $\mathfrak{a} + \mathfrak{b}$  też.*

**Dowód.** (1) Z rozwiązalności  $\mathfrak{a}$  wynika rozwiązalność  $\mathfrak{a}/(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b})$ . Mamy  $(\mathfrak{a} + \mathfrak{b})/\mathfrak{b} \simeq \mathfrak{a}/(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b})$ , zatem  $(\mathfrak{a} + \mathfrak{b})/\mathfrak{b}$  jest rozwiązalna. W ciągu dokładnym  $0 \rightarrow \mathfrak{b} \rightarrow \mathfrak{a} + \mathfrak{b} \rightarrow (\mathfrak{a} + \mathfrak{b})/\mathfrak{b}$  wyrazy brzegowe są rozwiązalne, więc wyraz środkowy też.

(2) Rozważmy  $A_i, i = 1, \dots, 2k + 1$ , z których każdy należy do  $\mathfrak{a}$  lub  $\mathfrak{b}$ . Pokażemy, że

$$[A_1 \cdot [A_2, \dots [A_{2k}, A_{2k+1}] \dots]]$$

należy do  $\mathcal{D}_k \mathfrak{a}$  lub  $\mathcal{D}_k \mathfrak{b}$ .

Rzeczywiście, wtedy co najmniej  $k + 1$  wyrazów należy do  $\mathfrak{a}$  lub  $\mathfrak{b}$ . Załóżmy, że do  $\mathfrak{a}$ . Korzystamy następnie z tego, że  $\mathcal{D}_j \mathfrak{a}$  jest ideałem charakterystycznym w  $\mathfrak{a}$ .

Zatem, jeśli  $\mathcal{D}_k \mathfrak{a} = \mathcal{D}_k \mathfrak{b} = \{0\}$ , to  $\mathcal{D}_{2k+1}(\mathfrak{a} + \mathfrak{b}) = \{0\}$ .  $\square$

Zatem w każdej alebrze Liego istnieje największy ideał rozwiązalny, zwany *radykałem*, i największy ideał nilpotentny.

## 14.2 Twierdzenie Liego

**Twierdzenie 14.7 (Liego)** *Niech  $\mathcal{V}$  będzie przestrzenią zespoloną a  $\mathfrak{g} \subset gl(\mathcal{V})$  będzie rozwiązalną algebrą Liego. Wtedy istnieje  $\alpha \in \mathfrak{g}^\#$  taki, że*

$$\mathcal{V}_\alpha(\mathfrak{g}) := \bigcap_{A \in \mathfrak{g}} \text{Ker}(A - \alpha(A)) \neq \{0\}. \quad (14.116)$$

Przestrzeń  $\mathcal{V}_\alpha(\mathfrak{g})$  nazwiemy *przestrzenią własną algebry  $\mathfrak{g}$  dla pierwiastka  $\alpha$* .  $\alpha \in \mathfrak{g}^\#$  dla którego ta przestrzeń jest niezerowa nazywamy *pierwiastkiem algebry  $\mathfrak{g}$* .

Dowód Twierdzenia Liego opiera się na następującym stwierdzeniu.

**Stwierdzenie 14.8** *Niech  $\mathcal{V}$  będzie przestrzenią zespoloną,  $\mathfrak{g} \subset gl(\mathcal{V})$  będzie algebrą Liego i  $\alpha \in \mathfrak{g}^\#$ . Niech  $B \in gl(\mathcal{V})$  spełnia*

$$[B, \mathfrak{g}] \subset \mathfrak{g}.$$

*Wtedy  $B$  zachowuje podprzestrzeń  $\mathcal{V}_\alpha(\mathfrak{g})$  zdefiniowaną w (14.116).*



**Dowód.** Niech  $x$  należy do  $\mathcal{V}_\alpha(\mathfrak{g})$  i  $x_j := B^j x$ ,  $j = 0, 1, \dots$ . Niech  $k$  będzie najmniejszą liczbą taką, że  $x_m$  jest kombinacją liniową  $x_0, \dots, x_{m-1}$ . Wykażemy, że istnieje macierz  $\alpha_{ij} \in \mathfrak{g}^\#$  taka, że  $\alpha_{ij} = 0$ ,  $i < j$ ,  $\alpha_{ii} = \alpha$  i

$$Ax_i = \sum_{j=1}^k \alpha_{ij}(A)x_j. \quad (14.117)$$

Jest to oczywiste dla  $i = 1$ . Załóżmy, że to prawda dla  $i = k$ .

$$\begin{aligned} Ax_{k+1} = ABx_k &= [A, B]x_k + BAx_k \\ &= \sum_i \alpha_{ki}([A, B])x_i + \alpha_{ki}(A)x_{i+1}. \end{aligned}$$

Czyli

$$\alpha_{k+1,i}(A) = \alpha_{k,i}([A, B]) + \alpha_{k,i-1}(A),$$

co kończy dowód (14.117).

Niech  $\mathcal{X}$  będzie przestrzenią rozpiętą przez  $x_0, \dots, x_k$ . Jest ona  $B$ -niezmiennicza i  $\mathfrak{g}$ -niezmiennicza. Macierz  $\mathfrak{g}$  obcięta do  $\mathcal{X}$  jest górnotrójkątna i na diagonalu ma  $\alpha$ . Zatem, dla  $A \in \mathfrak{g}$ ,

$$\mathrm{Tr}_{\mathcal{X}} A = k\alpha(A), \quad A \in \mathfrak{g}.$$

W szczególności,

$$0 = \mathrm{Tr}_{\mathcal{X}}[A, B] = k\alpha([A, B]).$$

Zatem  $\alpha([A, B]) = 0$ . Dlatego też,  $\alpha_{ij} = \alpha\delta_{ij}$ . Więc,

$$ABx = \alpha(A)Bx.$$

**Dowód Tw. 14.7.** Stosujemy indukcję względem  $\dim \mathfrak{g}$ . Dla  $\dim \mathfrak{g} = 1$  jest to znany fakt.

Założmy, że twierdzenie jest prawdziwe dla  $\dim \mathfrak{g} = k - 1$ . Niech  $\dim \mathfrak{g} = k$ .  $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$  jest ideałem w  $\mathfrak{g}$  kowymiaru  $j > 0$ . Dowolna podprzestrzeń  $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}] \subset \mathfrak{g}_1 \subset \mathfrak{g}$  jest ideałem. W szczególności, niech  $\mathfrak{g}_1 \oplus \mathbb{C}B = \mathfrak{g}$ . Z założenia indukcyjnego istnieje funkcjonal pierwiastkowy  $\alpha_1$  na  $\mathfrak{g}_1$ .  $\mathrm{ad}(B)$  zachowuje  $\mathfrak{g}_1$ . Zatem, ze Stw. 14.8 wynika, że  $B$  zachowuje  $\mathcal{V}_\alpha(\mathfrak{g})$ .  $B$  posiada wektor własny  $v \in \mathcal{V}_\alpha(\mathfrak{g})$ , czyli  $Bv = \mu v$ . Każdy  $A \in \mathfrak{g}$  jest postaci  $A = A_1 + tB$ ,  $A_1 \in \mathfrak{g}_1$ ,  $t \in \mathbb{K}$ . Wtedy

$$(A_1 + tB)v = (\alpha_1(A) + t\mu)v.$$

□

**Twierdzenie 14.9** Niech  $\mathcal{V}$  będzie przestrzenią zespoloną a  $\mathfrak{g} \subset \mathrm{gl}(\mathcal{V})$  będzie algebrą Liego. Wtedy następujące warunki są równoważne:

- (1)  $\mathfrak{g}$  jest rozwiązalna.
- (2) Istnieje ciąg niezmienniczych przestrzeni  $\{0\} = \mathcal{V}_0 \subset \dots \subset \mathcal{V}_n = \mathcal{V}$ ,  $\dim \mathcal{V}_j = j$ .
- (3) Istnieje baza w  $\mathcal{V}$  taka, że  $\mathfrak{g}$  jest zawarta w macierzach górnotrójkątnych.

**Dowód.** (1) $\Rightarrow$ (2) Stosujemy indukcję względem  $\dim \mathcal{V}$ . Dla  $\dim \mathcal{V} = 1$  jest to oczywiste. Niech będzie prawdziwe dla  $\dim \mathcal{V} = n$ . Niech  $\dim \mathcal{V} = n + 1$ . Na mocy Tw. Liego istnieje pierwiastek  $\alpha \in \mathfrak{g}^\#$  z wektorem własnym  $v \in \mathcal{V}$ . Przestrzeń  $\mathbb{C}v$  jest niezmiennicza. Dlatego mamy reprezentację ilorazową w  $\mathcal{V}/\mathbb{C}v$ ,  $\dim \mathcal{V}/\mathbb{C}v = n$ . Zatem istnieją przestrzenie  $\{0\} = \mathcal{W}_0 \subset \dots \subset \mathcal{W}_n = \dim \mathcal{V}/\mathbb{C}v$ ,  $\dim \mathcal{W}_j = j$  niezmiennicze względem tej reprezentacji. Niech  $\mathcal{V}_{j+1}$  będzie przeciwobrazem  $\mathcal{W}_j$  względem homomorfizmu kanonicznego.

(2) $\Rightarrow$ (3) Wybieramy bazę  $e_1, \dots, e_n$  taką, że  $\mathcal{V}_j = \text{Span}\{e_1, \dots, e_j\}$ .

(3) $\Rightarrow$ (1) Podalgebra algebry rozwiązalnej jest rozwiązalna.  $\square$

**Twierdzenie 14.10** Niech  $\mathfrak{g}$  będzie zespoloną algebrą Liego. Wtedy następujące warunki są równoważne:

(1)  $\mathfrak{g}$  jest rozwiązalna.

(2) Istnieje ciąg ideałów  $\{0\} = \mathfrak{g}_0 \subset \dots \subset \mathfrak{g}_n = \mathfrak{g}$  taki, że  $\dim \mathfrak{g}_j = j$ .

(3)  $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$  jest nilpotentna.

**Dowód.** (1) $\Rightarrow$ (2) Rozważmy reprezentację  $\text{ad} : \mathfrak{g} \rightarrow \text{gl}(\mathfrak{g})$ .  $\text{ad}(\mathfrak{g}) \subset \text{gl}(\mathfrak{g})$  jest algebrą rozwiązalną. Zatem istnieje ciąg podprzestrzeni  $\{0\} = \mathfrak{g}_0 \subset \dots \subset \mathfrak{g}_n = \mathfrak{g}$ ,  $\dim \mathfrak{g}_j = j$ , które są  $\text{ad}(\mathfrak{g})$ -niezmiennicze.  $\text{ad}(\mathfrak{g})$ -niezmienniczość oznacza bycie ideałem.

(2) $\Rightarrow$ (1) Z tego, że  $\mathfrak{g}_j/\mathfrak{g}_{j-1}$  jest 1-wymiarowa, wynika, że jest przemienna. Dlatego, ze Stw. 14.2 (1) dostajemy  $[\mathfrak{g}_j, \mathfrak{g}_j] \subset \mathfrak{g}_{j-1}$ . Stąd  $\mathcal{D}^k \mathfrak{g} \subset \mathfrak{g}_{n-k}$ .

(3) $\Rightarrow$ (1)  $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$  jest nilpotentne, więc rozwiązalna.  $\mathfrak{g}/[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$  jest przemienna więc rozwiązalna. Zatem  $\mathfrak{g}$  jest rozwiązalna.

(1) $\Rightarrow$ (3) Rozważmy  $\text{ad}(\mathfrak{g}) \subset \text{gl}(\mathfrak{g})$ . W pewnej bazie,  $\text{ad}(\mathfrak{g}) \subset t(\mathbb{C}^n)$ . Zatem  $[\text{ad}(\mathfrak{g}), \text{ad}(\mathfrak{g})] \subset n(\mathbb{C}^n)$ . Więc  $\text{ad}([\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]) = [\text{ad}(\mathfrak{g}), \text{ad}(\mathfrak{g})]$  jest nilpotentna. Czyli, z Tw. 14.5 (3) wynika, że  $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$  jest nilpotentna.  $\square$

**Stwierdzenie 14.11** Każda nietrywialna skończenie wymiarowa reprezentacja nieprzywiedlna algebry rozwiązalnej jest 1-wymiarowa.

**Dowód.** Zgodnie z Tw. Liego, każda algebra Liego działająca na skończenie wymiarowej przestrzeni posiada wektor własny.  $\square$

### 14.3 Dolny ciąg centralny

Niech  $\mathfrak{g}$  będzie algebrą Liego. Dolny ciąg centralny  $\mathcal{C}_j \mathfrak{g}$  definiujemy indukcyjnie w sposób następujący:  $\mathcal{C}_0 \mathfrak{g} = \{0\}$ . Jeśli zdefiniowaliśmy  $\mathcal{C}_{k-1} \mathfrak{g}$ ,  $\pi_{k-1} \mathfrak{g} \rightarrow \mathfrak{g}/\mathcal{C}_{k-1} \mathfrak{g}$  jest homomorfizmem kanonicznym, to

$$\mathcal{C}_k \mathfrak{g} := \pi_{k-1}^{-1}(\mathfrak{z}(\mathfrak{g}/\mathcal{C}_{k-1} \mathfrak{g})).$$

(Automatycznie,  $\mathcal{C}_k$  jest ideałem w  $\mathfrak{g}$ , jako przeciwobraz ideału względem homomorfizmu).

**Twierdzenie 14.12** Niech  $\mathfrak{g}$  będzie algebrą Liego. Następujące warunki są równoważne:

(1)  $\mathfrak{g}$  jest nilpotentna.

- (2) Istnieje ciąg ideałów  $\mathfrak{g} = \mathfrak{g}_0 \supset \dots \supset \mathfrak{g}_n = \{0\}$  takich, że  $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}_j] \subset \mathfrak{g}_{j+1}$ .  
(3) Istnieje  $m$  takie, że  $\mathcal{C}_m \mathfrak{g} = \mathfrak{g}$ .

**Dowód.** (1) $\Rightarrow$ (2) jest oczywiste, jeśli położyć  $\mathfrak{g}_j = \mathcal{D}_j \mathfrak{g}$ .

(2) $\Rightarrow$ (1). Pokazujemy indukcyjnie, że  $\mathcal{D}_j \mathfrak{g} \subset \mathfrak{g}_j$ .

(2) $\Rightarrow$ (3) Pokażemy indukcyjnie, że  $\mathfrak{g}_{m-k} \subset \mathcal{C}_k \mathfrak{g}$ . Dla  $k = 0$ ,  $\mathfrak{g}_m = \mathcal{C}_0 \mathfrak{g} = \{0\}$ .

Załóżmy, że  $\mathfrak{g}_{m-(k-1)} \subset \mathcal{C}_{k-1} \mathfrak{g}$ . Mamy

$$\begin{aligned} [\mathfrak{g}/\mathcal{C}_{k-1} \mathfrak{g}, \pi_{k-1}(\mathfrak{g}_{m-k})] &= \pi_{k-1}([\mathfrak{g}, \mathfrak{g}_{m-k}]) \\ &\subset \pi_{k-1}(\mathfrak{g}_{m-(k-1)}) \subset \pi_{k-1}(\mathcal{C}_{k-1} \mathfrak{g}) = \{0\}. \end{aligned}$$

Zatem  $\pi_{k-1}(\mathfrak{g}_{m-k}) \subset \mathfrak{z}(\mathfrak{g}/\mathcal{C}_{k-1} \mathfrak{g})$ . Więc,  $\mathfrak{g}_{m-k} \subset \mathcal{C}_k \mathfrak{g}$ .

(3) $\Rightarrow$ (2).

$$\pi_{k-1}([\mathfrak{g}, \mathcal{C}_k \mathfrak{g}]) = [\pi_{k-1}(\mathfrak{g}), \pi_{k-1}(\mathcal{C}_k \mathfrak{g})] = [\mathfrak{g}/\mathcal{C}_k \mathfrak{g}, \mathfrak{z}(\mathfrak{g}/\mathcal{C}_k \mathfrak{g})] = \{0\}.$$

Zatem  $[\mathfrak{g}, \mathcal{C}_k \mathfrak{g}] \subset \ker \pi_{k-1} = \mathcal{C}_{k-1} \mathfrak{g}$ . Stąd,

$$\mathcal{C}_m \mathfrak{g} \subset \dots \subset \mathcal{C}_0 \mathfrak{g}_0$$

spełnia warunki (2).  $\square$

## 14.4 Kryteria Cartana rozwiązalności

**Twierdzenie 14.13 (Kryterium Cartana dla formy śladowej.)** Niech  $\mathfrak{g} \subset gl(\mathcal{V})$  będzie algebrą Liego. Następujące warunki są równoważne:

- (1)  $\mathfrak{g}$  jest rozwiązalna.
- (2)  $\text{Tr} AB = 0$ ,  $A \in \mathfrak{g}$ ,  $B \in [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ .
- (3)  $\text{Tr} AB = 0$ ,  $A, B \in [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ .

**Lemat 14.14** Niech  $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{g}$  będą podprzestrzeniami w  $L(\mathcal{V})$ . Połóżmy

$$\mathfrak{b} := \{B \in L(\mathcal{V}) : \text{ad}(B)\mathfrak{g} \subset \mathfrak{a}\}.$$

Niech  $A \in \mathfrak{b}$ . Jeśli

$$\text{Tr} AB = 0, \quad B \in \mathfrak{b},$$

to  $A$  jest nilpotentny.

**Dowód.** Niech  $A = S + N$  będzie kanonicznym rozkładem na część półprostą i nilpotentną. Niech  $e_1, \dots, e_n$  będzie bazą diagonalizującą  $S$ , tak że  $Ae_j = \lambda_j e_j$ . Niech  $e^1, \dots, e^n$  będzie bazą dualną.

Niech  $\mathbb{L}$  będzie podzbiorem  $\mathbb{K}$

$$\mathbb{L} := \left\{ \sum r_j \lambda_j : r_j \in \mathbb{Q} \right\}.$$

Niech  $f : \mathbb{L} \rightarrow \mathbb{Q}$  będzie funkcją  $\mathbb{Q}$ -liniową. Zdefiniujmy  $P$  przez  $Pe_j = f(\lambda_j)e_j$ . Mamy

$$\begin{aligned} \text{ad}(S)|e_i)(e_j| &= (\lambda_i - \lambda_j)|e_i)(e_j|, \\ \text{ad}(P)|e_i)(e_j| &= (f(\lambda_i) - f(\lambda_j))|e_i)(e_j| = f(\lambda_i - \lambda_j)|e_i)(e_j|. \end{aligned}$$

Zatem  $\text{ad}(P) = f(\text{ad}(S))$ . Można dobrać wielomian  $p$  o wolnym wyrazie zero taki, że  $f(\lambda_i - \lambda_j) = p(\lambda_i - \lambda_j)$ . Wtedy  $\text{ad}(P) = p(\text{ad}(S))$ . Ze Stw. 15.8 wynika, że  $\text{ad}(S)$  jako część półprosta  $\text{ad}(A)$  jest też wielomianem (bez wyrazu wolnego) od  $\text{ad}(A)$ , tj.  $\text{ad}(S) = s(\text{ad}(A))$ . Ostatecznie,  $\text{ad}(P) = s(p(\text{ad}(S))) = t(\text{ad}(A))$ , gdzie  $t$  jest wielomianem bez wyrazu wolnego. Z tego, że  $\text{ad}(A)\mathfrak{g} \subset \mathfrak{a}$  wynika, że  $t(\text{ad}(A))\mathfrak{g} \subset \mathfrak{a}$ . Zatem  $P \in \mathfrak{b}$ . Wiąć  $P$  taki, że  $Pe_j = \bar{\lambda}_j e_j$  należy do  $\mathfrak{b}$ . Dlatego,

$$0 = \text{Tr}AP = \sum_{j=1}^n f(\lambda_j)\lambda_j. \quad (14.118)$$

Prawa strona (14.118) należy do  $\mathbb{L}$ , można więc na nią zadziałać funkcją  $f$ . Dostajemy

$$0 = \sum_{j=1}^n f(\lambda_j)^2.$$

Zatem  $f(\lambda_1) = \dots = f(\lambda_n) = 0$  (bo  $f(\lambda_j) \in \mathbb{Q}$ ). Wiąć  $\lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$ .  $\square$

**Dowód Tw. 14.13.** (1) $\Rightarrow$ (2) wynika z faktu, że znajdziemy bazę, w której  $\mathfrak{g}$  są górnotrójkątne. (2) $\Rightarrow$ (1). Niech

$$\mathfrak{n} := \{C \in L(\mathcal{V}) : [C, \mathfrak{g}] \subset [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]\}.$$

Wtedy  $\mathfrak{g} \subset \mathfrak{n}$ . Wiąć dla  $A, B \in \mathfrak{g}, C \in \mathfrak{n}$ ,

$$\text{Tr}[A, B]C = \text{Tr}A[B, C] = 0.$$

Zatem

$$\text{Tr}DC = 0, \quad D \in [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}], \quad C \in \mathfrak{n}.$$

Na podstawie Lematu 14.14, z (2) wynika, że wszystkie elementy  $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$  są nilpotentne. Zatem  $\mathfrak{g}$  jest rozwiązalna.

(2) $\Rightarrow$ (3) jest oczywiste.

(3) $\Rightarrow$ (2). Na mocy (2) $\Rightarrow$ (1),  $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$  jest rozwiązalna. Ale  $\mathfrak{g}/[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$  jest przemienna, więc rozwiązalna. Zatem  $\mathfrak{g}$  jest rozwiązalna.  $\square$

**Twierdzenie 14.15 (Kryterium Cartana dla formy Killinga.)** Niech  $\mathfrak{g} \subset gl(\mathcal{V})$  będzie algebrą Liego. Następujące warunki są równoważne:

- (1)  $\mathfrak{g}$  jest rozwiązalna.
- (2)  $\langle A|B \rangle_{\text{ad}} = 0, A \in \mathfrak{g}, B \in [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ .
- (3)  $\langle A|B \rangle_{\text{ad}} = 0, A, B \in [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ .

**Dowód.** (1) $\Rightarrow$ (2).  $\text{ad}(\mathfrak{g}) \subset \text{gl}(\mathfrak{g})$  jest rozwiązalną algebrą Liego. Możemy zatem do niej zastosować Tw. 14.13 (1) $\Rightarrow$ (2).

(2) $\Rightarrow$ (1). Z Tw. 14.13 (2) $\Rightarrow$ (1) wynika, że  $\text{ad}(\mathfrak{g})$  jest rozwiązalna. Ale to jest równoważne temu, że  $\mathfrak{g}$  jest rozwiązalna.

(2) $\Rightarrow$ (3) jest oczywiste.

(3) $\Rightarrow$ (2). Z tego, że  $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$  jest ideałem w  $\mathfrak{g}$  wynika, że forma Killinga dla  $\mathfrak{g}$  obcięta do  $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$  pokrywa się z formą Killinga dla  $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ . Zatem możemy zastosować (2) $\Rightarrow$ (1) do  $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$  i wnioskować, że  $[\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$  jest rozwiązalna. Następnie powtarzamy argument, który używaliśmy w dowodzie Tw. 14.13, który implikuje rozwiązalność  $\mathfrak{g}$ .  $\square$

**Dowód Tw. 2.10 (1) $\Rightarrow$ (2):** Niech  $\mathfrak{g}$  będzie półprosta. Rozważmy  $\mathfrak{g}^\perp$  (względem formy Killinga). Wtedy  $\mathfrak{g}^\perp$  jest ideałem dla którego forma Killinga jest równa 0. Zatem z Kryterium Cartana dla formy Killinga (Tw. 14.15)  $\mathfrak{g}^\perp$  jest rozwiązalny. Z półprostoty  $\mathfrak{g}^\perp = \{0\}$ . Zatem forma Killinga jest niezdegenerowana.  $\square$

**Dowód Tw. 2.12:** Dowód analogiczny jak powyżej, z tą różnicą, że z Kryterium Cartana dla formy śladowej Tw. 14.13.  $\square$

Rozważmy przemienną algebrę  $\mathbb{K}^n$  z bazą  $e_1, \dots, e_n$ . Dowolny operator  $P \in L(\mathbb{K}^n)$  definiuje różniczkowanie na  $\mathbb{K}^n$ . Dlatego  $\mathbb{R} \ni t \mapsto tP \in \text{Der}(\mathbb{K}^n)$  jest homomorfizmem algebr Liego. Niech  $f = 1 \in \mathbb{R}$  będzie bazą w  $\mathbb{R}$ . Rozważmy algebrę Liego  $\mathfrak{g} := \mathbb{K}^n \rtimes_P \mathbb{K}$ . Mamy

$$[e_i, f] = Pe_i, \quad [e_i, e_j] = 0, \quad [f, f] = 0.$$

Forma Killinga ma jedyny niezerowy wyraz dla

$$\langle f|f \rangle = \text{Tr}P^2.$$

Aby to pokazać, liczymy

$$\text{ad}(f) = - \begin{bmatrix} P & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \text{ad}(e_i) = - \begin{bmatrix} 0 & Pe_i \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Oczywiście,  $\mathcal{D}(\mathfrak{g}) = P\mathbb{K}^n$ , która jest przemienna. Zatem algebra jest rozwiązalna.

Poza tym, łatwo sprawdzamy, że  $\mathcal{D}_m(\mathfrak{g}) = P^m\mathbb{K}^n$ . Dlatego  $\mathfrak{g}$  jest nilpotentna wtedy i tylko wtedy gdy  $P$  jest nilpotentny.

## 14.5 Algebry półproste i reduktywne a algebry rozwiązalne

Przypomnijmy, że algebra Liego  $\mathfrak{g}$  jest półprosta gdy nie posiada niezerowych ideałów przemiennych, a jest *reduktywna* gdy jest sumą prostą półprostą i przemiennej algebry Liego.

**Twierdzenie 14.16** *Niech  $\mathfrak{g}$  będzie algebrą Liego. Następujące warunki są równoważne:*

- (1)  $\mathfrak{g}$  jest algebrą półprostą.
- (2)  $\mathfrak{g}$  nie posiada niezerowych ideałów rozwiązalnych.
- (3) Radykał algebry  $\mathfrak{g}$  jest równy  $\{0\}$ .

**Dowód.** (2) $\Rightarrow$ (1) jest oczywiste

(1) $\Rightarrow$ (2). Niech  $\mathfrak{a}$  będzie niezerowym ideałem rozwiązalnym. Wtedy istnieje  $k$  takie, że  $\mathcal{D}^{k-1}\mathfrak{a} \neq \{0\}$  i  $\mathcal{D}^k\mathfrak{a} = \{0\}$ .  $\mathcal{D}^{k-1}\mathfrak{a}$  jest więc przemienne. Poza tym, jest to ideał charakterystyczny w  $\mathfrak{a}$ . Zatem jest to ideał w  $\mathfrak{g}$ .

(2) $\Rightarrow$ (3) Radykał jest ideałem rozwiązalnym.

(3) $\Rightarrow$ (1) Załóżmy, że  $\mathfrak{a}$  jest niezerowym ideałem przemianym. Radykał zawiera  $\mathfrak{a}$ , więc jest niezerowy.  $\square$

**Twierdzenie 14.17** Niech  $\mathfrak{g}$  będzie dowolną algebrą Liego i  $\mathfrak{r}$  jej radykałem. Wtedy istnieje podalgebra półprosta  $\mathfrak{a}$  taka, że  $\mathfrak{g} = \mathfrak{r} \rtimes \mathfrak{a}$ .

**Dowód.** Udowodnimy tylko słabszy fakt, który mówi, że  $\mathfrak{g}/\mathfrak{r}$  jest półprosta. Załóżmy, że tak nie jest. Wtedy istnieje ideał rozwiązalny  $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{g}/\mathfrak{r}$ . Niech  $\mathfrak{r}_1$  będzie jego przeciwobrazem w  $\mathfrak{g}$ . Wtedy mamy  $0 \rightarrow \mathfrak{r} \rightarrow \mathfrak{r}_1 \rightarrow \mathfrak{h} \rightarrow 0$ . Ponieważ  $\mathfrak{r}$  i  $\mathfrak{h}$  są rozwiązalne, taki jest  $\mathfrak{r}_1$ . Ale  $\mathfrak{r}$  jest największym ideałem rozwiązalnym w  $\mathfrak{g}$ . Zatem  $\mathfrak{r}_1 = \mathfrak{r}$ . Zatem  $\mathfrak{h} = 0$ .  $\square$

**Twierdzenie 14.18** Niech  $\mathfrak{g}$  będzie algebrą Liego. Następujące warunki są równoważne:

- (1)  $\mathfrak{g}$  jest algebrą reduktywną.
- (2)  $\mathfrak{g}$  nie posiada nieprzemiannych ideałów rozwiązalnych.
- (3) Radykał algebry  $\mathfrak{g}$  jest przemienne.

## 14.6 Operator Casimira

Niech  $\mathfrak{g} \subset gl(\mathcal{V})$  będzie algebrą Liego a  $\mathfrak{b} \subset \mathfrak{g}$  jej ideałem. Wybierzmy bazę  $B_1, \dots, B_n$  w  $\mathfrak{b}$ . Załóżmy, że macierz

$$b_{ij} = \text{Tr } B_i B_j.$$

jest nieosobliwa. Niech  $[b^{ij}]$  będzie jej odwrotnością. Operator Casimira dla ideału  $\mathfrak{b}$  jest zdefiniowany jako

$$\mathcal{C}_{\mathfrak{b}} := \sum_{ij=1}^n B_i B_j b^{ij}.$$

Zauważmy, że operator Casimira nie zależy od wyboru bazy w  $\mathfrak{b}$ .

**Twierdzenie 14.19** (1) Operator Casimira komutuje z  $\mathfrak{g}$ .

(2)  $\text{Tr } \mathcal{C}_{\mathfrak{b}} = \dim \mathfrak{b}$ , w szczególności  $\mathcal{C}_{\mathfrak{b}} \neq 0$ .

(3) Jeśli  $\mathbb{K} = \mathbb{C}$  i algebra  $\mathfrak{g}$  działa nieprzywiedlnie w  $\mathcal{V}$ , to  $\mathcal{C}_{\mathfrak{b}} = \frac{\dim \mathfrak{b}}{\dim \mathcal{V}} \mathbb{1}$ .

**Dowód.** (1). Niech  $A \in \mathfrak{g}$ . Z tego, że  $\mathfrak{b}$  jest ideałem wynika, że

$$[A, B_i] = \sum_{k=1}^n t_i^k B_k.$$

Z niezmienniczości formy  $\langle \cdot | \cdot \rangle_\rho$  wynika, że

$$\begin{aligned} 0 &= \langle [A, B_i] | B_j \rangle_\rho + \langle B_i | [A, B_j] \rangle_\rho \\ &= t_i^k b_{kj} + b_{ik} t_j^k. \end{aligned}$$

W skrótownym zapisie,  $t^\# b - b t = 0$ . Mnożąc przez odwrotność  $b$  z obu stron dostajemy  $b^{-1} t^\# + t b^{-1} = 0$ , czyli

$$0 = b^{ik} t_k^j + t_k^i b^{kj}.$$

Dlatego

$$\begin{aligned} [A, C_b] &= \sum_{i,j=1}^n (\rho([A, B_i])\rho(B_j) + \rho(B_i)\rho([A, B_j])) b^{ij} \\ &= \sum_{i,j=1}^n (t_i^k B_k B_j + B_i t_j^k B_k) b^{ij} = 0. \end{aligned}$$

□

## 14.7 Reprezentacje algebr półprostych

**Stwierdzenie 14.20** *Algebry półproste Liego nie posiadają nietrywialnych reprezentacji 1-wymiarowych.*

**Dowód.** Jądro takiej reprezentacji musiałoby być ideałem kowymiaru 1. Musiałby istnieć zatem ideał wymiaru 1, który byłby z konieczności przemienny, co jest niemożliwe. □

**Stwierdzenie 14.21** *Niech  $\mathfrak{g}$  będzie algebrą Liego. Wtedy  $\mathfrak{g}$  jest rozwiązalna  $\Leftrightarrow$  wszystkie reprezentacje nieprzywiedlne algebry  $\mathfrak{g}$  są jednowymiarowe.*

**Dowód.**  $\Rightarrow$ . Niech  $\pi : \mathfrak{g} \rightarrow L(\mathcal{V})$  będzie nietrywialną reprezentacją zespoloną. Wtedy istnieje  $v \in \mathcal{V}$  i  $\alpha \in \mathfrak{g}^\#$  takie, że  $Av = \alpha(A)v$ . Zatem  $\mathbb{C}v$  jest podprzestrzenią niezmienniczą. Zatem jeśli  $\mathcal{V}$  jest nieprzywiedlna, to  $\dim \mathcal{V} = 1$ .

$\Leftarrow$ . Niech  $\mathfrak{g}$  nie będzie rozwiązalna. Niech  $\mathfrak{r}$  będzie radykałem  $\mathfrak{g}$ . Wtedy  $\mathfrak{g}/\mathfrak{r}$  jest nietrywialną algebrą półprostą. Niech  $\mathfrak{g}/\mathfrak{r} = \mathfrak{a}_1 \oplus \dots \oplus \mathfrak{a}_n$  będzie rozkładem na proste składniki. Wtedy  $(\mathfrak{g}/\mathfrak{r})/(\mathfrak{a}_2 \oplus \dots \oplus \mathfrak{a}_n) \simeq \mathfrak{a}_1$ . Reprezentacja dołączona  $\mathfrak{a}_1 \rightarrow gl(\mathfrak{a}_1)$  jest nieprzywiedlna i  $\dim \mathfrak{a}_1 > 1$ . Podnosi się ona do reprezentacji (oczywiście, również nieprzywiedlnej) algebry  $\mathfrak{g}$ . □

Mówimy, że reprezentacja jest *półprosta*, jeśli dla każdej podprzestrzeni niezmienniczej znajdziemy dopełniającą podprzestrzeń niezmienniczą.

**Stwierdzenie 14.22** *Jeśli reprezentacja jest półprosta i skończenie wymiarowa, to daje się rozłożyć na sumę prostą reprezentacji nierzywiedlnych.*

Każda niezerowa przemienna algebra posiada niepółproste reprezentacje. Np

$$\mathbb{K} \ni \alpha \mapsto \begin{bmatrix} 0 & \alpha \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

**Twierdzenie 14.23** Niech  $\mathfrak{g}$  będzie algebrą Liego. Następujące warunki są równoważne:

- (1)  $\mathfrak{g}$  jest półprosta.
- (2) Każda reprezentacja  $\mathfrak{g}$  jest półprosta.

**Dowód.** (2) $\Rightarrow$ (1). Niech  $\mathfrak{b}$  będzie ideałem przemiennym w  $\mathfrak{g}$ . Reprezentacja  $\text{ad} : \mathfrak{g} \rightarrow \text{gl}(\mathfrak{g})$  jest półprosta.  $\mathfrak{b}$  jest podprzestrznią niezmienniczą. Zatem istnieje rozkład na podprzestrzenie niezmiennicze  $\mathfrak{g} = \mathfrak{a} \oplus \mathfrak{b}$ . Niezmienniczość względem  $\text{ad}$  oznacza bycie ideałem. Czyli  $\mathfrak{b} = \mathfrak{g}/\mathfrak{a}$ . Więc reprezentacje  $\mathfrak{b}$  podnoszą się do reprezentacji  $\mathfrak{g}$ . Każda niezerowa przemienna algebra posiada niepółproste reprezentacje.

(1) $\Rightarrow$ (2) Niech  $\mathfrak{g}$  będzie półprostą algebrą Liego.

**Krok 1.** Załóżmy, że  $\mathcal{Y}$  jest podprzestrznią niezmienniczą kowymiary 1 dla reprezentacji  $\rho : \mathfrak{g} \rightarrow \text{gl}(\mathcal{X})$  i  $\rho$  obcięta do  $\mathcal{Y}$  jest nieprzywiedlna. Pokażemy, że istnieje rozkład  $\mathcal{X} = \mathcal{Y} \oplus \mathcal{T}$  na podprzestrzenie niezmiennicze.

Najpierw zauważmy, że Stw. 14.20 pokazuje, że reprezentacja ilorazowa na  $\mathcal{X}/\mathcal{Y}$  jest zerowa. Zatem  $\rho(\mathcal{X}) \subset \mathcal{Y}$ .

Oznaczmy ograniczenie  $\rho$  do  $\mathcal{Y}$  przez  $\rho_0$ . Jeśli  $\rho_0 = 0$ , to  $\rho(\mathfrak{g})\rho(\mathfrak{g})\mathcal{X} \subset \rho(\mathfrak{g})\mathcal{Y} = \{0\}$ . Więc  $\rho([\mathfrak{g}, \mathfrak{g}])\mathcal{X} = \{0\}$ . Z półprostoty  $\mathfrak{g}$  wynika, że  $\mathfrak{g} = [\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]$ , więc  $\rho = 0$

Założmy więc, że  $\rho_0 \neq 0$ . Niech  $\mathfrak{a} := \text{Ker} \rho_0$ . Z półprostoty  $\mathfrak{g}$  wynika, że istnieje ideał  $\mathfrak{b} \neq \{0\}$  taki, że  $\mathfrak{g} = \mathfrak{a} \oplus \mathfrak{b}$ . Reprezentacja  $\rho_0$  (czyli też  $\rho$ ) ograniczona do  $\mathfrak{b}$  jest iniektywna. Zatem forma śladowa na  $\mathfrak{b}$

$$\langle A|B \rangle_\rho = \text{Tr } \rho(A)\rho(B), \quad A, B \in \mathfrak{b},$$

jest nieosobliwa. Niech  $\mathcal{C}_{\rho(\mathfrak{b})}$  będzie operatorem Casimira dla ideału  $\rho(\mathfrak{b})$ . Wtedy  $\mathcal{C}_{\rho_0(\mathfrak{b})} = \mathcal{C}_{\rho(\mathfrak{b})}|_{\mathcal{Y}}$  jest operatorem Casimira dla ideału  $\rho_0(\mathfrak{b})$ . Mamy  $\text{Tr} \mathcal{C}_{\rho_0(\mathfrak{b})} = \dim \mathfrak{b} \neq 0$ ,

$$\mathcal{C}_{\rho_0(\mathfrak{b})}\rho_0(A) = \rho_0(A)\mathcal{C}_{\rho_0(\mathfrak{b})}\rho_0(A), \quad A \in \mathfrak{g}.$$

Reprezentacja  $\rho_0$  jest nieprzewiedlna, więc  $\mathcal{C}_{\rho_0(\mathfrak{b})}$  jest skalarny. Więc  $\text{Ker} \mathcal{C}_{\rho_0(\mathfrak{b})} = \{0\}$ . Obraz  $\mathcal{C}_{\rho(\mathfrak{b})}$  leży w  $\mathcal{Y}$ . Więc  $\mathcal{C}_{\rho(\mathfrak{b})}$  musi mieć nietrywialne jądro, które jest podprzestrznią niezmienniczą dopełniającą do  $\mathcal{Y}$ .

**Krok 2.** Tak jak w Kroku 1, z tą różnicą, że nie zakładamy nieprzywiedlności  $\rho$  na  $\mathcal{Y}$ .

Stosujemy indukcję względem wymiaru  $\mathcal{X}$ . Niech  $\mathcal{Z} \subset \mathcal{Y}$  będzie nieprzywiedlną niezerową podprzestrznią  $\rho$ -niezmienniczą. Rozważmy reprezentację ilorazową  $\rho'$  na  $\mathcal{X}' := \mathcal{X}/\mathcal{Z}$  z podprzestrznią niezmienniczą  $\mathcal{Y}' := \mathcal{Y}/\mathcal{Z}$ . Mamy  $\dim \mathcal{X}' < \mathcal{X}$ ,  $\dim \mathcal{X}'/\mathcal{Y}' = 1$ . Zatem z założenia indukcyjnego wynika rozkład  $\mathcal{X}' = \mathcal{Y}' \oplus \mathcal{R}'$  na sumę prostą podprzestrzeni  $\rho'$ -niezmienniczych. Niech  $\mathcal{Y}, \mathcal{T}$  będą przeciwobrazami  $\mathcal{Y}', \mathcal{T}'$  względem kanonicznej projekcji  $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}/\mathcal{Z}$ . Wtedy, korzystając z tego, że  $\rho(\mathfrak{g})\mathcal{X} \subset \mathcal{Y}$ , dostajemy rozkład  $\mathcal{X} = \mathcal{Y} \oplus \mathcal{T}$  na podprzestrzenie  $\rho$ -niezmiennicze.

**Krok 3.** Pokażemy, że dowolna reprezentacja jest półprosta.

Rozważmy reprezentację  $\tau : \mathfrak{g} \rightarrow \text{gl}(\mathcal{V})$  i podprzestrzeń niezmienniczą  $\mathcal{W}$ . Zdefiniujmy nową reprezentację  $\sigma : \mathfrak{g} \rightarrow \text{gl}(\text{gl}(\mathcal{V}))$

$$\sigma(A) := \text{ad}(\tau(A)), \quad A \in \mathfrak{g}.$$



Niech

$$\begin{aligned}\mathcal{M} &:= \{B \in gl(\mathcal{V}) : B\mathcal{V} \subset \mathcal{W}, B|_{\mathcal{W}} = \lambda \mathbb{1}_{\mathcal{W}}\}, \\ \mathcal{N} &:= \{B \in gl(\mathcal{V}) : B\mathcal{V} \subset \mathcal{W}, B|_{\mathcal{W}} = 0\}.\end{aligned}$$

Jeśli wprowadzimy dowolny rozkład  $\mathcal{V} = \mathcal{W} \oplus \mathcal{U}$ , to elementy  $\mathcal{M}$  mają rozkład

$$B = \begin{bmatrix} \lambda \mathbb{1} & b_{12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Oczywiście,  $\mathfrak{N} \subset \mathfrak{M}$ ,  $\dim \mathfrak{M}/\mathfrak{N} = 1$ . Niech  $A \in \mathfrak{g}$ . Mamy

$$\tau(A) = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & a_{22} \end{bmatrix}.$$

$$\begin{aligned}\sigma(A)B &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda \mathbb{1} & b_{12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda \mathbb{1} & b_{12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ 0 & a_{22} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & a_{11}b_{12} - \lambda a_{12} - b_{12}a_{22} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.\end{aligned}$$

Zatem  $\sigma(\mathfrak{g})\mathfrak{M} \subset \mathfrak{N}$ . Ograniczając  $\sigma$  do  $\mathfrak{M}$  dostajemy reprezentację spełniającą założenia Kroku 2. Zatem  $\mathcal{M} = \mathcal{N} \oplus \mathcal{T}$ , gdzie  $\mathcal{T}$  jest niezmiennicze. Niech  $B$  będzie niezerowym elementem  $\mathcal{T}$ . Wtedy

$$B = \begin{bmatrix} \lambda \mathbb{1} & b_{12} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \lambda \neq 0.$$

Zatem  $\text{Ker} B \cap \mathcal{W} = \{0\}$ . Mamy  $B\mathcal{V} = \mathcal{W}$ , dlatego  $\dim \text{Ker} B + \dim \mathcal{W} = \dim \mathcal{V}$ . Zatem  $\mathcal{V} = \mathcal{W} \oplus \text{Ker} B$ . Mamy

$$\sigma(A)B = 0, \quad A \in \mathfrak{g},$$

Zatem

$$\tau(A)B = B\tau(A), \quad A \in \mathfrak{g}.$$

Stąd  $\tau(A)\text{Ker} B \subset \text{Ker} B$ . Czyli  $\mathcal{V} = \mathcal{W} \oplus \text{Ker} B$  jest rozkładem na podprzestrzenie  $\tau$ -niezmiennicze.

□

## 14.8 Różniczkowania półprostej algebry Liego

**Stwierdzenie 14.24** *Niech  $\mathfrak{a}$  będzie półprostym ideałem algebry Liego  $\mathfrak{g}$ . Wtedy  $\mathfrak{a}$  jest ideałem charakterystycznym.*

**Dowód.** Mamy  $[\mathfrak{a}, \mathfrak{a}] = \mathfrak{a}$ . Niech  $\mathcal{D} \in \text{Der}(\mathfrak{g})$ . Wtedy

$$\mathcal{D}\mathfrak{a} = \mathcal{D}[\mathfrak{a}, \mathfrak{a}] = [\mathcal{D}\mathfrak{a}, \mathfrak{a}] + [\mathfrak{a}, \mathcal{D}\mathfrak{a}] \subset [\mathfrak{g}, \mathfrak{a}] + [\mathfrak{a}, \mathfrak{g}] \subset \mathfrak{a}.$$

□

**Stwierdzenie 14.25** Niech  $\mathcal{V}$  będzie przestrzenią zespoloną i  $\mathfrak{g} \subset gl(\mathcal{V})$  będzie algebrą Liego. Załóżmy, że

- (1)  $\mathfrak{g}$  nie posiada nietrywialnych niezmienniczych podprzestrzeni
- (2)  $\mathbb{1} \notin \mathfrak{g}$ .

Wtedy  $\mathfrak{g}$  jest półprosta.

**Dowód.** Załóżmy, że  $\mathfrak{g}$  posiada ideał rozwiązalny  $\mathfrak{a}$ . Na mocy Tw. Liego istnieje funkcjonal pierwiastkowy  $\alpha \in \mathfrak{a}^\#$  taki, że

$$\mathcal{V}_\alpha(\mathfrak{a}) := \{v \in \mathcal{V} : Av = \alpha(A)v, A \in \mathfrak{a}\} \neq \{0\}.$$

Ze Stwierdzenia 14.8 wynika i tego, że  $\mathfrak{a}$  jest ideałem w  $\mathfrak{g}$ , wynika, że  $\mathcal{V}_\alpha(\mathfrak{a})$  jest podprzestrzenią niezmienniczą dla  $\mathfrak{g}$ . Zatem z (1),  $\mathcal{V} = \mathcal{V}_\alpha(\mathfrak{a})$ . Stąd  $A = \alpha(A)\mathbb{1}$ ,  $A \in \mathfrak{a}$ . Z (2) wynika, że  $\alpha = 0$ . Więc  $\mathfrak{a} = \{0\}$ , co oznacza, że  $\mathfrak{g}$  jest półprosta.  $\square$

**Lemat 14.26** Jeśli  $\mathfrak{g}$  jest półprosta, a  $\mathfrak{g} = \mathfrak{a}_1 \oplus \cdots \oplus \mathfrak{a}_n$  jej rozkładem na proste ideały, to  $\text{Der } \mathfrak{g} = \text{Der } \mathfrak{a}_1 \oplus \cdots \oplus \text{Der } \mathfrak{a}_n$ .

**Dowód.** Inkluzja  $\subset$  jest oczywista.

Niech  $\mathcal{D} \in \text{Der}(\mathfrak{g})$ . Ze Stw. 14.24 wynika, że ideały  $\mathfrak{a}_i$  są niezmiennicze względem  $\mathcal{D}$ . Zatem  $\mathcal{D} = \mathcal{D}_1 \oplus \cdots \oplus \mathcal{D}_n$ .  $\square$

**Twierdzenie 14.27** Niech  $\mathfrak{g}$  będzie półprostą algebrą Liego. Wtedy  $\text{ad} : \mathfrak{g} \rightarrow \text{Der}(\mathfrak{g})$  jest izomorfizmem.

**Dowód.** Jądro homomorfizmu dołączonego jest centrum. Centrum jest zerowe. Zatem  $\text{ad}$  jest injekcją.

Pokażmy surjektywność  $\text{ad}$ .

Założmy najpierw, że  $\mathfrak{g}$  jest prosta.  $\text{Der}(\mathfrak{g})$  jest podalgebrą w  $gl(\mathfrak{g})$  nie zawierającą identyfikacji i nie posiadającą podprzestrzeni niezmienniczych. Dlatego, na podstawie Stwierdzenia 14.25 wnioskujemy, że  $\text{ad}(\mathfrak{g})$  jest półprosta.

Jeśli  $\mathfrak{g}$  jest półprosta, i  $\mathfrak{g} = \mathfrak{a}_1 \oplus \cdots \oplus \mathfrak{a}_n$  jej rozkładem na proste ideały, to na mocy Lematu 14.26,  $\text{Der } \mathfrak{g} = \text{Der } \mathfrak{a}_1 \oplus \cdots \oplus \text{Der } \mathfrak{a}_n$ . Zatem  $\text{Der}(\mathfrak{g})$  jest półproste.

$\text{ad}(\mathfrak{g})$  jest ideałem w  $\text{Der}(\mathfrak{g})$ . Z półprostoty  $\text{Der}(\mathfrak{g})$  wynika, że istnieje ideał  $\mathfrak{h}$  w  $\text{Der}(\mathfrak{g})$  taki, że  $\text{Der}(\mathfrak{g}) = \text{ad}(\mathfrak{g}) \oplus \mathfrak{h}$ . Niech  $\mathcal{D} \in \mathfrak{h}$ ,  $A \in \mathfrak{g}$ . Wtedy

$$0 = [\mathcal{D}, \text{ad}(A)] = \text{ad}(\mathcal{D}A).$$

Z injektywności  $\text{ad}$  wynika, że  $\text{ad}(\mathcal{D}A) = 0$ . To implikuje  $\mathcal{D}A = 0$ . Zatem  $\mathcal{D} = 0$ . Czyli,  $\mathfrak{h} = 0$ .  $\square$

## 15 Nilpotentne algebry Liego

### 15.1 Struktura endomorfizmu liniowego

Niech  $A \in L(\mathcal{V})$ , gdzie  $\mathcal{V}$  jest skończenie wymiarowa zespolona.

**Twierdzenie 15.1** *Niech  $\lambda \in \mathbb{C}$ . Następujące warunki są równoważne:*

- (1)  $\text{Ker}(\lambda\mathbb{1} - A) \neq \{0\}$ .
- (2)  $\text{Ran}(\lambda\mathbb{1} - A) \neq \mathcal{V}$ .
- (3)  $\det(\lambda\mathbb{1} - A) = 0$ .

Zbiór  $\lambda$  spełniających powyższe warunki nazywamy *spektrum* operatora  $A$  i oznaczamy  $\text{spec}A$ .

Mówimy, że  $D$  jest *półprostym* (*diagonalizowalnym*), gdy posiada bazę złożoną z wektorów własnych. Czyli jeśli  $\text{spec}D = \{\lambda_1, \dots, \lambda_k\}$ , to  $\mathcal{V} = \bigoplus_{i=1}^k \text{Ker}(\lambda_i\mathbb{1} - D)$  i względem tego rozkładu

$$D = \bigoplus_{i=1}^k \lambda_i \mathbb{1}_i.$$

Mówimy, że  $N$  jest *nilpotentny*, gdy dla pewnego  $p$ ,  $N^p = 0$ . Najmniejszą taką liczbę, że  $N^p = 0$  nazywamy jego *stopniem nilpotencji*.

**Twierdzenie 15.2** *Niech  $\mathcal{V}$  będzie przestrzenią nad  $\mathbb{C}$ . Wtedy istnieje jednoznaczny rozkład  $A = D + N$  na część półprostą i nilpotentną takie, że  $DN = ND$ .*

**Dowód.** Niech  $\lambda \in \text{spec}A$ . Ciąg podprzestrzeni  $\text{Ker}(A - \lambda_i)^j$  jest rosnący, więc się stabilizuje dla dostatecznie dużych  $j$ . Niech  $p$  będzie najmniejszą liczbą taką, że  $\text{Ker}(A - \lambda)^p = \text{Ker}(A - \lambda)^{p+1}$ . Zdefiniujemy wtedy

$$\mathcal{V}^\lambda(A) := \text{Ker}(A - \lambda)^p = \bigcup_{j=0}^{\infty} \text{Ker}(A - \lambda)^j.$$

Pokazujemy wtedy, że  $\mathcal{V} = \bigoplus_{\lambda \in \text{spec}A} \mathcal{V}^\lambda(A)$ . Kładąc  $D = \bigoplus_{\lambda \in \text{spec}A} \lambda$  i  $N := A - D$  dostajemy rozkład.  $\square$

Operator  $N$  na  $n$  wymiarowej przestrzeni taki, że  $N^{p-1} \neq 0$  i  $N^p = 0$  nazywamy *elementarnym operatorem nilpotentnym  $p$ -tego stopnia*. Każdy taki operator można w odpowiedniej bazie przedstawić w postaci macierzy z jedynkami bezpośrednio nad diagonalą, którą oznaczymy  $N_p$ .

**Twierdzenie 15.3** *Jeśli  $N$  jest nilpotentny, to istnieje rozkład  $\mathcal{V} = \bigoplus_{i=1}^k \mathcal{V}_i$  taki, że  $N$  zachowuje  $\mathcal{V}_i$  i  $N|_{\mathcal{V}_i}$  jest elementarnym operatorem nilpotentnym.*

**Twierdzenie 15.4** *Niech  $BD = DB$ . Wtedy  $B$  zachowuje rozkład na podprzestrzenie własne operatora  $D$ .*

**Twierdzenie 15.5** *Niech  $\mathbb{R} \ni t \mapsto \phi(t) \in gl(\mathcal{V})$  będzie reprezentacją algebr Liego. Wtedy reprezentację możemy rozłożyć na nierozkładalne składowe postaci  $t \mapsto t(\lambda\mathbb{1} + N_k)$ .*

- Twierdzenie 15.6** (1) Niech  $N \in L(\mathcal{V})$  będzie nilpotentny. Wtedy  $\text{ad}_N \in L(L(\mathcal{V}))$  też.
- (2) Niech  $D \in L(\mathcal{V})$  będzie nilpotentny. Wtedy  $\text{ad}_D \in L(L(\mathcal{V}))$  też.
- (3) Niech  $A \in L(c\mathcal{V})$  i niech  $A = B + N$  będzie rozkładem na komutujące ze sobą operator półprosty i nilpotentny. Wtedy  $\text{ad}_A = \text{ad}_D + \text{ad}_N$  jest również takim rozkładem.

**Stwierdzenie 15.7** Niech  $A, B \in L(\mathcal{V})$ . Jeśli istnieje  $k$  takie, że  $\text{ad}(A)^k B = 0$ , to  $B$  zachowuje  $\mathcal{V}^\lambda(A)$ .

**Dowód.** Niech

$$\mathcal{V}^\lambda(A) = \text{Ker}(A - \lambda)^m \ni x.$$

Załóżmy, że teza zachodzi, jeśli  $k$  zastąpimy przez  $k - 1$ . Mamy

$$(A - \lambda)^n Bx = \sum_{i=1}^n (A - \lambda)^i [B, A] (A - \lambda)^{n-i} x. \quad (15.119)$$

Mamy  $\text{ad}(A)^{k-1} [B, A] = 0$ . Zatem na mocy założenia indukcyjnego,  $[B, A]$  zachowuje  $\text{Ker}(A - \lambda)^m$ .

Jeśli  $n = 2m + 1$ , to w sumie (15.119) wszystkie składniki są równe zero, bo albo  $n - i - 1 \geq m$ , i wtedy  $(A - \lambda)^{n-i} x = 0$ , albo  $i \geq m$ , i wtedy  $y = [B, A] (A - \lambda)^{n-i} x \in \text{Ker}(A - \lambda)^m$ , więc  $(A - \lambda)^i y = 0$ .  $\square$

**Stwierdzenie 15.8** (1) Niech  $D \in gl(\mathcal{V})$  będzie półprosty. Wtedy  $\text{ad}(D) \in gl(gl(\mathcal{V}))$  jest półprosty.

(2) Niech  $N \in gl(\mathcal{V})$  będzie półprosty. Wtedy  $\text{ad}(N) \in gl(gl(\mathcal{V}))$  jest półprosty.

**Dowód.** (1) Niech  $e_1, \dots, e_n$  będzie bazą taką, że  $De_i = \lambda_i e_i$ . Wtedy

$$\text{ad}(D)|e_i\rangle\langle e_j| = (\lambda_i - \lambda_j)|e_i\rangle\langle e_j|.$$

(2) Niech  $N^p = 0$ . Wtedy  $\text{ad}(N)^{2p-1} = 0$ .  $\square$

**Stwierdzenie 15.9** Niech  $A = S + N$  będzie rozkładem  $A \in L(\mathcal{V})$  na część półprostą i nilpotentną.

(1)  $\text{ad}(A) = \text{ad}(S) + \text{ad}(N)$  jest kanonicznym rozkładem  $\text{ad}(A) \in gl(gl(\mathcal{V}))$  na część półprostą i nilpotentną.

(2) Niech  $0 = [B, A]$ . Wtedy  $0 = [B, S] = [B, N]$ .

**Dowód.** (1) Sprawdzamy, że  $\text{ad}(S)$  komutuje z  $\text{ad}(N)$ .

(2) Istnieje wielomian  $s$  taki, że  $S = s(A)$ . Dlatego też, istnieje wielomian  $\tilde{s}$  taki, że  $\text{ad}(S) = \tilde{s}(\text{ad}(A))$ .  $\square$

## 15.2 Twierdzenie Engela

**Twierdzenie 15.10** *Niech  $\mathcal{V}$  będzie przestrzenią zespoloną i  $\mathfrak{g} \subset gl(\mathcal{V})$  będzie algebrą Liego składającą się z operatorów nilpotentnych. Wtedy*

- (1) *(Twierdzenie Engela) 0 jest funkcjonalem pierwiastkowym dla  $\mathfrak{g}$ , czyli istnieje  $v \in \mathcal{V}$ ,  $v \neq 0$  taki, że  $Av = 0$ ,  $A \in \mathfrak{g}$ .*
- (2) *Istnieje baza w  $\mathcal{V}$  dla której  $\mathfrak{g}$  jest podalgebrą macierzy ściśle górnotrójkątnych.*
- (3)  *$\mathfrak{g}$  jest nilpotentna.*

**Lemat 15.11** *Niech  $\mathcal{V}$  będzie przestrzenią zespoloną. Niech  $\mathfrak{A} \subset L(\mathcal{V})$  będzie algebrą łączną składającą się z operatorów nilpotentnych. Wtedy istnieje  $v \in \mathcal{V}$ ,  $v \neq 0$  taki, że  $Av = 0$ ,  $A \in \mathfrak{A}$ .*

**Dowód.** Można założyć, że  $\mathfrak{A} \neq \{0\}$ . Pokażemy najpierw, że  $\mathfrak{A}$  posiada nietrywialną podprzestrzeń niezmienniczą. Załóżmy, że tak nie jest. Znajdziemy  $y \in \mathcal{V}$ ,  $B \in \mathfrak{A}$  takie, że  $z := By \neq 0$ . Wtedy  $\mathfrak{A}z$  jest niezerową podprzestrzenią niezmienniczą. Zatem  $\mathfrak{A}z = \mathcal{V}$ . Stąd istnieje  $C \in \mathfrak{A}$  taki, że  $Cz = y$ . Czyli  $CB y = y$ , co oznacza, że  $CB$  nie jest nilpotentny. Ale  $CB \in \mathfrak{A}$  (bo  $\mathfrak{A}$  jest algebrą) – sprzeczność.

Stosując teraz indukcję względem wymiaru dostajemy jednowymiarową podprzestrzeń niezmienniczą. Z powodu nilpotentności, elementy  $\mathfrak{A}$  muszą się na niej zerować.  $\square$

**Lemat 15.12** *Niech  $\mathfrak{A}$  będzie algebrą łączną generowaną przez algebrę Liego  $\mathfrak{g} \subset gl(\mathcal{V})$ . Wtedy dla każdego  $C \in \mathfrak{A}$  istnieją  $A_1, \dots, A_k \in \mathfrak{g}$ ,  $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{K}$  i  $n_1, \dots, n_k \in \mathbb{N}$  takie, że*

$$C = \sum_{i=1}^k \lambda_i A_i^{n_i}. \quad (15.120)$$

**Dowód.** Każdy element  $\mathfrak{A}$  jest kombinacją liniową wyrażeń postaci.

$$B_1 \cdots B_n, \quad B_1, \dots, B_n \in \mathfrak{g}. \quad (15.121)$$

Wyrażenia typu (15.121) nazwiemy wyrażeniami długości  $n$ .

Niech  $\phi \in \mathfrak{A}^\#$  zeruje się na wyrazach postaci (15.120). Trzeba pokazać, że  $\phi = 0$ . Pokażemy indukcyjnie, że  $\phi$  zeruje się na wyrażeniach długości  $n$

Założmy, że jest to prawda dla  $n - 1$ . Oczywiście,

$$\phi \left( \sum_{\sigma \in S_n} B_{\sigma(1)} \cdots B_{\sigma(n)} \right) = \partial_{t_1} \dots \partial_{t_n} \phi \left( (t_1 B_1 + \cdots + t_n B_n)^n \right) \Big|_{t_1 = \dots = t_n = 0} = 0. \quad (15.122)$$

Ale

$$\sum_{\sigma \in S_n} B_{\sigma(1)} \cdots B_{\sigma(n)} = n! B_1 \cdots B_n + C$$

gdzie  $C$  jest kombinacją liniową wyrażeń długości  $\leq n - 1$ . Więc  $\phi(B_1 \cdots B_n) = 0$ .  $\square$

**Lemat 15.13** Niech  $\dim \mathcal{V} = n$  i  $A \in L(\mathcal{V})$ . Wtedy następujące warunki są równoważne:

- (1)  $A$  jest nilpotentny.
- (2)  $\text{Tr} A^k = 0$ ,  $k = 1, \dots, n$ .

**Dowód.** (1) $\Rightarrow$ (2) jest oczywisty.

(2) $\Rightarrow$ (1). Niech  $\text{spec} A = \{\lambda_1, \dots, \lambda_k\}$  z krotnościami  $m_1, \dots, m_k$ . Wtedy (2) oznacza

$$\sum_{i=1}^k m_i \lambda_i^j = 0, \quad j = 1, \dots, n. \quad (15.123)$$

Położmy  $\mu_i := m_i \lambda_i$ . (15.123) implikuje

$$\sum_{i=1}^k \mu_i \lambda_i^j = 0, \quad j = 0, \dots, m-1. \quad (15.124)$$

Macierz  $[\lambda_i^j]$  to macierz Vandermonda z wyznacznikiem  $\prod_{i>j} (\lambda_i - \lambda_j)$ . Istnienie niezerowego rozwiązania (15.124) oznacza, że  $\prod_{i>j} (\lambda_i - \lambda_j) = 0$ , czyli wszystkie  $\lambda_i$  są równe jakiemuś  $\lambda$ . Ale wtedy  $\text{Tr} A^k = n\lambda^k = 0$ , więc  $\lambda = 0$ . Zatem (15.124) ma tylko zerowe rozwiązanie, zatem  $\lambda_i = 0$ .  $\square$

**Lemat 15.14** Niech  $\mathfrak{A} \subset L(\mathcal{V})$  będzie algebrą łączną. Jeśli  $\text{Tr} A = 0$ ,  $A \in \mathfrak{A}$ , to wszystkie elementy  $\mathfrak{A}$  są nilpotentne.

**Dowód.** Natychmiastowa konsekwencja z Lematu 15.13.  $\square$

**Lemat 15.15** Niech  $\mathfrak{A} \subset L(\mathcal{V})$  będzie algebrą łączną generowaną przez algebrę Liego  $\mathfrak{g}$  składającą się z operatorów nilpotentnych. Wtedy wszystkie elementy  $\mathfrak{A}$  są nilpotentne.

**Dowód.** Potęgi operatorów nilpotentnych są nilpotentne. Więc z Lematu 15.12 wynika, że  $\mathfrak{A}$  składa się ona z kombinacji liniowych operatorów nilpotentnych. Wobec tego, wszystkie operator w  $\mathfrak{A}$  mają ślad równy 0. Wystarczy więc zastosować Lemat 15.14.  $\square$

**Dowód Twierdzenia 15.10.** (1) Niech  $\mathfrak{A}$  będzie algebrą łączną generowaną przez  $\mathfrak{g}$ . Z lematu 15.11 wynika, że istnieje wspólny zerowy wektor własny dla  $\mathfrak{A} \supset \mathfrak{g}$ .

- (1) implikuje (2) przez indukcję.
- (2) pociąga za sobą (3).  $\square$

### 15.3 Przestrzeń pierwiastkowe algebry nilpotentnej

Niech  $\mathcal{V}$  będzie przestrzenią zespoloną a  $\mathfrak{g} \subset gl(\mathcal{V})$  będzie algebrą Liego. Dla  $\alpha \in \mathfrak{g}^\#$  definiujemy

$$\mathcal{V}_j^\alpha(\mathfrak{g}) := \bigcap_{A \in \mathfrak{g}} \text{Ker}(A - \alpha(A)\mathbb{1})^j.$$

Jest to rodzina rosnąca ze względu na  $j$ . Definiujemy

$$\mathcal{V}^\alpha(\mathfrak{g}) := \bigcup_{j=1}^{\infty} \mathcal{V}_j^\alpha(\mathfrak{g}).$$

Przez  $\text{spec } \mathfrak{g}$  oznaczamy zbiór pierwiastków algebry  $\mathfrak{g}$ , to znaczy  $\alpha \in \mathfrak{g}^\#$  dla których  $\mathcal{V}^\alpha(\mathfrak{g}) \neq \{0\}$ .

**Twierdzenie 15.16** *Niech  $\mathfrak{g}$  będzie nilpotentną algebrą Liego. Wtedy*

$$\mathcal{V} = \bigoplus_{\alpha \in \text{spec } \mathfrak{g}} \mathcal{V}^\alpha(\mathfrak{g}).$$

Dla  $A \in \mathfrak{g}$  zdefiniujemy

$$A_{\text{nil}} := A - \bigoplus_{\alpha \in \text{spec } \mathfrak{g}} \alpha(A) \mathbb{1}_{\mathcal{V}^\alpha(\mathfrak{g})}.$$

Wtedy  $\mathfrak{g} \ni A \mapsto A_{\text{nil}} \in \text{gl}(\mathcal{V})$  jest reprezentacją o wartościach w operatorach nilpotentnych. Ponadto,  $\alpha([\mathfrak{g}, \mathfrak{g}]) = 0$ .

**Dowód.** Załóżmy najpierw, że wszystkie  $A \in \mathfrak{g}$  mają widmo jednopunktowe. Kładąc

$$\langle \alpha | A \rangle := \frac{\text{Tr} A}{\dim \mathcal{V}}$$

mamy wtedy  $\text{spec} A = \{\langle \alpha | A \rangle\}$ . Więc  $A - \langle \alpha | A \rangle$  ma widmo zerowe, więc są nilpotentne.

Niech istnieje  $A \in \mathfrak{g}$  i  $\text{spec} A = \{\lambda_1, \dots, \lambda_k\}$ . Wtedy na mocy Tw. 15.7, każdy  $B \in \mathfrak{g}$  zachowuje rozkład  $\mathcal{V} = \bigoplus_{i=1}^m \mathcal{V}^{\lambda_i}(A)$ . Zatem możemy zastosować skończoną indukcję.  $\square$

## 15.4 Przestrzenie pierwiastkowe w algebrach Liego

**Stwierdzenie 15.17** *Niech  $\mathfrak{g}$  będzie algebrą Liego i  $\mathcal{D} \in \text{Der}(\mathfrak{g})$ . Niech*

$$\mathfrak{g}^\lambda(\mathcal{D}) := \bigcup_{j=1}^{\infty} \text{Ker}(\mathcal{D} - \lambda)^j$$

tak że

$$\mathfrak{g} = \bigoplus_{i=1}^n \mathfrak{g}^{\lambda_i}(\mathcal{D}).$$

Wtedy

$$[\mathfrak{g}^\lambda(\mathcal{D}), \mathfrak{g}^\mu(\mathcal{D})] \subset \mathfrak{g}^{\lambda+\mu}(\mathcal{D}).$$

**Dowód.** Iterując

$$(\mathcal{D} - \lambda - \mu)[A, B] = [(\mathcal{D} - \lambda)A, B] + [A(\mathcal{D} - \mu)B],$$

dostajemy

$$(\mathcal{D} - \lambda - \mu)^n[A, B] = \sum \binom{n}{j} [(\mathcal{D} - \lambda)^j A, (\mathcal{D} - \mu)^{n-j} B].$$

Więc jeśli  $(\mathcal{D} - \lambda)^k A = 0$  i  $(\mathcal{D} - \mu)^m B = 0$ , to  $(\mathcal{D} - \lambda - \mu)^{k+m}[A, B] = 0$ .  $\square$

**Twierdzenie 15.18** Niech  $\mathfrak{g}$  będzie algebrą Liego. Niech  $\mathfrak{h}$  będzie nilpotentną algebrą Liego i  $\rho : \mathfrak{h} \rightarrow \text{Der}(\mathfrak{g})$  reprezentacją. Niech

$$\mathfrak{g} = \bigoplus_{\alpha \in \text{spec} \rho} \mathfrak{g}^\alpha(\mathfrak{h})$$

będzie rozkładem na przestrzenie pierwiastkowe. Wtedy

$$[\mathfrak{g}^\alpha(\mathfrak{h}), \mathfrak{g}^\beta(\mathfrak{h})] \subset \mathfrak{g}^{\alpha+\beta}(\mathfrak{h}).$$

W szczególności, możemy założyć, że  $\mathfrak{h}$  jest nilpotentną podalgebrą  $\mathfrak{g}$  i reprezentacja jest zadana przez

$$\mathfrak{h} \ni H \mapsto \text{ad}(H) \in \text{gl}(\mathfrak{g}).$$

Wśród pierwiastków mamy wtedy 0. Oczywiście,  $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{g}^0(\mathfrak{h})$ . Zarówno  $\mathfrak{h}$  jak i  $\mathfrak{g}^0(\mathfrak{h})$  są podprzestrzeniami niezmienniczymi.

## 15.5 Algebry Cartana—przypadek ogólny

Niech  $\mathfrak{a}$  będzie podalgebrą algebry Liego  $\mathfrak{g}$ . *Normalizatorem  $\mathfrak{a}$*  nazywamy

$$\text{Nora} := \{A \in \mathfrak{g} : [A, \mathfrak{a}] \subset \mathfrak{a}\}.$$

**Stwierdzenie 15.19** Nora jest największą z podalgebr algebry  $\mathfrak{g}$  zawierającą  $\mathfrak{a}$  jako ideał.

Mówimy, że  $\mathfrak{h}$  jest podalgebrą Cartana algebry Liego  $\mathfrak{g}$ , gdy

- (1)  $\mathfrak{h}$  jest algebrą nilpotentną.
- (2)  $\text{Nor} \mathfrak{h} = \mathfrak{h}$ .

**Stwierdzenie 15.20** Niech  $\mathfrak{h}$  będzie nilpotentną podalgebrą w  $\mathfrak{g}$ . Następujące warunki są równoważne.

- (1)  $\mathfrak{h}$  jest podalgebrą Cartana w  $\mathfrak{g}$ .
- (2)  $\mathfrak{h} = \mathfrak{g}^0(\mathfrak{h})$ .

**Dowód.** (1) $\Rightarrow$ (2). Oczywiście,  $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{g}^0(\mathfrak{h})$ . Załóżmy, że nie ma równości. Oznaczmy przez  $\rho$  reprezentację

$$\mathfrak{h} \ni H \mapsto \text{ad}(H) \in \text{gl}(\mathfrak{g}).$$

Reprezentacja  $\rho$  ograniczona do  $\mathfrak{g}^0(\mathfrak{h})$  składa się z samych endomorfizmów nilpotentnych. Tak samo, reprezentacja ilorazowa  $\rho'$  w  $\mathfrak{g}^0(\mathfrak{h})/\mathfrak{h}$ . Na mocy Tw. Engela (Tw. 15.10), istnieje  $B + \mathfrak{h} \in \mathfrak{g}^0(\mathfrak{h})/\mathfrak{h}$ ,  $B + \mathfrak{h} \neq \mathfrak{h}$ , dla którego  $\rho'(\mathfrak{h})(B + \mathfrak{h}) = 0$ . Oznacza to, że  $B \notin \mathfrak{h}$  i  $\text{ad}(\mathfrak{g})B \subset \mathfrak{h}$ . Zatem algebra generowana przez  $\mathfrak{h}$  i  $B$  jest zawarta w normalizatorze  $\mathfrak{h}$  i jest większa od  $\mathfrak{h}$ . Więc  $\mathfrak{h}$  nie jest algebrą Cartana.

(2) $\Rightarrow$ (1). Niech  $C \in \text{Nor} \mathfrak{h}$ ,  $C = \sum_{\alpha} C_{\alpha}$ ,  $C_{\alpha} \in \mathfrak{g}^{\alpha}(\mathfrak{h})$ . Dla  $B \in \mathfrak{h}$  mamy  $\text{ad}(B)C_{\alpha} \in \mathfrak{g}^{\alpha}(\mathfrak{h})$  i

$$\text{ad}(B)C = \sum_{\alpha} \text{ad}(B)C_{\alpha} \in \mathfrak{h} \subset \mathfrak{g}^0(\mathfrak{h}).$$

Dlatego  $C_{\alpha} \in \mathfrak{g}^{\alpha}(\mathfrak{h}) \cap \mathfrak{g}^0(\mathfrak{h})$ , czyli  $C_{\alpha} = 0$ ,  $\alpha \neq 0$ . Zatem  $C = C_0 \in \mathfrak{g}^0(\mathfrak{h})$ . Czyli  $\text{Nor} \mathfrak{h} \subset \mathfrak{g}^0(\mathfrak{h}) = \mathfrak{h}$ .  $\square$



**Stwierdzenie 15.21** Niech  $\mathfrak{g}$  będzie algebrą Liego. Każda jej podalgebra Cartana jest jej maksymalną podalgebrą nilpotentną.

**Dowód.** Niech  $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{n} \subset \mathfrak{g}$ , gdzie  $\mathfrak{h}$  jest Cartana a  $\mathfrak{n}$  jest nilpotentna. Rozważmy wstępujący ciąg centralny  $\{0\} = \mathcal{C}_0\mathfrak{n} \subset \dots \subset \mathcal{C}_m\mathfrak{n} = \mathfrak{n}$ . Niech  $k$  będzie najmniejszą z liczb dla których  $\mathcal{C}_k\mathfrak{n} \not\subset \mathfrak{h}$ . Niech  $A \in \mathcal{C}_k\mathfrak{n} \setminus \mathfrak{h}$ . Mamy

$$[A, \mathfrak{n}] \subset \mathcal{C}_{k-1}\mathfrak{n} \subset \mathfrak{h},$$

zatem  $\mathfrak{h}$  jest ideałem algebry  $\mathfrak{a}$  generowanej przez  $\mathfrak{h}$  i  $A$ . Więc  $\mathfrak{a} \subset \text{Nor}\mathfrak{h}$ . Oczywiście,  $\mathfrak{h} \subsetneq \mathfrak{a}$ . Zatem  $\text{Nor}\mathfrak{h} \neq \mathfrak{h}$ .  $\square$

**Twierdzenie 15.22** Niech  $\langle \cdot | \cdot \rangle_{\mathfrak{g}}$  będzie formą Killinga na algebrze Liego  $\mathfrak{g}$ . Niech  $\mathfrak{h}$  będzie jej podalgebrą Cartana.

(1) Jeśli  $\alpha + \beta \neq 0$ , to  $\mathfrak{g}^{\alpha}(\mathfrak{h})$  i  $\mathfrak{g}^{\beta}(\mathfrak{h})$  są ortogonalne względem  $\langle \cdot | \cdot \rangle_{\mathfrak{g}}$ .

(2) Rozkład

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \sum_{(\alpha, -\alpha)} (\mathfrak{g}^{\alpha}(\mathfrak{h}) \oplus \mathfrak{g}^{-\alpha}(\mathfrak{h})) \quad (15.125)$$

jest rozkładem na sumę prostą ortogonalnych podprzestrzeni.

**Dowód.** Niech  $A \in \mathfrak{g}^{\alpha}(\mathfrak{h})$ ,  $B \in \mathfrak{g}^{\beta}(\mathfrak{h})$  i  $C \in \mathfrak{g}^{\gamma}(\mathfrak{h})$ . Wtedy

$$(\text{ad}(A)\text{ad}(B))^n C \in \mathfrak{g}^{(\alpha+\beta)n+\gamma}(\mathfrak{h}).$$

Ponieważ dla dużych  $n$ ,  $\mathfrak{g}^{(\alpha+\beta)n+\gamma}(\mathfrak{h}) = \{0\}$ , więc  $\text{ad}(A)\text{ad}(B)$  jest nilpotentny. Zatem

$$\langle A|B \rangle = \text{Tr ad}(A)\text{ad}(B) = 0.$$

## 15.6 Elementy półproste i nilpotentne w półprostych algebrach Liego

Niech  $\mathfrak{g}$  będzie półprostą algebrą Liego nad  $\mathbb{C}$ .

**Twierdzenie 15.23**  $\text{ad} : \mathfrak{g} \rightarrow \text{Der}(\mathfrak{g})$  jest izomorfizmem.

**Dowód.**  $\text{Ker ad} = \mathfrak{z}(\mathfrak{g})$ . Dla półprostych  $\mathfrak{g}$ , centrum jest zerowe. Zatem  $\text{ad}$  jest injekcją.

Pokażemy teraz, że  $\text{ad}$  jest surjekcją. Niech  $\mathfrak{g} = \mathfrak{a}_1 \oplus \dots \oplus \mathfrak{a}_n$  będzie rozkładem na ideały proste. (...)  $\square$

**Twierdzenie 15.24** Niech  $A \in \mathfrak{g}$ . Wtedy istnieją jedyne elementy  $S, N \in \mathfrak{g}$  takie, że  $\text{ad}_A = \text{ad}_S + \text{ad}_N$  jest kanonicznym rozkładem na część półprostą i nilpotentną. Mamy  $A = S + N$ .

**Dowód.** Mamy rozkład  $\mathfrak{g} = \bigoplus_{\alpha \in \text{spec ad}(A)} \mathfrak{g}^{\alpha}(A)$ . Zdefiniujmy  $\mathcal{S}, \mathcal{N} \in L(\mathfrak{g})$ ,  $\mathcal{S} = \bigoplus_{\alpha \in \text{spec ad}(A)} \alpha$ ,  $\mathcal{N} := \text{ad}(A) - \mathcal{S}$ . Z tego, że  $[\mathfrak{g}^{\alpha}(A), \mathfrak{g}^{\beta}(A)] = \mathfrak{g}^{\alpha+\beta}(A)$ , wynika, że  $\mathcal{S} \in \text{Der}(\mathfrak{g})$ . Dlatego  $\mathcal{N} \in \text{Der}(\mathfrak{g})$ . Z Tw. 15.23 wynika, że istnieją  $S, N \in \mathfrak{g}$  takie, że  $\mathcal{S} = \text{ad}(S)$ ,  $\mathcal{N} = \text{ad}(N)$ .  $\square$

**Stwierdzenie 15.25** Niech  $A, B \in \mathfrak{g}$  i  $A = S + N$  będzie kanonicznym rozkładem na część półprostą i nilpotentną. Jeśli  $[A, B] = 0$ , to  $[S, B] = [N, B] = 0$ .

**Dowód.**  $\text{ad}(A) = \text{ad}(S) + \text{ad}(N)$  jest kanonicznym rozkładem na część półprostą i nilpotentną. Poza tym,  $0 = \text{ad}([A, B]) = [\text{ad}(A), \text{ad}(B)]$ . Więc  $0 = [\text{ad}(S), \text{ad}(B)] = [\text{ad}(N), \text{ad}(B)]$ . Ponieważ  $\text{ad}$  jest izomorfizmem, więc  $0 = [S, B] = [N, B]$ .  $\square$

## 16 Struktura algebr półprostych

### 16.1 Podalgebra Cartana dla algebr półprostych

**Twierdzenie 16.1** Niech  $\mathfrak{g}$  będzie półprostą algebrą Liego nad  $\mathbb{C}$  a  $\mathfrak{h}$  jej podalgebrą. Następujące warunki są równoważne.

- (1)  $\mathfrak{h}$  jest algebrą Cartana.
- (2)  $\mathfrak{h}$  jest maksymalną podalgebrą przemienną i wszystkie elementy  $\mathfrak{h}$  są półproste.

Poza tym, jeśli  $\langle \cdot | \cdot \rangle$  jest niezdegenerowaną formą niezmienniczą, to jej ograniczenie do  $\mathfrak{h}$  jest niezdegenerowane.

**Dowód.** (2) $\Rightarrow$ (1) Niech  $H \in \mathfrak{h}$ ,  $B \in \mathfrak{g}^0(\mathfrak{h})$ . Z półprostoty  $H$  wynika, że  $[H, B] = 0$ . Zatem algebra generowana przez  $\mathfrak{h}$  i  $B$  jest przemienna. Z maksymalności  $\mathfrak{h}$  jako algebry przemiennej wynika, że  $B \in \mathfrak{h}$ . Więc  $\mathfrak{h} = \mathfrak{g}^0(\mathfrak{h})$ . Więc  $\mathfrak{h}$  jest podalgebrą Cartana.

Niech  $A, B \in \mathfrak{h}$  i  $A = S + N$  będzie kanonicznym rozkładem na część półprostą i nilpotentną. Z przemienności  $\mathfrak{h}$  wynika  $[A, B] = 0$ . Zatem  $[N, B] = 0$ . Dlatego  $(\text{ad}(N)\text{ad}(N))^n = \text{ad}(B)^n \text{ad}(N)^n = 0$ . Stąd  $\text{ad}(N)\text{ad}(N)$  jest nilpotentny. Czyli,  $\langle B | N \rangle = \text{Tr}(\text{ad}(B)\text{ad}(N)) = 0$ . Zatem  $N$  jest ortogonalny do  $\mathfrak{h}$ . Stąd  $N = 0$ .

(1) $\Rightarrow$ (2) Z niezdegenerowania formy i rozkładu (15.125) wynika niezdegenerowanie formy na  $\mathfrak{h}$ .

Z nilpotentności  $\mathfrak{h}$  i kryterium Cartana wynika, że

$$\langle C | [A, B] \rangle = 0, \quad A, B, C \in \mathfrak{h}.$$

Zatem  $[\mathfrak{h}, \mathfrak{h}]$  jest ortogonalne do  $\mathfrak{h}$ . Z niezdegenerowania formy na  $\mathfrak{h}$  wynika, że  $[\mathfrak{h}, \mathfrak{h}] = \{0\}$ . Zatem  $\mathfrak{h}$  jest przemienna.

Niech  $A \in \mathfrak{h}$  i niech  $A = S + N$  będzie kanonicznym rozkładem na część półprostą i nilpotentną. ....  $\square$

### 16.2 Zbiór pierwiastków półprostej algebry Liego

Ustalmy zespoloną półprostą algebrę Liego  $\mathfrak{g}$  z algebrą Cartana  $\mathfrak{h}$ . Niech  $\mathcal{R} \subset \mathfrak{h}^\#$  oznacza zbiór niezerowych funkcyjałów pierwiastkowych. Dla  $\alpha \in \mathcal{R}$ , będziemy pisać  $\mathfrak{g}^\alpha$  zamiast  $\mathfrak{g}^\alpha(\mathfrak{h})$

Dla  $\alpha \in \mathfrak{h}^\#$  definiujemy  $\alpha^\# \in \mathfrak{h}$  wzorem

$$\langle \alpha^\# | A \rangle = \alpha(A).$$

Niech  $\mathcal{R}^\# := \{\alpha^\# : \alpha \in \mathcal{R}\}$ .

Przenosimy iloczyn z  $\mathfrak{h}$  na  $\mathfrak{h}^\#$  przez dualność:

$$\langle \alpha | \beta \rangle := \langle \alpha^\# | \beta^\# \rangle.$$

Dla  $\alpha, \beta \in \mathcal{R}$  definiujemy macierz Cartana i macierz Coxetera

$$M(\alpha, \beta) := \frac{2\langle \alpha | \beta \rangle}{\langle \alpha | \alpha \rangle},$$

$$C(\alpha, \beta) := \frac{\langle \alpha | \beta \rangle}{\sqrt{\langle \alpha | \alpha \rangle} \sqrt{\langle \beta | \beta \rangle}}.$$

**Twierdzenie 16.2** (1)  $\alpha \in \mathcal{R}$  implikuje  $-\alpha \in \mathcal{R}$ .

(2)  $A_\pm \in \mathfrak{g}^{\pm\alpha}$  implikuje  $[A_+, A_-] = \langle A_+ | A_- \rangle \alpha^\#$ .

(3)  $\alpha \in \mathcal{R}$  implikuje  $\langle \alpha | \alpha \rangle = \alpha(\alpha^\#) \neq 0$ . Zatem możemy zdefiniować  $H_\alpha := \frac{2\alpha^\#}{\langle \alpha | \alpha \rangle}$ .

(4) Jeśli  $A_\pm$  są niezerowymi elementami  $\mathfrak{g}^{\pm\alpha}$ , to podalgebra Liego generowana przez  $A_+, A_-$  i  $\alpha^\#$  jest izomorficzna z  $sl(2)$ .

(5)  $\alpha \in \mathcal{R}$  implikuje  $\dim \mathfrak{g}^\alpha = 1$ .

(6)  $H_1, H_2 \in \mathfrak{h}$  implikuje

$$\langle H_1 | H_2 \rangle = \sum_{\alpha \in \mathcal{R}} \alpha(H_1) \alpha(H_2). \quad (16.126)$$

(7)  $\mathcal{R}^\#$  generuje liniowo  $\mathfrak{h}$ .

(8) Niech  $\alpha, \beta \in \mathcal{R}$ . Wtedy  $M(\alpha, \beta)$  jest liczbą całkowitą.

(9) Jeśli  $\alpha \in \mathcal{R}$ ,  $t \in \mathbb{C}$  i  $t\alpha \in \mathcal{R}$ , to  $t = \pm 1$ .

(10) Możliwe niezerowe wartości  $M(\alpha, \beta)$  to

(i)  $M(\alpha, \beta) = M(\beta, \alpha) = \pm 2$ , wtedy  $C(\alpha, \beta) = \pm 1$  i  $\beta = \pm \alpha$

(ii)  $M(\alpha, \beta) = M(\beta, \alpha) = \pm 1$ , wtedy  $C(\alpha, \beta) = \pm \frac{1}{2}$  i  $\alpha, \beta$  mają tę samą długość.

(iii)  $M(\alpha, \beta) = \pm 2$ ,  $M(\beta, \alpha) = \pm 1$ , wtedy  $C(\alpha, \beta) = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$  i  $\beta$  jest  $\sqrt{2}$  razy dłuższy od  $\alpha$ .

(iv)  $M(\alpha, \beta) = \pm 3$ ,  $M(\beta, \alpha) = \pm 1$ , wtedy  $C(\alpha, \beta) = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$  i  $\beta$  jest  $\sqrt{3}$  razy dłuższy od  $\alpha$ .

(11) Niech  $\alpha, \beta, \alpha + \beta \in \mathcal{R}$ . Wtedy  $M(\alpha, \beta) < 0$ , istnieją  $n_\pm \in \mathbb{Z}$  takie, że  $-M(\alpha, \beta) = n_+ - n_-$ ,

$$\alpha + k\beta \in \mathcal{R}, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad n_- \leq k \leq n_+.$$

(12)  $\mathcal{R}$  jest niezmienniczy względem odbicia w hiperpłaszczyźnie prostopadłej do  $\beta \in \mathcal{R}$ . Czyli  $\alpha, \beta \in \mathcal{R}$  implikuje  $\alpha - \frac{2\langle \alpha | \beta \rangle \beta}{\langle \beta | \beta \rangle} \in \mathcal{R}$ .

**Dowód.** (1) Forma  $\langle \cdot | \cdot \rangle$  jest nieosobliwa na  $\mathfrak{g}^\alpha \oplus \mathfrak{g}^{-\alpha}$ , oraz zerowa na  $\mathfrak{g}^\alpha$  i  $\mathfrak{g}^{-\alpha}$ . Zatem  $\dim \mathfrak{g}^\alpha = \dim \mathfrak{g}^{-\alpha}$ .

(2) Niech  $H \in \mathfrak{h}$ .

$$\begin{aligned} \langle [A_+, A_-] | H \rangle &= \langle A_+ | [A_-, H] \rangle \\ &= \langle A_+ | A_- \rangle \alpha(H) = \langle A_+ | A_- \rangle \langle \alpha^\# | H \rangle. \end{aligned}$$

Zatem,  $[A_+, A_-] - \langle A_+ | A_- \rangle \alpha^\#$  jest ortogonalny do  $\mathfrak{h}$ , więc równy 0.

(3) Przypuśćmy, że  $\alpha(\alpha^\#) = 0$ . Niech  $A_\pm \in \mathfrak{g}^{\pm\alpha}$ ,  $\langle A_+ | A_- \rangle = 1$ . Wtedy  $[\alpha^\#, A_\pm] = \pm\alpha(\alpha^\#)A_\pm = 0$ ,  $[A_+, A_-] = \alpha^\#$ . Zatem  $A_+$ ,  $A_-$  i  $\alpha^\#$  rozpinają 3-wymiarową podalgebrę nilpotentną. Rozpatrzmy reprezentację dołączoną tej podalgebry. Operator  $\text{ad}(\alpha^\#)$  ma na przekątnej wyrazy zerowe, więc jest nilpotentny. Ale  $\alpha^\# \in \mathfrak{h}$ , więc  $\text{ad}(\alpha^\#)$  jest półprosty. Zatem  $\text{ad}(\alpha^\#) = 0$ , skąd  $\alpha^\# = 0$ , co jest niezgodne z założeniem.

(4) Mnożąc  $A_\pm$  przez odpowiednie czynniki dostajemy  $\langle A_+ | A_- \rangle = \frac{2}{\langle \alpha^\# | \alpha^\# \rangle}$ . Wtedy dostajemy  $[H_\alpha, A_\pm] = \pm 2A_\pm$ ,  $[A_+, A_-] = H_\alpha$ .

(5) Załóżmy, że  $\dim \mathfrak{g}^\alpha > 1$ . Wtedy  $\dim \mathfrak{g}^{-\alpha} > 1$ . Znajdziemy zatem  $A_\pm \in \mathfrak{g}^{\pm\alpha}$ ,  $B \in \mathfrak{g}^{-\alpha}$  takie, że  $\langle A_+ | A_- \rangle = \frac{2}{\langle \alpha^\# | \alpha^\# \rangle}$  i  $\langle A_+ | B \rangle = 0$ . Maj  $\text{ad}(A^+)B = 0$  i  $\text{ad}(H_\alpha)B = -2B$ . Zatem  $B$  jest wektorem najwyższej wagi dla reprezentacji  $\text{Span}(A_+, A_-, H) \simeq \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$  z wagą  $-2$ . Reprezentacja taka nie jest skończenie wymiarowa. Więc  $B = 0$ .

(6) Niech  $H \in \mathfrak{h}$ ,  $A \in \mathfrak{g}$ . Mamy rozkład  $A = A_0 + \sum_{\alpha \in \mathcal{R}} A_\alpha$  i  $\text{ad}(H)A = \sum_{\alpha \in \mathcal{R}} \alpha(H)A_\alpha$ . Biorąc pod uwagę, że  $\dim \mathfrak{g}^\alpha = 1$  dostajemy

$$\text{Tr ad}(H_1)\text{ad}(H_2) = \sum_{\alpha \in \mathcal{R}} \alpha(H_1)\alpha(H_2).$$

(7) Jeśli wzór (16.126) przepiszemy jako

$$\langle H_1 | H_2 \rangle = \sum_{\alpha \in \mathcal{R}} \langle H_1 | \alpha^\# \rangle \langle \alpha^\# | H_2 \rangle,$$

to widzimy, że  $H \perp \text{Span} \mathcal{R}^\#$  oznacza  $\langle H | H \rangle = 0$ .

(8) Z własności skończenie wymiarowych reprezentacji  $\mathfrak{sl}(2\mathbb{C})$  wynika, że  $\text{ad}(H_\alpha)$  ma całkowite wartości własne. Dla  $B \in \mathfrak{g}^\beta$  mamy

$$\text{ad}(H_\alpha)B = \frac{2\langle \alpha^\# | \beta^\# \rangle}{\langle \alpha^\# | \alpha^\# \rangle} B.$$

(8) Niech  $\beta = t\alpha$ .

$$2t = \frac{2\langle \alpha^\# | \beta^\# \rangle}{\langle \alpha^\# | \alpha^\# \rangle}, \quad \frac{2}{t} = \frac{2\langle \alpha^\# | \beta^\# \rangle}{\langle \beta^\# | \beta^\# \rangle}$$

są całkowite, więc  $t \in \{1, -1, 2, -2, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\}$ . Wystarczy rozważyć  $t = 2$ .

Wybermy niezerowe  $A_\pm$  jak w dowodzie (4) i  $B_\pm \in \mathfrak{g}^{\pm 2\alpha}$ . Algebra Liego  $\text{Span}(A_+, A_-, H) \simeq \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$  działa na 5-wymiarową przestrzeń  $\text{Span}(A_+, A_-, B_+, B_-, H_\alpha)$  i ma w niej podprzestrzeń niezmienniczą  $\text{Span}(A_+, A_-, H)$ . Jako algebra półprosta, ma podprzestrzeń dopełniającą 2-wymiarową, w której  $H_\alpha$  ma wartości własne 2, -2, co jest niemożliwe.

(9) Jeśli  $\alpha$  i  $\beta$  nie są równoległe, to

$$M(\alpha, \beta)M(\beta, \alpha) = 4C(\alpha, \beta)^2 < 4.$$

Poza tym,  $M(\alpha, \beta)$  i  $M(\beta, \alpha)$  mają ten sam znak.

(10) Niech

$$n_+ := \sup \left\{ n : \mathfrak{g}^{\beta+n\alpha} \neq \{0\} \right\}, \quad n_- := \inf \left\{ n : \mathfrak{g}^{\beta+n\alpha} \neq \{0\} \right\}.$$

Rozważmy przestrzeń

$$\alpha := \bigoplus_{n=n_-}^{n_+} \mathfrak{g}^{\beta+n\alpha}.$$

Wyberzmy niezerowe  $B_{\pm} \in \mathfrak{g}^{\beta+n_{\pm}\alpha}$  oraz niech  $A_{\pm}$  będzie jak w dowodzie (4). Mamy

$$[H_{\alpha}, B_{\pm}] = \frac{2\langle \alpha^{\#} | \beta^{\#} \rangle + 2n_{\pm} \langle \alpha^{\#} | \alpha^{\#} \rangle}{\langle \alpha^{\#} | \alpha^{\#} \rangle} B_{\pm} = (m(\alpha, \beta) + 2n_{\pm}) B_{\pm}.$$

Poza tym,  $[A_{\pm}, B_{\pm}] = 0$ , (bo  $\mathfrak{g}^{\beta+(n_{\pm}\pm 1)\alpha} = \{0\}$ ). Niech  $\mathfrak{a}_{\pm}$  będą minimalnymi podprzestrzeniami niezmienniczymi dla  $\text{Span}(A_{+}, A_{-}, H) \simeq \mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$  zawierającymi  $B_{\pm}$ . Z teorii reprezentacji  $\mathfrak{sl}(2, \mathbb{C})$  wynika, że  $\dim \mathfrak{a}_{-} = -M(\alpha, \beta) - 2n_{-} + 1$ ,  $\dim \mathfrak{a}_{+} = M(\alpha, \beta) + 2n_{+} + 1$ . Zatem,

$$\begin{aligned} \dim \mathfrak{a}_{+} + \dim \mathfrak{a}_{-} &= -2n_{-} + 2n_{+} + 2 \\ &= 2 \dim \mathfrak{a} > \dim \mathfrak{a}. \end{aligned}$$

Zatem  $\mathfrak{a}_{+} \cap \mathfrak{a}_{-} \neq \{0\}$ . więc  $\mathfrak{a}_{+} = \mathfrak{a}_{-} = \mathfrak{a}$ . Poza tym,  $M(\alpha, \beta) = n_{-} + n_{+}$ .  $\square$

### 16.3 Układy pierwiastków

Niech  $\mathcal{R}$  będzie układem niezerowych wektorów  $\mathcal{R}$  w przestrzeni euklidesowej  $\mathcal{V}$ . Dla  $\alpha, \beta \in \mathcal{V}$  zdefiniujmy macierz Cartana i Coxetera tak jak wyżej. Mówimy, że  $\mathcal{R}$  jest *układem pierwiastków*, gdy

- (1)  $\mathcal{R}$  rozpiną  $\mathcal{V}$ .
- (2)  $\mathcal{R}$  jest niezmienniczy względem odbicia w hiperpłaszczyźnie prostopadłej do  $\beta \in \mathcal{R}$ . Czyli  $\alpha, \beta \in \mathcal{R}$  implikuje  $\alpha - \frac{2\langle \alpha | \beta \rangle \beta}{\langle \beta | \beta \rangle} \in \mathcal{R}$ .
- (3) Macierz Cartana jest całkowitoliczbową.
- (4)  $\alpha \in \mathcal{R}$  i  $t\alpha \in \mathcal{R}$  implikuje  $t = \pm 1$ .

**Twierdzenie 16.3** *Niech  $\mathcal{R}$  będzie układem pierwiastków. Wtedy własności (9) i (10) Twierdzenia 16.2 są spełnione.*

## 16.4 Pierwiastki dodatnie

Niech  $\mathcal{R}$  będzie układem pierwiastków w przestrzeni  $\mathcal{V}$ . Wybierzmy wektor  $v_0 \in \mathcal{V}$  taki, że  $\alpha(v_0) \neq 0$ ,  $\alpha \in \mathcal{R}$ . To pozwala nam podzielić  $\mathcal{R}$  na dwa rozłączne podzbiory

$$\begin{aligned}\mathcal{R}_+ &:= \{\alpha \in \mathcal{R} : \alpha(v_0) > 0\}, \\ \mathcal{R}_- &:= \{\alpha \in \mathcal{R} : \alpha(v_0) < 0\} = -\mathcal{R}_+.\end{aligned}$$

Mówimy, że  $\alpha \in \mathcal{R}_+$  jest *nierozkładalny* (lub *prosty*), jeśli nie można go zapisać jako  $\alpha = \beta + \gamma$ ,  $\beta, \gamma \in \mathcal{R}_+$ .

Mówimy, że  $\mathcal{F} \subset \mathcal{R}$  jest *układem fundamentalnym*, jeśli istnieje  $v_0 \in \mathcal{V}$  takie, że  $\mathcal{F}$  jest zbiorem pierwiastków nierozkładalnych w  $\mathcal{R}$ .

**Twierdzenie 16.4** (1) *Jeśli  $\alpha, \beta \in \mathcal{R}_+$  są nierozkładalne, to  $\langle \alpha | \beta \rangle \leq 0$ .*

(2) *Każdy  $\alpha \in \mathcal{R}_+$  jest liniową kombinacją prostych pierwiastków z całkowitymi nieujemnymi współczynnikami.*

(3) *Zbiór prostych pierwiastków jest bazą przestrzeni  $\mathcal{V}$ .*

**Dowód.** (1) Jeśli  $\alpha - \beta = \gamma \in \mathcal{R}$ , to  $\gamma \in \mathcal{R}_+$  lub  $\gamma \in \mathcal{R}_-$ . W pierwszym przypadku,  $\alpha = \gamma + \beta$  nie jest pierwiastkiem prostym, w drugim  $\beta = \alpha + (-\gamma)$  nie jest pierwiastkiem prostym. Zatem  $\alpha - \beta \notin \mathcal{R}$ . A więc,  $\langle \alpha | \beta \rangle \leq 0$  wynika z Tw. 16.2.

(2) Jeśli  $\alpha \in \mathcal{R}_+$  nie jest prosty, może być zapisany jako  $\alpha = \beta + \gamma$ ,  $\beta, \gamma \in \mathcal{R}_+$ . Powtarzając ten krok dostajemy w końcu rozkład. Ponieważ  $\{\alpha(v_0) : \alpha \in \mathcal{R}_+\}$  jest zbiorem skończonym, stanie się to po skończonej liczbie kroków.

(3) Wystarczy pokazać liniową niezależność. Załóżmy, że  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  są proste i  $m_1\alpha_1 + \dots + m_n\alpha_n = 0$ . Możemy założyć, że  $m_1, \dots, m_p \geq 0$  a pozostałe współczynniki są  $\leq 0$  i napisać

$$m_1\alpha_1 + \dots + m_p\alpha_p = k_{p+1}\alpha_{p+1} + \dots + k_n\alpha_n =: \gamma,$$

gdzie  $k_{p+1}, \dots, k_n \geq 0$ . Mamy

$$0 \leq \langle \gamma | \gamma \rangle = \sum_{i=1}^p \sum_{j=p+1}^n m_i k_j \langle \alpha_i | \alpha_j \rangle \leq 0.$$

Zatem  $\gamma = 0$ . Stąd

$$0 = \gamma(v_0) = m_1\alpha_1(v_0) + \dots + m_p\alpha_p(v_0),$$

co oznacza, że  $m_i = 0$ ,  $i = 1, \dots, p$ . Podobnie pokazujemy, że  $m_j = 0$ ,  $j = p+1, \dots, n$ .  $\square$

## 16.5 Grupa Weyla

Niech  $\mathcal{V}$  będzie przestrzenią euklidesową. Dla  $\alpha \in \mathcal{V}$  definiujemy

$$S_\alpha \beta := \beta - \frac{2\langle \beta | \alpha \rangle \alpha}{\langle \alpha | \alpha \rangle}.$$

Zauważmy, że jeśli kąt między  $\alpha$  i  $\beta$  jest równy  $\theta$ , to  $S_\alpha S_\beta$  jest obrotem o kąt  $2\theta$  w płaszczyźnie zadanej przez  $\alpha, \beta$ . W szczególności, jeśli  $\theta = \pi/n$ , to  $(S_\alpha S_\beta)^n = \mathbb{1}$ .

Niech  $\mathcal{R}$  będzie układem pierwiastkowym. Grupą Weyla związaną z  $\mathcal{R}$  nazywamy grupę generowaną przez  $\{S_\alpha : \alpha \in \mathcal{R}\}$ . Oznaczamy ją przez  $\text{Weyl}_{\mathcal{R}}$ . Oczywiście,  $\mathcal{R}$  jest zbiorem na którym działa  $\text{Weyl}_{\mathcal{R}}$ .

Mówimy, że  $\mathcal{C}$  jest *komórką Weyla*, jeśli jest domknięciem składowej spójnej

$$\mathcal{V} \setminus \bigcup_{\alpha \in \mathcal{R}} \pi_\alpha,$$

gdzie  $\pi_\alpha := \{\beta \in \mathcal{V} : \langle \beta | \alpha \rangle = 0\}$ . Mówimy, że  $\pi_\alpha$  jest *ścianą komórki Weyla*  $\mathcal{C}$ , jeśli jej otwarta niepusta część zawarta w brzegu  $\mathcal{C}$ . Wtedy  $\alpha$  ma określony znak na  $\mathcal{C}$ .

**Twierdzenie 16.5** (1) *Dla każdej pary  $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2$  komórek Weyla istnieje dokładnie jeden  $W \in \text{Weyl}_{\mathcal{R}}$  taki, że  $W\mathcal{C}_1 = \mathcal{C}_2$ .*

(2) *Niech  $\mathcal{C}$  będzie komórką Weyla. Wtedy*

$$\mathcal{F}(\mathcal{C}) := \{\alpha \in \mathcal{R} : \pi_\alpha \text{ jest ścianą } \mathcal{C} \text{ i } \alpha \geq 0 \text{ na } \mathcal{C}\}$$

*jest układem fundamentalnym.*

(3) *Niech  $\mathcal{F} \subset \mathcal{R}$  będzie układem fundamentalnym. Wtedy*

$$\mathcal{C}(\mathcal{F}) := \{\beta \in \mathcal{V} : \langle \beta | \alpha \rangle \geq 0, \alpha \in \mathcal{F}\}$$

*jest komórką Weyla.*

(4) *Niech  $\alpha \in \mathcal{R}$ . Wtedy  $W\alpha = \mathcal{R}$ .*

## 16.6 Reprezentacje algebr Liego

Rozważmy reprezentację algebry Liego  $\mathfrak{g}$  na przestrzeni zespolonej  $\mathcal{V}$ . Dla uproszczenia notacji będziemy zakładać, że  $\mathfrak{g} \subset \mathfrak{gl}(\mathcal{V})$ . Ustalmy algebrę Cartana  $\mathfrak{h} \subset \mathfrak{g}$ .  $\beta \in \mathfrak{h}^\#$  nazywamy *wagą*, gdy odpowiada ją jej *przestrzeń wagowa*

$$\mathcal{V}^\beta := \{v \in \mathcal{V} : Hv = \beta(H)v, H \in \mathfrak{h}\}$$

jest niezerowa. Zbiór wag oznaczamy przez  $\mathcal{W}(\mathcal{V})$ . *Krotność wagi  $\beta$  jest równa  $m^\beta(\mathcal{V}) := \dim \mathcal{V}^\beta$ .*

**Twierdzenie 16.6** *Niech  $\mathfrak{g}$  będzie półprostą algebrą Liego.*

(1) *Niech  $\alpha \in \mathcal{R}$ ,  $\beta \in \mathcal{W}(\mathcal{V})$ . Wtedy*

$$\frac{2\langle \alpha | \beta \rangle}{\langle \alpha | \alpha \rangle} \in \mathbb{Z}.$$

(2) *Niech  $\alpha \in \mathcal{R}$ ,  $\beta \in \mathcal{W}(\mathcal{V})$  Wtedy istnieją  $n_\pm \in \mathbb{Z}$  takie, że  $-\frac{2\langle \alpha | \beta \rangle}{\langle \alpha | \alpha \rangle} = n_+ - n_-$ , i*

$$\alpha + k\beta \in \mathcal{R}, \quad k \in \mathbb{Z}, \quad n_- \leq k \leq n_+.$$

(3)  $\mathcal{W}(\mathcal{V})$  jest niezmienniczy względem odbicia w hiperpłaszczyźnie prostopadłej do  $\beta \in \mathcal{R}$ . Czyli  $\alpha \in \mathcal{W}(\mathcal{V})$ ,  $\beta \in \mathcal{R}$  implikuje  $\alpha - \frac{2\langle\alpha|\beta\rangle\beta}{\langle\beta|\beta\rangle} \in \mathcal{W}(\mathcal{V})$ .

Niech  $L_{\mathcal{R}}$  oznacza kratę rozpiętą przez  $\mathcal{R}$  – kratę pierwiastkową. Niech  $L_{\mathcal{W}}$  oznacza kratę wagową, zadaną przez

$$L_{\mathcal{W}} := \left\{ \beta \in \mathfrak{h}^{\#} : \frac{2\langle\alpha|\beta\rangle}{\langle\alpha|\alpha\rangle} \in \mathbb{Z}, \alpha \in \mathcal{R} \right\}.$$

Wtedy  $L_{\mathcal{R}}$  jest podkratą w  $L_{\mathcal{W}}$ .

## 16.7 Konstrukcja Schura-Weyla

Diagramem Younga będziemy nazywali nierosnący ciąg liczb naturalnych lub zer  $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots$ , od pewnego miejsca zerowy. Czasami bierzemy pod uwagę tylko niezerowe elementy, dostając ciąg skończony. Rysujemy go w postaci ułożonych obok na siebie kwadratów (okienek), po  $\lambda_i$  w  $i$ ym wierszu. Wielkością diagramu Younga nazywamy  $|\lambda| := \lambda_1 + \lambda_2 + \dots$ .

Dualny diagram Younga jest zdefiniowany jako

$$\lambda'_k := \max\{m : \lambda_m \geq k\}.$$

Tablicą Younga nazywamy diagram Younga z wpisanymi w okienka kolejne liczby naturalne  $1, \dots, |\lambda|$ . Na przykład, można wpisać liczby po kolei. Wtedy będziemy utożsamiać diagram z tablicą.

Dualną tablicą Younga nazywamy tablicę Younga odbitą w przekątnej. Odpowiada ona dualnemu diagramowi Younga.

Niech  $\tau$  będzie tablicą Younga o wielkości  $n$ . Wiążemy z nią dwie podgrupy w  $S_n$ :

$$\begin{aligned} S_{\text{row},\tau} &= \{\text{permutacje z } S_n \text{ nie mieszające elementów w wierszach}\} \\ S_{\text{col},\tau} &= \{\text{permutacje z } S_n \text{ nie mieszające elementów w kolumnach}\}. \end{aligned}$$

Oczywiście,

$$\begin{aligned} S_{\text{row},\tau} &= S_{\lambda_1} \times S_{\lambda_2} \times \dots, \\ S_{\text{col},\tau} &= S_{\lambda'_1} \times S_{\lambda'_2} \times \dots. \end{aligned}$$

Definiujemy następujące rzuty w algebrze grupowej  $C[S_n]$ :

$$\begin{aligned} \Theta_{\text{row},\tau} &:= \frac{1}{|S_{\text{row},\tau}|} \sum_{\sigma \in S_{\text{row},\tau}} \sigma, \\ \Theta_{\text{col},\tau} &:= \frac{1}{|S_{\text{col},\tau}|} \sum_{\sigma \in S_{\text{col},\tau}} \text{sgn}(\sigma)\sigma. \end{aligned}$$

Niech

$$\mathfrak{A}_{\tau} = \Theta_{\text{row},\tau} \Theta_{\text{col},\tau} C[S_n]$$

Jest to przestrzeń niezmiennicza dla prawej regularnej reprezentacji grupy  $S_n$ . Nazwijmy ją  $(\pi_{\tau}, \mathfrak{A}_{\tau})$ .



**Twierdzenie 16.7** (1)  $\pi_\tau$  są nieprzywiedlnymi reprezentacjami grupy  $S_n$ .

(2) Każda nieprzywiedlna reprezentacja  $S_n$  jest postaci  $\pi_\tau$ .

(3)  $\pi_{\tau_1} \simeq \pi_{\tau_2}$  wtedy i tylko wtedy gdy diagramy Younga tablic  $\tau_1$  i  $\tau_2$  są takie same.

(4)  $\pi_{\tau'}$  jest równoważna iloczynowi reprezentacji znakowej i  $\pi_\tau$ .

## 16.8 Reprezentacje $SL(n, \mathbb{C})$

Rozważmy przestrzeń  $\mathcal{V}$ . Rozważmy reprezentację grupy  $\rho : G \rightarrow GL(\mathcal{V})$ , albo algebry Liego  $\rho : \mathfrak{g} \rightarrow gl(\mathcal{V})$ . Mamy wtedy naturalne reprezentacje  $\otimes^n \rho : G \rightarrow GL(\otimes^n \mathcal{V})$ ,  $d \otimes^n \rho : \mathfrak{g} \rightarrow gl(\otimes^n \mathcal{V})$

Mamy naturalną reprezentację  $S_n$  na  $\otimes^n \mathcal{V}$ . Reprezentacja grupy  $S_n$  komutuje z  $\otimes^n \rho$  i  $d \otimes^n \rho$ . Dlatego też komutuje z rzutami  $\Theta_{\text{row}, \tau}$  i  $\Theta_{\text{col}, \tau}$ . Zdefiniujemy

$$\mathcal{V}_\tau := \Theta_{\text{row}, \tau} \Theta_{\text{col}, \tau} \otimes^n \mathcal{V},$$

gdzie  $\tau$  jest pewną tablicą Younga. Jest to podprzestrzeń niezmiennicza dla  $\otimes^n \rho$ . Niech  $\rho_\tau$  oznacza reprezentację  $\otimes^n \rho$  obciętą do  $\mathcal{V}_\tau$ .

W szczególności rozważmy grupę  $GL(n, \mathbb{C})$  i jej reprezentację fundamentalną na  $\mathbb{C}^n$ . Zauważmy, że dla  $\tau$  będącego kolumną o wysokości  $n$  mamy  $\rho_\tau(g) = \det g$ . Dlatego też po obcięciu do  $SL(n, \mathbb{C})$  dostajemy reprezentację trywialną.

Dla  $\tau$  będącego kolumną wysokości  $n - 1$  na  $GL(n, \mathbb{C})$  dostajemy reprezentację, która macierzy przyporządkowuje macierz dopełnień algebraicznych. Dlatego też, na  $SL(n, \mathbb{C})$  dostajemy reprezentację kontrgradientną.

Widać zatem, że dla grupy  $SL(n, \mathbb{C})$  wystarczy ograniczyć się do diagramów Younga, których wszystkie kolumny są niższe niż  $n$ .

Niech  $\tau$  będzie diagramem Younga. Diagram sprzężony definiujemy następująco. Kolumny o długości  $m$  zastępujemy przez kolumny o długości  $n - m$ . Następnie porządkujemy kolumny w kolejności malejącej. Diagram sprzężony oznaczamy przez  $\bar{\tau}$ .

**Twierdzenie 16.8** (1)  $\rho_\tau$  są nieprzywiedlnymi reprezentacjami grupy  $SL(n, \mathbb{C})$ .

(2) Każda skończenie wymiarowa nieprzywiedlna reprezentacja  $SL(n, \mathbb{C})$  jest postaci  $\rho_\tau$ .

(3)  $\rho_{\tau_1} \simeq \rho_{\tau_2}$  wtedy i tylko wtedy gdy diagramy Younga tablic  $\tau_1$  i  $\tau_2$  są takie same.

(4)  $\bar{\rho}_\tau = \rho_{\bar{\tau}}$ .

## 17 Globalna teoria grup Liego

### 17.1 Homotopia krzywych

Niech  $\mathcal{X}$  będzie rozmaitością i  $x_1, x_2 \in \mathcal{X}$ . Oznaczmy przez  $K(x_0, x_1, \mathcal{X})$  zbiór krzywych (gładkich, kawałkami ciągłych) zaczynających się w  $x_0$  i kończących się w  $x_1$ , tzn  $\gamma(0) = x_0$ ,  $\gamma(1) = x_1$ .

Niech  $\gamma_0, \gamma_1 \in K(x_0, x_1, \mathcal{X})$ . Mówimy, że  $\gamma_0$  jest homotopijnie równoważna  $\gamma_1$  i piszemy  $\gamma_0 \sim \gamma_1$  wtedy i tylko wtedy gdy istnieje funkcja ciągła  $[0, 1] \times [0, 1] \ni (t, s) \mapsto H(t, s)$  taka, że  $H(t, 0) = \gamma_0(t)$  i  $H(t, 1) = \gamma_1(t)$ .

**Twierdzenie 17.1** *Homotopijna równoważność jest relacją równoważności.*

**Dowód.** Kładąc  $H(t, s) = \gamma_0(t)$  dostajemy  $\gamma_0 \sim \gamma_0$ .

Kładąc  $H_{10}(t, s) := H_{01}(t, 1 - s)$  dostajemy  $\gamma_0 \sim \gamma_1 \Rightarrow \gamma_1 \sim \gamma_0$ .

Kładąc

$$H_{02}(t, s) := \begin{cases} H_{01}(t, 2s), & 0 \leq s \leq \frac{1}{2}; \\ H_{12}(t, 2s - 1), & \frac{1}{2} \leq s \leq 1, \end{cases}$$

dostajemy  $\gamma_0 \sim \gamma_1$ ,  $\gamma_1 \sim \gamma_2 \Rightarrow \gamma_0 \sim \gamma_2$ .  $\square$

Zbiór klas homotopii krzywych zaczynających się w  $x_0$  i kończących w  $x_1$  oznaczany jest przez

$$\Pi(x_0, x_1, \mathcal{X}) := K(x_0, x_1, \mathcal{X}) / \sim.$$

**Twierdzenie 17.2** *Niech  $\mathcal{X}$  będzie spójna. Następujące warunki są równoważne:*

- (1)  $\Pi(x_0, x_1, \mathcal{X})$  jest jednoelementowy dla każdego  $x_0, x_1 \in \mathcal{X}$ .
- (2) Istnieje  $x_0 \in \mathcal{X}$  taki, że  $\Pi(x_0, x_0, \mathcal{X})$  jest jednoelementowy.

Jeśli spełnione są warunki powyższego twierdzenia, mówimy, że zbiór  $\mathcal{X}$  jest jednospójny.

## 17.2 Składanie krzywych i grupa homotopii

Niech  $\gamma \in K(x_0, x_1, \mathcal{X})$ . Definiujemy  $\gamma^{-1} \in K(x_1, x_0, \mathcal{X})$ .

$$\gamma^{-1}(t) := \gamma(1 - t).$$

Oczywiście, jeśli  $\gamma' \sim \gamma$ , to  $(\gamma')^{-1} \sim \gamma^{-1}$ .

Niech  $x_0, x_1, x_2 \in \mathcal{X}$ ,  $\gamma_0 \in K(x_0, x_1, \mathcal{X})$ ,  $\gamma_1 \in K(x_1, x_2, \mathcal{X})$ . Definiujemy  $\gamma_0 \circ \gamma_1 \in K(x_0, x_2, \mathcal{X})$ :

$$\gamma_0 \circ \gamma_1(t) := \begin{cases} \gamma_0(2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}; \\ \gamma_1(2t - 1), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Oczywiście, jeśli  $\gamma_0 \sim \gamma'_0$ ,  $\gamma_1 \sim \gamma'_1$ , to

$$\gamma_0 \circ \gamma_1 \sim \gamma'_0 \circ \gamma'_1.$$

Jeśli  $\gamma_2 \in K(x_2, x_3, \mathcal{X})$

$$(\gamma_0 \circ \gamma_1) \circ \gamma_2 \sim \gamma_0 \circ (\gamma_1 \circ \gamma_2).$$

Jeśli przez  $x$  oznaczamy krzywą stałą równą  $x \in \mathcal{X}$ , to dla  $x_0, x_1 \in \mathcal{X}$ ,  $\gamma \in K(x_0, x_1, \mathcal{X})$ ,

$$x_0 \circ \gamma \sim \gamma \circ x_1 \sim \gamma.$$

W szczególności, dla każdego  $x_0 \in \mathcal{X}$ ,  $\Pi(x_0, x_0, \mathcal{X})$  jest grupą. Jeśli zbiór  $\mathcal{X}$  jest spójny, to grupa  $\Pi(x_0, x_0, \mathcal{X})$  jest izomorficzna dla różnych  $x_0 \in \mathcal{X}$ . Nazywamy ją grupą homotopii zbioru  $\mathcal{X}$ . Oznaczamy ją przez  $\Pi(\mathcal{X})$ .

### Przykłady

- (1)  $\Pi(\mathbb{R}^n)$  jest grupą jednoelementową.

- (2)  $\Pi(S^1) = \Pi(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}) = \mathbb{Z}$  (liczba okrążeń wokół zera).
- (3) Niech  $a, b \in \mathbb{R}^2$ ,  $a \neq b$ . Wtedy  $\Pi(\mathbb{R}^2 \setminus \{a, b\}) = \mathbb{F}_2$  – grupa wolna o dwóch generatorach. Jako generatory można wybrać  $\tau_0$  – okrążenie  $a$ ,  $\tau_1$  – okrążenie  $b$ . Grupa  $\mathbb{F}_2$  składa się z elementów następujących typów:

$$\begin{aligned} \tau_1^{n_p} \tau_0^{m_p} \cdots \tau_1^{n_0} \tau_0^{m_0}, & \quad \tau_0^{m_{p+1}} \tau_1^{n_p} \cdots \tau_1^{n_0} \tau_0^{m_0}, \\ \tau_1^{n_p} \tau_0^{m_p} \cdots \tau_0^{m_1} \tau_1^{n_0}, & \quad \tau_0^{m_{p+1}} \tau_1^{n_p} \cdots \tau_0^{m_1} \tau_1^{n_0}, \end{aligned} \quad (17.127)$$

gdzie  $n_i, m_i \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ .

- (4)  $\Pi(S^n)$  jest trywialna dla  $n \geq 2$ . Na przykład,  $SU(2) \simeq S^3$  jest jednospójna.
- (5) W  $S^n$  wprowadzamy naturalne działanie grupy  $\mathbb{Z}_2$ . Przestrzeń orbit  $S^n/\mathbb{Z}_2$  nazywa się  $n$ -wymiarową przestrznią projektywną  $P\mathbb{R}^n$ . Dla  $n \geq 2$  ma ona grupę homotopii  $\mathbb{Z}_2$ . W szczególności,  $SO(3) \simeq SU(2)/\mathbb{Z}_2 \simeq P\mathbb{R}^3$  ma grupę homotopii  $\mathbb{Z}_2$ .

### 17.3 Nakrycia

Niech  $\mathcal{X}$  będzie rozmaitością spójną z punktem bazowym  $x_0 \in \mathcal{X}$ . Mówimy, że  $(\mathcal{Y}, \Phi, y_0)$  jest nakryciem  $(\mathcal{X}, x_0)$ , jeśli  $\mathcal{Y}$  jest spójną rozmaitością,  $\Phi : \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{X}$  jest gładkim odwzorowaniem,  $\Phi(y_0) = x_0$  i dla każdego  $x \in \mathcal{X}$  istnieje spójne otoczenie  $\mathcal{U} \subset \mathcal{X}$  zawierające  $x$  takie, że  $\Phi^{-1}(\mathcal{U}) = \bigcup_i \mathcal{W}_i$ , gdzie  $\mathcal{W}_i$  są spójne, otwarte i nieprzecinające się, oraz  $\Phi|_{\mathcal{W}_i}$  jest dyfeomorfizmem  $\mathcal{W}_i \rightarrow \mathcal{U}$ .

### 17.4 Nakrycie uniwersalne

Nakryciem uniwersalnym  $(\mathcal{X}, x_0)$  nazywamy  $(\mathcal{X}^{\text{uc}}, \Phi, [x_0])$ , gdzie

$$\mathcal{X}^{\text{uc}} := \bigcup_{x \in \mathcal{X}} \Pi(x_0, x, \mathcal{X}),$$

$\Phi^{\text{uc}} : \mathcal{X}^{\text{uc}} \rightarrow \mathcal{X}$  jest zadane przez  $\Phi^{\text{uc}}([\gamma]) := \gamma(1)$ .  $\mathcal{X}^{\text{uc}}$  jest wyposażone w naturalną strukturę rozmaitości.  $(\mathcal{X}^{\text{uc}}, \Phi^{\text{uc}}, [x_0])$  jest nakryciem  $(\mathcal{X}, x_0)$ .

Zauważmy, że  $\Pi(\mathcal{X}) = (\Phi^{\text{uc}})^{-1}(x_0)$ .

### 17.5 Nakrycie wyznaczone przez podgrupę grupy homotopii

Niech  $(\mathcal{Y}, \Phi, y_0)$  będzie nakryciem  $(\mathcal{X}, x_0)$ . Łatwo się przekonać, że  $\Phi$  indukuje homomorfizm  $\Pi(\mathcal{Y}, y_0) \rightarrow \Pi(\mathcal{X}, x_0)$ .

Niech  $K$  będzie podgrupą  $\Pi(x_0, x_0, \mathcal{X})$ . Dla  $x \in \mathcal{X}$ , w  $\Pi(x_0, x, \mathcal{X})$  wprowadzamy relację: Dla  $[\gamma_1], [\gamma_2] \in \Pi(x_0, x, \mathcal{X})$  piszemy  $[\gamma_1] \underset{K}{\sim} [\gamma_2]$ , gdy  $[\gamma_2^{-1} \circ \gamma_1] \in K$ . Jest to relacja równoważności. Będziemy oznaczali przez  $[\gamma]^K$  klasę abstrakcji  $\gamma$  względem tej relacji. Definiujemy

$$\Pi^K(x_0, x, \mathcal{X}) := \Pi(x_0, x, \mathcal{X}) / \underset{K}{\sim},$$

$$\mathcal{X}^K := \bigcup_{x \in \mathcal{X}} \Pi^K(x_0, x, \mathcal{X}),$$

$$\Phi^K([\gamma]^K) = \gamma(1).$$

Wtedy  $(\mathcal{X}^K, \Phi^K, [x_0]^K)$  jest nakryciem  $(\mathcal{X}, x_0)$ , którego grupą homotopii jest  $K$ .

Mamy oczywiście naturalne odwzorowanie

$$\Phi_K : \mathcal{X}^{\text{uc}} \rightarrow \mathcal{X}^K, \quad \Phi_K([\gamma]) = [\gamma]^K,$$

spełniające związek  $\Phi^K \circ \Phi_K = \Phi$ . Czyli  $(\mathcal{X}^{\text{uc}}, \Phi_K, [x_0])$  jest nakryciem  $(\mathcal{X}^K, [x_0]^K)$ .

## 17.6 Lokalna izomorficzność grup Liego

Będziemy mówili, że grupy Liego  $G_1$  i  $G_2$  są *lokalnie izomorficzne*, gdy istnieją otoczenia identyeczności  $\mathcal{O}_i \subset G_i$ ,  $i = 1, 2$ , i dyfeomorfizm  $\Phi : \mathcal{O}_1 \rightarrow \mathcal{O}_2$  taki, że  $g_1, g_2, g_1g_2 \in \mathcal{O}_1$  implikuje  $\Phi(g_1)\Phi(g_2) = \Phi(g_1g_2)$ . Jest to relacja równoważności.

**Twierdzenie 17.3** *Niech  $G$  będzie spójną grupą Liego i  $\mathcal{O}$  otwartym podzbiorem zawierającym  $\mathbb{1}$ . Wtedy  $\mathcal{O}$  generuje  $G$ , czyli*

$$G = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{O} \cdots \mathcal{O}.$$

**Dowód.** Niech  $G_0$  będzie prawą stroną. Jest oczywiście otwarta. Niech  $g \in G_0^{\text{cl}}$ . Wtedy istnieje ciąg  $(g_n)$  w  $G_0$  taki, że  $g_n \rightarrow g$ . Zatem  $gg_n^{-1} \rightarrow \mathbb{1}$ . Czyli dla dostatecznie dużych  $n$ ,  $gg_n^{-1} \in \mathcal{O}$ . Zatem  $g \in \mathcal{O}g_n \subset G_0$ . Stąd  $G_0$  jest domknięta. Ze spójności  $G$  wynika, że  $G = G_0$ .  $\square$

$Z(G)$  oznacza centrum grupy, tzn

$$Z(G) := \{z \in G : zg = gz, g \in G\}.$$

Oczywiście, każda podgrupa w centrum dowolnej grupy jest normalna.

**Twierdzenie 17.4** *Niech  $K$  będzie dyskretną podgrupą normalną w spójnej grupie Liego  $G$ .*

- (1) *Wtedy  $K$  jest zawarte w centrum grupy  $G$ .*
- (2) *Niech  $\Phi : G \rightarrow G/K$  będzie kanonicznym homomorfizmem. Wtedy  $Z(G/K) = \Phi(Z(G))$ . W szczególności,  $Z(G/K) \simeq Z(G)/K$ .*
- (3)  *$G/K$  jest lokalnie izomorficzna z  $G$ .*

**Dowód.** (1) Niech  $k \in K$ . Funkcja  $G \ni g \mapsto gkg^{-1} \in K$  jest ciągła. Dla  $g = \mathbb{1}$  jej wartością jest  $k$ . Ponieważ  $K$  jest dyskretna a  $G$  spójna, funkcja musi być stała. Więc  $gkg^{-1} = k$ ,  $g \in G$ .

(2) Oczywiście, korzystając z tego, że  $K \subset Z(G)$  dostajemy  $Z(G/K) \supset \Phi(Z(G))$ .

Niech  $b \in G$  i  $\Phi(b) \in Z(G/K)$ . Dla dowolnego  $g \in G$ ,

$$\mathbb{1}_{G/K} = \Phi(g)\Phi(b)\Phi(g)^{-1}\Phi(b)^{-1} = \Phi(gbg^{-1}b^{-1}). \quad (17.128)$$

Funkcja

$$G \ni g \mapsto bgb^{-1}b^{-1} \quad (17.129)$$

jest ciągła. Na mocy (17.128), ma ona wartości w dyskretnej grupie  $K$ .  $G$  jest spójne. Więc (17.129) jest stała. Dla  $g = \mathbb{1}$ , jej wartością jest  $\mathbb{1}$ . Więc

$$gbg^{-1}b^{-1} = \mathbb{1}, \quad g \in G.$$

□

**Twierdzenie 17.5** *Niech  $G_1$  będzie lokalnie izomorficzna z  $G_2$  i  $\Phi : \mathcal{O}_1 \rightarrow \mathcal{O}_2$  jest odwzorowaniem, o którym mowa w definicji lokalnej izomorficzności. Załóżmy, że  $\Phi$  rozszerza się do homomorfizmu  $\Phi : G_1 \rightarrow G_2$ . Wtedy takie rozszerzenie jest jednoznacznie wyznaczone i jego jądro jest dyskretną podgrupą normalną w  $G_1$ .*

## 17.7 Grupa homotopii grupy Liego

Niech  $G$  będzie spójną grupą Liego. Rozważając jej grupę homotopii, zawsze będziemy przyjmować, że  $\mathbb{1}$  jest punktem bazowym.

Niech  $G^{\text{uc}}$  będzie nakryciem uniwersalnym  $G$ . Wprowadzamy działanie na  $G^{\text{uc}}$ :

$$[\gamma_1][\gamma_2] := [\gamma_1\gamma_2],$$

gdzie  $\gamma_1\gamma_2(t) := \gamma_1(t)\gamma_2(t)$ . Niech  $\Phi^{\text{uc}}$  oznacza kanoniczne rzutowanie  $\Phi^{\text{uc}} : G^{\text{uc}} \rightarrow G$ .

**Twierdzenie 17.6**  *$G^{\text{uc}}$  jest grupą Liego i  $\Phi^{\text{uc}}$  jest surjektywnym homomorfizmem. Dlatego,  $G = G^{\text{uc}}/\text{Ker}\Phi^{\text{uc}}$ .  $\Pi(G)$  można utożsamić z  $\text{Ker}\Phi^{\text{uc}}$ , która jest dyskretną podgrupą normalną, i dlatego jest zawarta w centrum  $G^{\text{uc}}$ .*

Zatem w rodzinie lokalnie równoważnych ze sobą grup Liego można wyróżnić “maksymalną”  $G^{\text{uc}}$ , która jest jednospójna.

Pouczające jest sprawdzić niezależnie, że grupa homotopii grupy Liego  $G$  jest przemienna.

**Dowód.** Niech  $\gamma_i \in K(\mathbb{1}, \mathbb{1}, G)$ . Zdefiniujmy

$$s_1(t) := \begin{cases} (2t, 0), & 0 \leq t \leq 1/2, \\ (1, 2t - 1), & 1/2 \leq t \leq 1. \end{cases}, \quad s_2(t) := \begin{cases} (0, 2t), & 0 \leq t \leq 1/2, \\ (2t - 1, 0), & 1/2 \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Niech  $\Gamma(t_1, t_2) := \gamma_1(t_1)\gamma_2(t_2)$ . Wtedy  $[\gamma_1] \circ [\gamma_2]$  jest reprezentowane przez  $\Gamma(s_1(t))$  a  $[\gamma_2] \circ [\gamma_1]$  jest reprezentowane przez  $\Gamma(s_2(t))$ .

$\Gamma((1 - \theta)s_1(t) + \theta s_2(t))$  jest homotopią między nimi. □

Analizę spójnych grup Liego można ograniczyć do grup spójnych jednospójnych. Niech  $G$  taka będzie. Oznaczmy przez  $Z$  centrum  $G$ .

**Twierdzenie 17.7** (1) *Każda spójna grupa Liego lokalnie równoważna grupie  $G$  jest izomorficzna z  $G/K$ , gdzie  $K$  jest podgrupą dyskretną grupy  $Z$ .*

(2) *Centrum grupy  $G/K$  jest równe  $Z/K$ .*

(3) *Grupa homotopii  $G/K$  jest równa  $K$ .*

**Dowód.** (3) Niech  $[\gamma] \in \Pi(G/K)$ . Wtedy możemy podnieść  $\gamma$  do krzywej  $\tilde{\gamma} \in K(\mathbb{1}, k, G)$ , tak że przy homomorfizmie kanonicznym  $\Phi : G \rightarrow G/K$  mamy  $\Phi(\tilde{\gamma}(t)) = \gamma(t)$ . Oczywiście,  $k \in K$ . Dostajemy w ten sposób odwzorowanie  $\tilde{\Phi}([\gamma]) = k$ . Oczywiście, jest to surjektywny homomorfizm. Z jednoznaczności  $\tilde{G}$  sprawdzamy, że jest injektywny.  $\square$

W szczególności, jeśli centrum  $G$  jest dyskretne, to mamy też grupę minimalną  $G/Z$  z trywialnym centrum i grupą homotopii  $Z$ .