

WYKŁAD 20, 21

Całka Riemanna na \mathbb{R}^n

17 i 20 maja

1

CAŁKA RIEMANNA NA \mathbb{R}^n

Jak praktycznie liczyć całki po obszarach w \mathbb{R}^n
- zamiana na całkę iterowaną, zmiana kolejności całkowania

Po jakich zbiorach można całkować - zbiory miary Lebesgue'a zero, zbiory mierzalne w sensie Jordana.

Całka po kostce - definicja jak na \mathbb{R}^1

Alternatywna definicja - podziały wypunktowane


Jakie funkcje są całkwalne?

Zamiana zmiennych & całce wielokrotnej
Przekład jednostki

Kostka m -wymiarową nazywamy podzbiór \mathbb{R}^n będący iloczynem kartezjańskim odcinków:

$$K = [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \dots \times [a_n, b_n]$$


Kostka dwuwymiarowa to prostokąt, kostka trójwymiarowa to prostopadłościan. Rysunki będziemy robić w dwóch wymiarach.



Idea konstrukcji całki Riemanna wymaga, byśmy dzielił kostkę na mniejsze „podkostki” przybliżoli wartość całki sumując objętości „prostopadłościanów”, których podstawami są podkostki.

Mozna to robić na kilka równoważnych sposobów. Zacniemy od definicji identycznej z tą w jednym wymiarze.

Podział kostki uzyskujemy dzieląc każdy z odcinków. Dokładniej podziałem D nazywamy układ $\overline{J}_1, \dots, \overline{J}_n$ podziałów odcinków $[a_1, b_1], \dots, [a_n, b_n]$



Każdy odcinek $[a_i, b_i]$ dzieli się na p_i części. Kostka dzieli się na $P_1 \dots P_n$ części postaci

$$D_{j_1 \dots j_n} = I_{1, j_1} \times I_{2, j_2} \times \dots \times I_{n, j_n}$$

Potrzebne nam jest też objętość

(powierzchnia, miara...)

$$m(D_{j_1 \dots j_n}) = |I_{1, j_1}| \cdot |I_{2, j_2}| \cdot \dots \cdot |I_{n, j_n}|$$


Czasem kostki $D_{j_1 \dots j_n}$ wygodniej jest numerować "po kolei": D_k , $k = 1 \dots (p_1 \dots p_n)$. Podobnie jak w jednym wymiarze definiujemy

$$\overline{S}(\overline{J}_1, f) = \sum_k \sup_{x \in D_k} f(x) m(D_k) \quad \underline{S}(\overline{J}_1, f) = \sum_k \inf_{x \in D_k} f(x) m(D_k)$$

$$\overline{J} = (\overline{J}_1, \dots, \overline{J}_n)$$

W zbiorze podziałów kostki wprowadzamy relację skierowania: podział \overline{J} jest późniejszy niż ρ jeśli $\forall i \in 1 \dots n$ \overline{J}_i jest późniejszy niż ρ_i

$\overline{J} > \rho$ → podział na żółto jest późniejszy niż podział na czarno.



ograniczone

Mówimy, że f jest całkowalna na D jeśli


istnieją i są równe granice uogólnione

$\lim \overline{S}(\overline{J}_1, f)$, $\lim \underline{S}(\overline{J}_1, f)$. Ich wspólną wartość nazywamy

całką Riemanna z f po D i oznaczamy $\int_D f$

Tak zdefiniowana całka ma wszelkie potrzebne własności: funkcja stała jest całkowalna, całka jest liniowa ze względu na strukturę wektorową w zbiorze funkcji całkowalnych, całka jest monotoniczna, tzn $f \leq g \Rightarrow \int_D f \leq \int_D g$.

Ta definicja całki wymaga aby istniały pojęcia sup i inf w zbiorze wartości, w szczególności nie nadaje się do całkowania funkcji o wartościach wektorowych. Można temu zaradzić modyfikując nieco definicję i używając sumy wypunktowanej zamiast sumy górnej i dolnej.



Wypunktowanie podziału $\mathcal{J} = (\mathcal{J}_1, \dots, \mathcal{J}_n)$ to zbiór punktów $\xi_{j_1}, \dots, \xi_{j_n}$ $j_i \in 1 \dots p_i$ Czasem wygodniej numerować kolejnymi liczbami naturalnymi ξ_k $k=1 \dots (p_1 p_2 \dots p_n)$


Suma wypunktowana

$$S(\mathcal{J}, p, \xi) = \sum_k f(\xi_k) m(D_k)$$

W tym kontekście używa się innej relacji: składowanie. Niech $d(\mathcal{J})$ oznacza największą krawędź kostek podziału \mathcal{J} i.e. $d(\mathcal{J}) = \max \{ |I_{i,j_i}| : i=1 \dots n, j_i=1 \dots p_i \}$ Mówimy że \mathcal{J}' jest późniejszy niż \mathcal{J} jeśli $d(\mathcal{J}') \leq d(\mathcal{J})$

$\mathcal{J} \gg \mathcal{J}'$

Forma porównania



$$\lim_{\mathcal{J} \gg \mathcal{J}'} S(\mathcal{J}', f, \xi) = \lim_{\mathcal{J} \gg \mathcal{J}'} \bar{S}(\mathcal{J}', f) > \lim_{\mathcal{J} \gg \mathcal{J}'} \underline{S}(\mathcal{J}', f)$$

Prawdziwy jest fakt

FAKT: Jeśli ciąg uogólniony sum wypunktowanych jest zbieżny, to funkcja f jest całkowalna w sensie Riemanna i całka jest równa granicy ciągu sum wypunktowanych.

DOWÓD:

Zbieżność ciągu sum wypunktowanych oznacza, że $\forall \epsilon > 0 \exists \mathcal{J} \forall \xi$

$$g - \epsilon < S(\mathcal{J}, f, \xi) < g + \epsilon \quad \text{Ponadto} \quad \underline{S}(f, \mathcal{J}) = \inf_{(\xi)} S(\mathcal{J}, f, \xi)$$

$$\bar{S}(f, \mathcal{J}) = \sup_{(\xi)} S(\mathcal{J}, f, \xi)$$

Dla sumy górnej i dolnej zachodzi więc też

$$g - \epsilon < \underline{S}(f, \mathcal{J}) < \bar{S}(f, \mathcal{J}) < g + \epsilon$$

zatem spełnione jest kryterium całkowalności. \square

Okazuje się, że zachodzi też twierdzenie w drugą stronę:

FAKT: Jeśli f całkowalna na D to istnieje $\lim_{\gg} S(f, \mathcal{J}, \xi)$ i jest równa $\int_D f$.

Dowód:


Zauważmy że dla dowolnego wypunktowania podziału \mathcal{J} zachodzi nierówność $\underline{S}(f, \mathcal{J}) \leq S(\mathcal{J}, f, \xi) \leq \bar{S}(f, \mathcal{J})$

Zbadajmy $\lim_{\gg} \underline{S}(f, \mathcal{J})$ i $\lim_{\gg} \bar{S}(f, \mathcal{J})$ czyli bierzemy sumy górne i dolne oraz skierowanie, które normalnie odnosiło się do sumy wypunktowanej

Wiadomo, że dla $\epsilon > 0$ znaleźć można \mathcal{J}_ϵ takie, że dla \mathcal{J}_ϵ i każdego późniejszego względem \succ

$$\bar{S}(f, \mathcal{J}) - \int_D f < \epsilon \quad \text{i} \quad \int_D f - \underline{S}(f, \mathcal{J}) < \epsilon$$

Chcemy pokazać że \underline{S} i \bar{S} są zbieżne do tej samej granicy względem \gg .



Weźmiamo teraz podział ρ taki, że $d(\rho) < \delta$ dla pewnej mierzalnej języczki δ (ustalimy ją później). Będziemy dążyć, żeby $S(f, \rho)$ też była gotzies w pobliżu $\int_D f$. Nie bardzo potrafimy porównać $S(f, T_\varepsilon) = S(f, \rho)$.

Zrobimy to na raty: Pokażemy, że

→ $S(f, T_\varepsilon \cup \rho)$ jest w pobliżu $\int_D f$

→ $S(f, \rho)$ jest w pobliżu $S(f, T_\varepsilon \cup \rho)$

to jest łatwie: $T_\varepsilon \cup \rho > T_\varepsilon$ zatem

$S(f, T_\varepsilon \cup \rho)$ i $S(f, T_\varepsilon)$ spełniają


te same nierówności co $S(f, T)$ i

$S(f, T)$

trudniejsze - trzeba wybrać

odpowiednie δ

Weźmy przykładowy odcinek $[a_i, b_i]$



Liczbę odcinków podziału $T_\varepsilon \cup \rho$, które nie są odcinkami podziału ρ (czyli mają przy

najmniej jeden koniec z podziału T_ε) jest $\leq 2p_i$. Łączna ich długość $\leq 2p_i \delta$

Łączna objętość kostek z $T_\varepsilon \cup \rho$, które nie pokrywają się z ρ to liczbę \leq

$2(p_1 + p_2 + \dots + p_i) \delta \cdot d(D)^{m-1}$. Jeśli $\Delta = \sup_D f - \inf_D f$ to

$$S(\rho, f) - S(\rho \cup T_\varepsilon, f) < \underbrace{2(p_1 + \dots + p_i) \delta d(D)^{m-1}}_{\text{trzeba wybrać } \delta \text{ tak, żeby ta różnica była mała,}} < \varepsilon$$

trzeba wybrać δ tak, żeby ta różnica była mała,

$$\delta < \frac{\varepsilon}{2(p_1 + p_i) d(D)^{m-1}}$$

Skoro $S(f, \rho \cup T_\varepsilon)$ znajduje się nie dalej niż ε od $\int_D f$ oraz $S(f, \rho)$ znajduje się nie dalej niż ε od $S(f, \rho \cup T_\varepsilon)$ to ostatecznie $S(f, \rho)$ jest


Nie dalej niż 3ε od $\int_D f$. δ wyznaczone zostało przez ε i $\sqrt{\varepsilon}$ zatem obracanie zależy jedynie od ε . Jedynym warunkiem na ρ było $d(\rho) < \delta$. Każde $\rho' \gg \rho$ spełnia ten warunek zatem $\underline{S}(f, \mathcal{P})$ jest zbieżne także względem ρ' i do tej samej granicy.

6

Porra się teraz zastanowić jakie funkcje są całkowalne. To topic nie głęboko z pytaniem po jakich zbiorach, poza kostkami, można całkować. Zastanówmy się najpierw nad tymi zbiorami. W całości Riemanna na \mathbb{R}^1 dyskutowaliśmy klasę funkcji całkowalnych. Stwierdziliśmy, że jeśli f jest ograniczona i ma skończony przedział lubo punktów nieciągłości to jest całkowalna. Można też powiedzieć że wartości funkcji na przedziałnym podzbiore odinka nie mają znaczenie dla wartości całki. Pytanie czy przedziałne zbiory to są najcięższe zbiory mające taką własność?

DEFINICJA: Mówimy, że zbiór $X \subset \mathbb{R}^n$ ma miarę Lebesgue'a 0 jeśli $\forall \varepsilon > 0 \exists (D_i)_{i \in \mathbb{N}} X \subset \bigcup_{i \in \mathbb{N}} D_i \sum_{i=1}^{\infty} m(D_i) < \varepsilon$
 ↑
 ciąg kostek


PRZYKŁAD: (1) Skończony podzbiór \mathbb{R}^n jest mierny Lebesgue'a 0, (2) Przedziałny podzbiór w \mathbb{R}^n jest mierny Lebesgue'a 0 (3) „chudy” zbiór w \mathbb{R}^n jest mierny 0 np $X = \{(x, 0) : x \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^2$ jest mierny 0 - istotnie



Ciąg kostek $D_{\pm m}$ pokryje X , ponadto $m(D_{\pm m}) = \frac{1}{m^2} \delta$ zatem $\sum_{m=1}^{\infty} m(D_m) = \delta \cdot \frac{\pi^2}{6}$. Dla ustalonego ε wystarczy więc $\delta < \varepsilon \cdot \frac{6}{\pi^2}$

(4) Zbiór Cantora w \mathbb{R}^1 jest mierny Lebesgue'a 0 ale jest nieprzeliczalny:

7



Zbiory miary zero mają następujące pozytywne (i oczywiste) własności:

FAKT

(1) Jeśli X jest mierny zero i $Y \subset X$ to Y jest mierny zero

(2) Przeliczalna suma zbiorów mierny zero jest mierny zero

Niech X_i będzie mierny zero. Dla $\varepsilon > 0 \exists$ ciąg $D_{ij} \uparrow$ taki że $\sum_j m(D_{ij}) < \frac{\varepsilon}{2^i}$
 wtedy $\sum_{i,j} m(D_{ij}) < \varepsilon$ i $\bigcup_i X_i \subset \bigcup_{i,j} D_{ij}$ $X_i \subset \bigcup_j D_{ij}$

TWIERDZENIE Lebesgue'a o całkowalności w sensie Riemanna

Funkcja ograniczona na kostce domkniętej D jest całkowalna wtedy i tylko wtedy gdy zbiór punktów nieciągłości tej funkcji jest mierny Lebesgue'a 0.

Dla dowodu tego twierdzenia potrzebujemy nowego pojęcia.

DEFINICJA: Niech $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ będzie ograniczona. **Wahaniem** funkcji f w punkcie $x_0 \in D$ nazywamy

$$\omega(f, x_0) = \lim_{r \rightarrow 0} \left(\sup_{D \cap K(x_0, r)} f(x) - \inf_{D \cap K(x_0, r)} f(x) \right)$$

zauważcie jeśli f jest ciągła w x_0 to $\omega(f, x_0) = 0$ i odwrotnie - znikanie wahania oznacza ciągłość funkcji

W trakcie dowodu tw. Lebesgue'a potrzebne będą dwa fakty dotyczące wahania funkcji w punkcie

FAKT: Jeśli $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ jest ograniczona a D jest kostką domkniętą to zbiór $D_\varepsilon = \{x \in D: \omega(f, x) \geq \varepsilon\}$ jest domknięty w \mathbb{R}^n dla dowolnego $\varepsilon > 0$.

DOWÓD: D_ϵ ma być domknięty, zatem $\mathbb{R}^n \setminus D_\epsilon$ ma być otwarty. $\mathbb{R}^n \setminus D_\epsilon = (\mathbb{R}^n \setminus D) \cup (D \setminus D_\epsilon)$ zbiór $\mathbb{R}^n \setminus D$ jest otwarty. Trzeba więc pokazać, że $D \setminus D_\epsilon$ zawiera jedynie punkty wewnętrzne $\mathbb{R}^n \setminus D_\epsilon$, czyli
 jeśli $x_0: \omega(f, x_0) < \epsilon$ to istnieje $r: \forall x \in K(x_0, r) \cap D \quad \omega(f, x) < \epsilon$

8

Ustalmy więc $\epsilon > 0$ i weźmy $x_0 \in D: \omega(f, x_0) = \omega_0 < \epsilon$. Z definicji wahania wynika, że $\exists r > 0: \omega_0 \leq \sup_{x \in D \cap K(x_0, r)} f(x) - \inf_{x \in D \cap K(x_0, r)} f(x) < \epsilon$



zatem dla jeśli $r_x = r - \|x - x_0\|$ to
 $\sup_{y \in D \cap K(x, r_x)} f(y) - \inf_{y \in D \cap K(x, r_x)} f(y) < \epsilon$ tzn $\omega(f, x) < \epsilon$



FAKT: $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ ograniczona, D kostka domknięta, $\forall x \in D \quad \omega(f, x) < \epsilon$
 Istnieje podział π kostki D takie, że $\bar{\Sigma}(\pi, f) - \underline{\Sigma}(\pi, f) < \epsilon m(D)$

DOWÓD:
 Dla każdego $x \in D$ istnieje promień r_x taki, że $\sup_{D \cap K(x, r_x)} f(x) - \inf_{D \cap K(x, r_x)} f(x) < \epsilon$

Kule $K(x, r_x)$ mogą pokryć otwarte zbioru D . D jest zwarty, zatem można wybrać podpokrycie skończone. Ponieważ D jest kostką, kule można zastąpić kostkami, a następnie znaleźć taki podział, że każda kostka podziału zawiera się w jakiejś kule pokrycia. Podział ten spełnia żądany warunek.



Jesteśmy gotowi do udowodnienia tw. Lebesgue'a:

DOWÓD: (1) Jeśli f całkowalna to zbiór punktów nieciągłości jest miary zero. Punkty nieciągłości to punkty o dodatnim wahaniu. Oznaczamy $A_m = \{x \in D: \omega(f, x) \geq \frac{1}{m}\}$ zbiór punktów nieciągłości to $A = \bigcup_m A_m$. Pokażemy, że zbiór A_m jest miary Lebesgue'a 0. Ustalmy $\epsilon > 0$. Z całkowalności f wynika istnienie podziału π_m takiego, że $\bar{\Sigma}(f, \pi_m) - \underline{\Sigma}(f, \pi_m) < \frac{\epsilon}{m}$

Ponumerujemy kostki podziału \mathcal{J}_ε kolejnymi liczbami naturalnymi $1, \dots, p$. Niech P_0 oznacza podzbiór $\{1, \dots, p\}$ dany warunkiem $i \in P_0 \Leftrightarrow \text{int } D_i \cap A_n \neq \emptyset$

$$\frac{1}{n} \sum_{i \in P_0} m(D_i) \leq \sum_{i \in P_0} \left[\sup_{D_i} f(x) - \inf_{D_i} f(x) \right] m(D_i) \leq \bar{S}(f, \mathcal{J}_\varepsilon) - \underline{S}(f, \mathcal{J}_\varepsilon) < \frac{\varepsilon}{2n}$$

9

$$\downarrow$$

$$\sum_{i \in P_0} m(D_i) < \frac{\varepsilon}{2}$$

zadanej

Te punkty z A_n , które nie należą do wnętrza ε kostki z podziału \mathcal{J}_ε leżą na brzegach kostek zatem słaby zbiór miary zero. Możemy więc znaleźć ciąg kostek $(E_\ell)_{\ell \in \mathbb{N}}$ taki że punkty te zawarte są w $\bigcup_{\ell \in \mathbb{N}} E_\ell$ i $\sum_{\ell} m(E_\ell) < \frac{\varepsilon}{2}$ wtedy

$$A_n \subset \bigcup_{i \in P_0} D_i \cup \bigcup_{\ell} E_\ell \text{ oraz } \sum_{i \in P_0} m(D_i) + \sum_{\ell} m(E_\ell) < \varepsilon.$$

Liczba ε jest dowolna więc A_n jest miary 0. Prawdopodobnie suma zbiorów miary zero jest miary zero.

(2) Jeśli zbiór punktów nieciągłości $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ jest miary zero to f całkowalna.

A_n i A oznaczają to co poprzednio, tzn A miary zero i A_n też miary zero.

A_n jest domknięty (własni miary fakt) i ograniczony ($A_n \subset D$) zatem A_n jest zwarty. Weźmy teraz ciąg kostek $(E_\ell)_{\ell \in \mathbb{N}}$ taki, że $\sum_{\ell \in \mathbb{N}} m(E_\ell) < \frac{1}{n}$. Ze zwartości A_n wynika, że z ciągu (E_ℓ) można wybrać skończoną liczbę elementów zawartych w sumie A_n . Założmy, że numeracja jest taka, że $A_n \subset \bigcup_{\ell=1}^L E_\ell$ $\sum_{\ell=1}^L m(E_\ell) < \frac{1}{n}$

Bez straty ogólności można przyjąć że $E_\ell, \ell=1 \dots L$ stanowią elementy pewnego podziału \mathcal{J} zbioru D . Pozostałe (oprócz E_ℓ) kostki podziału oznaczmy $F_1 \dots F_p$ dla $i \in 1 \dots p$ $F_i \cap A_n = \emptyset$ tzn $\forall x \in \bigcup_{i=1}^p F_i$ $\omega(f, x) < \frac{1}{n}$

Z drugiego faktu dotyczącego wahań wynika że istnieje podział ρ_i zbioru F_i taki że różnica sumy górnej i dolnej nie przekracza $\frac{1}{n} m(F_i)$. Weźmy teraz podział σ drobniejszy od \mathcal{J} na części E i drobniejszy od ρ_k na każdym F_k .

$$\bar{S}(f, \sigma) - \underline{S}(f, \sigma) = \sum_{\ell=1}^L \sum_{B \in E_\ell} \left[\sup_P f(x) - \inf_P f(x) \right] m(P) + \sum_{i=1}^p \sum_{B \in F_i} \left[\sup_P f(x) - \inf_P f(x) \right] m(P)$$

$$\overline{\int}(f, \sigma) - \underline{\int}(f, \sigma) = \sum_{l=1}^L \sum_{B \in E_l} \underbrace{\left[\sup_P f(x) - \inf_P f(x) \right]}_{< 2M} m(P) + \sum_{i=1}^P \sum_{B \in F_i} \underbrace{\left[\sup_P f(x) - \inf_P f(x) \right]}_{\frac{1}{m} m(F_i)} m(P)$$

Objętość części E

↓

$$\leq 2M \cdot \frac{1}{m} + \sum_{i=1}^P \frac{1}{m} m(F_i) \leq \frac{1}{m} (2M + m(D))$$

Dowolnie małe

Funkcja f jest więc całkowalna. ■