

SEMESTR II WYKŁAD 4 WYŻSZE POCHODNE, EKSTREMA

Naszym celem jest teraz zdefiniowanie wyższych pochodnych odwzorowań między przestrzeniami Banacha. Zauważmy, że jeśli $f: X \supset U \rightarrow Y$ to $f: X \supset U \rightarrow B(X, Y)$. Kolejna pochodna powinna więc być odwzorowaniem $U \rightarrow B(X, B(X, Y))$. Należałoby więc rozważyć odwzorowanie liniowe o wartościach w przestrzeni odwzorowań liniowych.

Niech $L(n, X; Y)$ oznacza zbiór odwzorowań n -liniowych z $\underbrace{X \times \dots \times X}_n$ do Y .

STWIERDZENIE: Istnieje kanoniczny izomorfizm $L(X, L(X, L(\dots L(X, Y) \dots))) \simeq L(n, X; Y)$

DOWÓD: oczywisty

Do wyjaśnienia pozostałe następujące problemy: czy na poziomie odwzorowań ograniczonych też mamy izomorfizm $B(n, X; Y) \simeq B(X, B(X, \dots B(X, Y) \dots))$. Co to w ogóle jest $B(n, X; Y)$? Jak zdefiniować normę odwzorowania wieloliniowego ... itd.

STWIERDZENIE: Niech $F: \underbrace{X \times \dots \times X}_n \rightarrow Y$ będzie odwzorowaniem n -liniowym. Równoważne są warunki

- (1) F jest ciągłe (2) F jest ciągłe w 0 (3) F jest ograniczone, tzn $\sup_{\|x_i\| \leq 1} \|F(x_1, \dots, x_n)\| < \infty$

DOWÓD:

Dowód przebiega podobnie do przypadku $L(X, Y)$. W $X \times \dots \times X$ używamy normy $\|(x_1, \dots, x_n)\| = \max_i \|x_i\|$

Przeprowadzenie tego dowodu według schematu $\begin{matrix} (1) \Rightarrow (2) \\ (2) \Leftrightarrow (3) \end{matrix}$ jest zadaniem do samodzielnego wykonania (dla dwóch osób)

p. Korybalski i p. Tabarczak

DEFINICJA Liczbę $\sup_{\|x_i\| \leq 1} \|F(x_1, \dots, x_n)\|$ nazywamy normą odwzorowania F i oznaczamy $\|F\|$.

Łatwo sprawdzić się że $F \mapsto \|F\|$ jest rzeczywista normą. Odwzorowania ograniczone ze zbioru $L(n, X; Y)$ oznaczamy $B(n, X; Y)$. Jeśli X, Y są p. Banacha to $B(n, X; Y)$ także jest p. Banacha. Pozostaje do sprawdzić jak się ma $B(n, X; Y)$ do $B(X, B(X, \dots B(X, Y) \dots))$. Okazuje się że zadatek następujące stwierdzenie:

STWIERDZENIE: Niech $F \in B(X, B(X, \dots B(X, Y) \dots))$. Oznaczmy $Q_F \in L(n, X; Y)$ odwzorowanie

$Q_F(x_1, \dots, x_n) = ((F x_1) x_2 \dots) x_n$. $Q_F \in B(n, X; Y)$, ponadto $F \mapsto Q_F$ jest izometrycznym izomorfizmem $B(X, B(X, \dots B(X, Y) \dots))$ i $B(n, X; Y)$

DOWÓD: Przeprowadzimy dla przypadku $n=2$: $F \in B(X, B(X, Y))$ tzn $\|F\| = \sup_{\|x_1\| \leq 1} \| \underbrace{F x_1}_{\in B(X, Y)} \|$

$$\|F x_1\| = \sup_{\|x_2\| \leq 1} \| \underbrace{(F x_1) x_2}_{\in Y} \|, \text{ podsumowując } \|F\| = \sup_{\|x_1\| \leq 1} \sup_{\|x_2\| \leq 1} \| (F x_1) x_2 \| =$$

$= \sup_{\|x_1\| \leq 1} \sup_{\|x_2\| \leq 1} \|Q_F(x_1, x_2)\| = \|Q_F\|$ Dla dowolnego n dowód przebiega identycznie, jedynie napisy są dłuższe. Pokazaliśmy że obraz $F \mapsto Q_F$ leży w $B(2, X; Y)$ i jest to izometria. Odwzorowanie to jest też

odwracalne. Weźmy $Q \in B(2, X; Y)$ i zdefiniujemy $F_Q \in B(X, B(X, Y))$ wzorem $F_Q(x) = Q(x, \cdot)$.

$\|Q\| = \sup_{\|x_1\| \leq 1} \|Q(x_1, x_2)\| = \sup_{\|x_2\| \leq 1} \sup_{\|x_1\| \leq 1} \|F_Q(x_1) x_2\| = \|F_Q\|$ tzn odwzorowanie $Q \mapsto F_Q$ ma obraz w $B(X, B(X, Y))$. Jest jasne, że $F \mapsto Q_F$ i $Q \mapsto F_Q$ są wzajemnie odwrotne

DEFINICJA: Niech $f: X \supset U \rightarrow Y$ będzie różniczkowalna w każdym punkcie $x \in U$. Mówimy, że f jest różniczkowalna dwa razy w $x_0 \in U$ jeśli istnieje pochodna odwzorowania $f': U \rightarrow B(X, Y)$. Pochodną tę oznaczamy $f''(x_0)$. Jest ona elementem $B(X, B(X, Y)) \simeq B(2, X; Y)$

Pochodną rzędu k definiujemy indukcyjnie jako pochodną odwzorowania $f^{(k-1)}: U \rightarrow B(X, B(X, B(X, Y)))$. Pochodne drugiego i wyższych rzędów traktujemy zazwyczaj jako odwzorowania wieloliniowe, tzn. elementy $B(k, X; Y)$

Wśród odwzorowań wieloliniowych wyróżniamy odwzorowania wieloliniowe symetryczne, tzn. takie, że $\forall \sigma \in S_k \quad Q(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(k)}) = Q(x_1, \dots, x_k)$

TIWIERDZENIE: Jeśli $f: X \supset U \rightarrow Y$ jest odwzorowaniem k -krotnie różniczkowalnym, to k -ta pochodna $f^{(k)}(x_0)$ jest odwzorowaniem k -liniowym symetrycznym.

UWAGI NA TEMAT DOWODU: Twierdzenie wydaje się proste, ale jego dowód w całej ogólności jest wielce paskudny. Przeprowadzimy proste rozważania w szczególnych przypadkach


Jeżeli funkcja $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ma pochodne cząstkowe $\frac{\partial^2 f^i}{\partial x^j \partial x^k}$ ciągłe w otoczeniu punktu $x_0 \in \mathbb{R}^n$ to pochodne te są symetryczne, tzn.

$$\frac{\partial^2 f^i}{\partial x^j \partial x^k}(x) = \frac{\partial^2 f^i}{\partial x^k \partial x^j}(x)$$

Zauważmy, że wystarczy rozważyć $m=1$ i $n=2$. Dla jasności zapisu współrzędne punktu $x_0 \in \mathbb{R}^2$ oznaczamy (x, y) . Pokazować więc będziemy, że $\frac{\partial f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial f}{\partial y \partial x}$. Weźmy przyrosty h w kierunku x i k w kierunku y i rozważmy wielkość

$$A(h, k) = \frac{1}{hk} [f(x+h, y+k) - f(x+h, y) - f(x, y+k) + f(x, y)]$$

Wyraży możemy pogrupować na dwa sposoby



$$\begin{aligned} A(h, k) &= \frac{1}{hk} [(f(x+h, y+k) - f(x+h, y)) - (f(x, y+k) - f(x, y))] = \\ &= \frac{1}{hk} [(f(x+h, y+k) - f(x, y+k)) - (f(x+h, y) - f(x, y))] \end{aligned}$$

Oznajając $F(y) = f(x+h, y) - f(x, y)$ $G(x) = f(x, y+k) - f(x, y)$ mamy

$$A(h, k) = \frac{1}{hk} (G(x+h) - G(x)) = \frac{1}{hk} (F(y+k) - F(y)) = *$$

Funkcje F i G są różniczkowalne wobec tego można do nich użyć tw. Lagrange'a

$$\exists \xi \in]x, x+h[: G(x+h) - G(x) = h G'(\xi) ; \quad \exists \eta \in [y, y+k] : F(y+k) - F(y) = k F'(\eta)$$

$$* = \frac{1}{hk} h G'(\xi) = \frac{1}{hk} k F'(\eta) = \frac{1}{k} G'(\xi) = \frac{1}{h} F'(\eta) = **$$

Wracając do definicji F i G widzimy, że $G'(\xi) = \frac{\partial f}{\partial x}(\xi, y+k) - \frac{\partial f}{\partial x}(\xi, y)$

$$F'(\eta) = \frac{\partial f}{\partial y}(x+h, \eta) - \frac{\partial f}{\partial y}(x, \eta)$$

$$** = \frac{1}{k} \left(\frac{\partial f}{\partial x}(\xi, y+k) - \frac{\partial f}{\partial x}(\xi, y) \right) = \frac{1}{h} \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x+h, \eta) - \frac{\partial f}{\partial y}(x, \eta) \right) = **$$

funkcje $\frac{\partial f}{\partial x}$ i $\frac{\partial f}{\partial y}$ też są różniczkowalne, stosujemy więc tl. Lagrange'a

$$** = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) (\xi, \eta') = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) (\xi', \eta)$$

Podsumowując mamy:

$$A(h, k) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(\xi, \eta') = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(\xi', \eta)$$

$\downarrow \xi \rightarrow x$ $\downarrow \xi' \rightarrow x$
 $\eta \rightarrow y$ $\eta' \rightarrow y$

$$\begin{matrix} h \rightarrow 0 \\ k \rightarrow 0 \end{matrix} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) \quad \text{na mocy ciągłości drugiej pochodnych cząstkowych.}$$

oznacza

$$\begin{matrix} \xi, \xi' \rightarrow x \\ \eta, \eta' \rightarrow y \end{matrix}$$

$$\text{Ostatecznie } \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ k \rightarrow 0}} A(h, k) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) \quad \blacksquare$$

Jeśli $f: X \supset U \rightarrow Y$ jest dwukrotnie różniczkowalne w $x_0 \in U$ to $f''(x_0)$ jest odwzorowaniem dwuliniowym symetrycznym

Dowód dla ogólnych przestrzeni Banacha i dla drugiej pochodnej jest już trudniejszy. Pokażemy, że $\|f''(x_0)(h, k) - f''(x_0)(k, h)\| < \varepsilon$ dla dowolnego $\varepsilon > 0$.

$$\text{Oznaczmy } \varphi: [0, 1] \rightarrow Y \quad \varphi(t) = f(x_0 + th + k) - f(x_0 + th)$$

$$\psi: [0, 1] \rightarrow Y \quad \psi(s) = f(x_0 + h + sk) - f(x_0 + sk)$$

$$\text{Zauważmy, że } \varphi(1) - \varphi(0) = f(x_0 + h + k) - f(x_0 + h) - f(x_0 + h) + f(x_0) = \psi(1) - \psi(0)$$

$$\|f''(x_0)(h, k) - f''(x_0)(k, h)\| = \|f''(x_0)(h, k) - \varphi(1) + \varphi(0) + \psi(1) - \psi(0) - f''(x_0)(k, h)\| \leq$$

$$\|f''(x_0)(h, k) - \varphi(1) + \varphi(0)\| + \|f''(x_0)(k, h) - \psi(1) + \psi(0)\|$$

↓ różnica się o zamianę k i h . Szacujemy jeden ze składników

①

$$\|\varphi(1) - \varphi(0) - f''(x_0)(h, k)\| = \|\varphi(1) - \varphi(0) + \varphi'(t) - \varphi'(t) - f''(h, k)\| \leq \|\varphi(1) - \varphi(0) - \varphi'(t)\| + \|\varphi'(t) - f''(x_0)(h, k)\|$$

$$\textcircled{2} \quad \varphi'(t) = f'(x_0 + th + k)h - f'(x_0 + th)h + f'(x_0)h - f'(x_0)h = [f'(x_0 + th + k) - f'(x_0)]h - [f'(x_0 + th) - f'(x_0)]h$$

$$\textcircled{2} \quad \psi'(t) = f'(x_0 + th + k)h - f'(x_0 + th)h + f'(x_0)h - f'(x_0)h = [f'(x_0 + th + k) - f'(x_0)]h - [f'(x_0 + th) - f'(x_0)]h$$

$$\|\psi(t) - f''(x_0)(h, k)\| = \|[f'(x_0 + th + k) - f'(x_0)]h - [f'(x_0 + th) - f'(x_0)]h - f''(x_0)(h, k)\| =$$

$$\|[f'(x_0 + th + k) - f'(x_0)]h - [f'(x_0 + th) - f'(x_0)]h - \underbrace{f''(x_0)(h, k + th)} + \underbrace{f''(x_0)(h, th)}\| =$$



$$= \|[f'(x_0 + th + k) - f'(x_0) - f''(x_0)(\cdot, k + th)]h - [f'(x_0 + th) - f'(x_0) - f''(x_0)(\cdot, th)]h\| \leq$$

$$= \|f'(x_0 + th + k) - f'(x_0) - f''(x_0)(\cdot, k + th)\| \|h\| + \|f'(x_0 + th) - f'(x_0) - f''(x_0)(\cdot, th)\| \|h\| \leq$$

$$\uparrow v = k + th$$

$$\uparrow v = th$$

$$f'(x_0 + v) - f'(x_0) - (f')'(x_0)v = R(f', x_0, v)$$

$$\frac{\|R(f', x_0, v)\|}{\|v\|} < \varepsilon \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta: \|v\| < \delta \rightarrow \frac{\|R(f', x_0, v)\|}{\|v\|} < \varepsilon$$

$$\leq \varepsilon \|th + k\| \|h\| + \varepsilon \|th\| \|h\| \leq \varepsilon (\|h\| + \|k\| + \|h\|) \|h\| \leq 2\varepsilon \|h\| (\|h\| + \|k\|)$$

$$t \leq 1$$

$\textcircled{1}$

$$\|\varphi(1) - \varphi(0) - \psi'(t)\| \leq \sup_{s \in [0, 1]} \|\psi'(s) - \psi'(t)\| = \sup_{s \in [0, 1]} \|\psi'(s) - f''(x_0)(h, k) + f''(x_0)(h, k) - \psi'(t)\| \leq$$

tu o wartości średniej

$$\leq \sup_{s \in [0, 1]} \|\psi'(s) - f''(x_0)(h, k)\| + \|\psi'(t) - f''(x_0)(h, k)\|$$

$$\text{byłoby} \quad \leq 2\varepsilon \|h\| (\|h\| + \|k\|)$$

ostatecznie $\textcircled{1} + \textcircled{2} \leq 6\varepsilon \|h\| (\|h\| + \|k\|)$. Drugi składnik różni się o zamianę k i h więc szacujemy przez $6\varepsilon \|k\| (\|h\| + \|k\|)$. Różnice $f''(x_0)(k, h)$ i $f''(x_0)(h, k)$ mamy więc oszacować następująco

$$\|f''(x_0)(k, h) - f''(x_0)(h, k)\| \leq 6\varepsilon (\|h\| + \|k\|)^2$$

ε zwierałoby było z warunkiem $\|h\| < \delta$ i $\|h\| + \|k\| < \delta$, ogólnie rzecz biorąc

zachodzi dla małych h i k . Zważywszy na dowolność ε mamy jednak

$$\|f''(x_0)(k, h) - f''(x_0)(h, k)\| \leq 6\varepsilon (\|h\| + \|k\|)^2 \quad / \cdot \lambda^2$$

$$\|\lambda^2 f''(x_0)(k, h) - \lambda^2 f''(x_0)(h, k)\| \leq 6\varepsilon (\|\lambda\| \|h\| + \|\lambda\| \|k\|)^2$$

$$\|f''(x_0)(\lambda k, \lambda h) - f''(x_0)(\lambda h, \lambda k)\| \leq 6\varepsilon (\|\lambda\| \|h\| + \|\lambda\| \|k\|)^2$$

Oszacowanie zaduższe więc dla $(\lambda h, \lambda k)$ dla dowolnego λ , ε zaś jest dowolnie małe zatem $f''(x_0)(h, k) = f''(x_0)(k, h)$ ■

Dowód w sytuacji ogólnej można wywieść z tej szczególnej dla $k=2$ indukcyjnie, czego jednak robić nie będziemy. 26

UWAGA: Podobnie jak samo istnienie pochodnych kierunkowych nie gwarantuje różniczkowalności w sensie mocnym tak samo istnienie drugich pochodnych kierunkowych nie gwarantuje istnienia drugiej pochodnej. Jeśli odwzorowanie nie jest dwukrotnie różniczkowalne ale drugie pochodne kierunkowe istnieją mogą one nie być symetryczne. Kolejnym eksponatem w galerii funkcji dziwnych jest:

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \quad f(0,0)=0, \quad f(x,y) = xy \frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,y) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t,y) - f(0,y)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \left(ty \frac{t^2-y^2}{t^2+y^2} - 0 \right) = -y \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0) = -1$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x,t) - f(x,0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \left(xt \frac{x^2-t^2}{x^2+t^2} - 0 \right) = x \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) = +1$$

W tym przykładzie mieszane pochodne cząstkowe nie są ciągłe. W ogólności obowiązuje twierdzenie:

TWIERDZENIE $f: X \supset U \rightarrow Y$ Jeśli w otoczeniu x_0 istnieją $\nabla_n \nabla_k f(x)$, $\nabla_k \nabla_n f(x)$ i są ciągłe w x_0 to są równe w x_0 .

Dla odwzorowań $\mathbb{R}^h \rightarrow \mathbb{R}^m$ mamy

TWIERDZENIE Odwzorowanie $f: \mathbb{R}^h \supset U \rightarrow \mathbb{R}^m$ jest klasy C^k na U wtedy i tylko wtedy jeśli istnieją i są ciągłe wszystkie pochodne cząstkowe rzędu k :

$$\frac{\partial^k f}{\partial x_{i_1} \partial x_{i_2} \dots \partial x_{i_k}} \quad i_1, \dots, i_k \in \{1, \dots, n\}$$

EKSTREMA FUNKCJI NA PRZESTRZENI BANACHA

Jeśli nie będzie powiedziane inaczej, rozważać teraz będziemy funkcje $f: X \supset U \rightarrow \mathbb{R}$ na przestrzeni Banacha. Interesować nas będą ekstrema funk. Definicja ekstremum pozostaje niezmiennie: $x \in U$ jest **maksimum lokalnym** f jeśli dla pewnego $\varepsilon > 0$ i dla wszystkich $y \in K(x, \varepsilon)$ $f(x) \geq f(y)$, x jest **minimum lokalnym** jeśli $f(x) \leq f(y)$. Punkt będący minimum lub maksimum lokalnym nazywa się **ekstresem lokalnym**.


Interesowały nas będą kryteria konieczne i kryteria wystarczające istnienia ekstremum (głównie) dla funkcji odpowiedniej klasy różniczkowalności. Żeby się przekonać o istnieniu sytuacji dość skomplikowanych obejźmy kolejny eksponat w tudekacji funkcji dziwnych:

$f(x,y) = (x-y^2)(x-4y^2)$ w punkcie $(0,0)$ funkcja przyjmuje wartość 0. Zobaczymy jak ta funkcja zachowuje się na płaszczyźnie przechodzącej przez 0:


Niech $h = \begin{bmatrix} \delta x \\ \delta y \end{bmatrix}$ $f(th) = (t\delta x - t^2\delta y^2)(t\delta x - 4t^2\delta y^2) = t^2(\delta x - t\delta y^2)(\delta x - 4t\delta y^2)$.

Zależność od t jest wielomianowa. Przy założeniu $\delta y \neq 0$ wielomian ma pierwiastki $t_0 = 0, t_1 = \delta x / \delta y^2, t_2 = \delta x / 4\delta y^2$

dla $\delta x > 0$





dla $\delta x < 0$



gdy $\delta y = 0$ $f(th) = t^2\delta x^2$ gdy $\delta x = 0$ $f(th) = t^4 4\delta y^4$

We wszystkich przypadkach na prostej $t \mapsto th$ jest minimum w $(0,0)$ jednak funkcja nie ma minimum w $(0,0)$. Popatrzmy na wykresy:



Funkcja zeruje się na parabolech $x=y^2$ i $x=4y^2$. Pomimo że w nim jest ujemne, w porównaniu punktach dodatnie. W każdym otoczeniu punktu $(0,0)$ są dodatnie i ujemne wartości. Z drugiej strony, jeśli funkcja ma ekstremum w punkcie $x_0 \in U$ to ma je także funkcja $t \mapsto f(x_0 + th)$ w punkcie $t=0$. to pozwala sformułować

STWIERDZENIE Jeśli x_0 jest ekstremum f i jeśli f jest słabo różniczkowalna w x_0 to $\nabla f(x_0) = 0$.

Mamy więc warunek konieczny istnienia ekstremum dla funkcji przynajmniej słabo różniczkowalnych. Warunek dostateczny wymaga, tak jak w przypadku f jednej zmiennej, użycia wyższych pochodnych

TWIERDZENIE (Wzór Taylora) $f: X \supset U \rightarrow Y$ jest różniczkowalna $k-1$ razy na U i pochodna $f^{(k)}$ istnieje w $x_0 \in U$. Wyrażenie

$$r_k(x_0, h) = f(x_0 + h) - f(x_0) - f'(x_0)h - \frac{f''(x_0)}{2!}(h, h) - \dots - \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(h, \dots, h)$$

jest resztą rzędu k , tzn spełnia

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{r_k(x_0, h)}{\|h\|^k} = 0$$

DOWÓD Dowód jest indukcyjny względem rzędu pochodnej. Dla $k=1$ $r_1(x_0, h) = f(x_0 + h) - f(x_0) - f'(x_0)h$ ma zdaną własność, co wynika z definicji różniczkowalności w punkcie x_0 . Zakładamy teraz, że twierdzenie zachodzi dla $m-1$ i dowodzimy że zachodzi dla m -ki. Definiujemy $\varphi: \Theta \rightarrow Y$ gdzie $\Theta \subset X$ jest otoczeniem zera

$\Theta \ni h \mapsto \varphi(h) = f(x_0 + h) - f(x_0) - f'(x_0)h - \dots - \frac{f^{(m)}(x_0)}{m!}(h, \dots, h)$ φ będziemy różniczkować względem h . Odwzorowanie wieloliniowe Q są różniczkowalne w każdym punkcie:

$$Q \in \mathcal{B}(\ell, X; Y) \quad Q(h_1 + \delta h_1, \dots, h_\ell + \delta h_\ell) = Q(h_1, \dots, h_\ell) + \underbrace{Q(\delta h_1, h_2, \dots, h_\ell) + \dots + Q(h_1, \dots, h_{\ell-1}, \delta h_\ell)}_{\text{pochodne}} + r(h, \delta h)$$

$$Q'(h)\delta h = \sum_{i=1}^{\ell} Q(h_1, \dots, \delta h_i, \dots, h_\ell)$$

Gdy Q jest symetryczne $Q'(h)\delta h = \sum_i Q(\delta h_i, h_2, \dots, h_\ell)$. Jeśli $(h_1, \dots, h_\ell) = (h, \dots, h)$ i $(\delta h_1, \dots, \delta h_\ell) = (\delta h, \dots, \delta h)$ to $Q'(h)\delta h = \ell Q(\delta h, h, \dots, h)$

$$\varphi'(h)\delta h = f'(x_0 + h)\delta h - f'(x_0)\delta h - f''(x_0)(\delta h, h) - \dots - \frac{1}{(m-1)!} f^{(m)}(\delta h, h, \dots, h)$$

$$\varphi'(h) = f'(x_0 + h) - f'(x_0) - f''(x_0)(\cdot, h) - \dots - \frac{1}{(m-1)!} f^{(m)}(\cdot, h, \dots, h)$$

drugie pochodne

$\varphi''(h) = f''(x_0 + h) - f''(x_0)(\cdot, \cdot) - \dots - \frac{1}{(m-2)!} f^{(m)}(\cdot, \cdot, h, \dots, h)$ z założenia twierdzenie f jest k razy różniczkowalne w x_0 , $m \leq k$ zatem φ jest m razy różniczkowalne w 0 , i.e. φ' jest $m-1$ razy różniczkowalne w 0 . Korzystamy z założenia indukcyjnego dla φ'

$$\frac{1}{\|h\|^{m-1}} \left\| \varphi'(h) - \underbrace{\varphi'(0)}_0 - \underbrace{(\varphi')'(0)}_0 h - \dots - \frac{1}{(m-1)!} \varphi^{(m-1)}(0)(h, \dots, h) \right\| \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$$

$$\frac{1}{\|h\|^{m-1}} \|\varphi'(h)\| \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0$$

$$\begin{aligned} \frac{\|r_m(x_0, h)\|}{\|h\|^m} &= \frac{\|\varphi(h)\|}{\|h\|^m} = \frac{\|\varphi(h) - \underbrace{\varphi(0)}_0\|}{\|h\|^m} \leq \sup_{t \in [0,1]} \frac{\|\varphi'(th)\| \|h\|}{\|h\|^m} = \sup_{t \in [0,1]} \frac{\|\varphi'(t)\|}{\|h\|^{m-1}} \leq \\ &\leq \frac{1}{t^{p-1}} \sup_{t \in [0,1]} \frac{\|\varphi'(t)\|}{\|h\|^{m-1}} \leq \sup_{t \in [0,1]} \frac{\|\varphi'(t)\|}{\|th\|^{p-1}} \xrightarrow{\|h\| \rightarrow 0} 0 \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Dla f wielu zmiennych nie mamy wzorów na resztę, ale mamy oszacowanie: (Nierówność Taylora)

Twierdzenie Nierówność Taylora: $f: X \supset U \rightarrow Y$ różniczkowalne k -krotnie na U oraz na zbiorze $\{x_0 + th, t \in]0,1[\}$ istnieje pochodne rzędu $k+1$ wtedy i tylko wtedy, gdy spełnione jest

$$\|r_k(x_0, h)\| \leq \frac{1}{(k+1)!} \|h\|^{k+1} \sup_{t \in]0,1[} \|f^{(k+1)}(x_0 + th)\|.$$

NIE DOWODZIMY

Twierdzenie (Warunek dostateczny istnienia ekstremum) $f: X \supset U \rightarrow \mathbb{R}$ jest k -krotnie różniczkowalne w x_0 oraz $f^{(m)}(x_0) = 0$ dla $m < k$, $f^{(k)}(x_0) \neq 0$. (1) Jeśli w x_0 f ma ekstremum to k jest parzyste oraz dla dowolnego h $f^{(k)}(x_0)(h, \dots, h) \leq 0$ dla maksimum i ≥ 0 dla minimum. (2) Jeśli dla pewnego $\varepsilon > 0$ $f^{(k)}(x_0)(h, \dots, h) < -\varepsilon$ (eventualnie $f^{(k)}(x_0)(h, \dots, h) > \varepsilon$) dla dowolnego $h: \|h\|=1$ to f ma w x_0 maksimum (minimum).

Dowód (1) Definiujemy $g_h: I \ni t \mapsto g_h(t) = f(x_0 + th)$. g_h jest rzeczywistą funkcją różniczkowalną k -razy. $g'_h(t) = f'(x_0 + th)h$, $g''_h(t) = f''(x_0 + th)(h, h)$ itd. Skoro f ma w x_0 pochodne zerowe do rzędu $k-1$ to g_h też. Skoro $f^{(k)}(x_0) \neq 0$ to dla pewnego h $g_h^{(k)}(0) \neq 0$ jeśli f ma ekstremum w x_0 to g_h też, wobec tego k musi być parzyste i pochodne rzędu k musi być stosownego znaku w/g odpowiedniego twierdzenia dla funkcji jednej zmiennej. Wzrostłość budzić może jedynie fakt, czy to, że $f^{(k)}(x_0) \neq 0$ oznacza że dla pewnego h $f^{(k)}(x_0)(h, \dots, h) \neq 0$. Jest to ogólna własność odwzorowań wieloliniowych: **Odwzorowanie k -liniowe symetryczne jest jednoznacznie wyznaczone przez wartości na wektorach $(v, v, \dots, v)$. Przykładem jest formuła polarizacyjna dla form dwuliniowych symetrycznych**

$$Q(v, w) = \frac{1}{2!} [Q(v+w, v+w) - Q(v, v) - Q(w, w)] \quad \text{dla } k > 2 \text{ wzory są dłuższe, ale istnieją}$$

(2) Ze wzoru Taylora mamy (dla max)

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0)(h, \dots, h) + r_k(x_0, h) \quad \text{dla } \|h\|=1 \text{ mamy } f^{(k)}(x_0)(h, \dots, h) < -\varepsilon$$

$$\begin{aligned} f(x_0 + h) - f(x_0) &= \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0)(h, \dots, h) + r_k(x_0, h) = \frac{1}{k!} \|h\|^k f^{(k)}(x_0)\left(\frac{h}{\|h\|}, \dots, \frac{h}{\|h\|}\right) + r_k(x_0, h) = \\ &= \|h\|^k \left(\underbrace{\frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0)\left(\frac{h}{\|h\|}, \frac{h}{\|h\|}, \dots, \frac{h}{\|h\|}\right)}_{< -\varepsilon/k!} + \underbrace{\frac{r_k(h, x_0)}{\|h\|^k}}_{\uparrow} \right) < 0 \end{aligned}$$

Dla małych k może być dowolnie małe!
W szczególności mniejsze niż $\varepsilon/2k!$ co do modułu.