

# WYKŁAD 6

## POJĘCIE CIĄGŁOŚCI

# POJĘCIE CIĄGŁOŚCI

**DEFINICJA:** Niech  $(X, d)$ ,  $(Y, \rho)$  będą przestrzeniami metrycznymi i niech  $f: X \rightarrow Y$  będzie odwzorowaniem. Mówimy, że  $f$  jest ciągłe w punkcie  $x_0 \in X$  jeśli spełniony jest warunek:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \quad \forall x \in X \quad d(x, x_0) < \delta \Rightarrow \rho(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$$

**PRZYKŁAD:** Wykażemy, że zdefiniowane przez nas funkcje  $\mathbb{R} \ni x \mapsto e(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{x}{n})^n$  jest ciągła w  $x=0$ .

Będą nam do tego potrzebne oszacowania funkcji  $x \mapsto e(x)$  nieco dokładniejsze niż te, które już mamy, tzn

$$* \quad \forall x \quad e(x) > x + 1, \quad \forall x \quad e(x) > 0$$

↓ zamienimy  $x$  na  $-x$

$$e(-x) > 1 - x \Rightarrow \frac{1}{e(x)} > 1 - x \Rightarrow \text{dla } x < 1 \quad e(x) < \frac{1}{1-x}$$

$$\text{ostatecznie: } \forall x < 1 \quad e(x) < \frac{1}{1-x} \quad **$$

Zobaczymy jak oszacowanie \* i \*\* prezentują się na wykresach



$$x \mapsto e(x)$$

$$x \mapsto 1+x$$

$$x \mapsto \frac{1}{1-x}$$

Ustalmy  $\varepsilon > 0$  i zapiszmy warunek ciągłości w  $x_0 = 0$  dla funkcji  $x \mapsto e(x)$  względem kanonicznej topologii w  $\mathbb{R}$  związanej z wartością bezwzględną

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in \mathbb{R} \underbrace{|x-0| < \delta}_{|x| < \delta} \Rightarrow \underbrace{|e(x) - e(0)| < \varepsilon}_{|e(x) - 1| < \varepsilon}$$

Oszacujmy  $e(x) - 1$ :

$$x+1 \leq e(x) \leq \frac{1}{1-x} \quad x \leq e(x) - 1 \leq \frac{1}{1-x} - 1 = \frac{1-1+x}{1-x} = \frac{x}{1-x}$$

$|e(x) - 1| \leq \max\{|x|, \left|\frac{x}{1-x}\right|\}$  dla  $x < 1$ . Interesujemy się jedynie

$x$  bliskimi 0, możemy więc przyjąć, że  $|x| < 1$ . Wtedy dla  $x > 0$

$$x < \frac{x}{1-x} \text{ tzn } \max\{|x|, \left|\frac{x}{1-x}\right|\} = \frac{x}{1-x}. \text{ Dla } x < 0 \quad |x| > \left|\frac{x}{1-x}\right|$$

więc  $\max\{|x|, \left|\frac{x}{1-x}\right|\} = |x|$ . Mamy trochę niewygodną sytuację, bo po jednej i po drugiej stronie zera do szacowania użyjemy innych funkcji. Można to zmienić zauważając że niezależnie od znaku  $x$  mamy  $|x| \leq \frac{|x|}{1-|x|}$  (dla  $|x| < 1$ ). Wtedy

$$|e(x) - 1| \leq \max\{|x|, \left|\frac{x}{1-x}\right|\} \leq \frac{|x|}{1-|x|}$$

Rozważmy  $t \mapsto \frac{t}{1-t}$  dla  $0 < t < 1$ . Funkcja ta jest rosnąca, zatem biorąc  $t < \delta$  mamy pewność, że otrzymamy  $f(t) < f(\delta)$ . Załóżmy więc, że  $f(\delta) = \varepsilon$  i znajdziemy odpowiednio  $\delta$ :

$$\varepsilon = \frac{\delta}{1-\delta} \quad \varepsilon(1-\delta) = \delta \quad \varepsilon - \varepsilon\delta = \delta \quad \varepsilon = \delta + \varepsilon\delta \quad \varepsilon = (1+\varepsilon)\delta \quad \delta = \frac{\varepsilon}{1+\varepsilon}$$

Dla ustalonego  $\varepsilon$  należy wziąć  $t < \frac{\varepsilon}{1+\varepsilon}$ . Wtedy wiadomo, że  $f(t) < \varepsilon$ . Jeśli więc  $|x| < \frac{\varepsilon}{1+\varepsilon}$  to  $\frac{|x|}{1-|x|} < \varepsilon$ , a co za tym idzie także  $|e(x) - 1| < \varepsilon$ . ■

**UWAGA:** Korzystając z własności funkcji  $x \mapsto e(x)$  i ciągłości w  $x_0 = 0$

możemy łatwo wykazać ciągłość w każdym innym punkcie. Istotnie, weźmy dowolne  $x_0$ :

51

$$e(x_0) - e(x) = e(x_0) - e(x - x_0 + x_0) = e(x_0) - e(x - x_0)e(x_0) = e(x_0)[1 - e(x - x_0)]$$

$$|e(x_0) - e(x)| = e(x_0)|e(x - x_0) - 1| \leftarrow \text{ma być } < \varepsilon,$$

zatem  $|e(x - x_0) - 1|$  ma być  $< \frac{\varepsilon}{e(x_0)}$ . Korzystając z poprzednich rachunków musimy wziąć  $|x - x_0| < \frac{\varepsilon/e(x_0)}{1 + \varepsilon/e(x_0)} = \frac{\varepsilon}{e(x_0) + \varepsilon}$ .

Okazuje się, że to jak  $\delta$  musimy wziąć zależy od tego w jakim punkcie ciągłość badamy. Dla stwierdzenia ciągłości w  $x_0$  nie ma to jednak znaczenie.

**DEFINICJA:** Mówimy że  $f: X \rightarrow Y$  jest ciągła na zbiorze otwartym  $U \subset X$  jeśli  $f$  jest ciągła w każdym punkcie tego zbioru.

Możemy więc stwierdzić, że funkcja  $x \mapsto e(x)$  jest ciągła na całym  $\mathbb{R}$ .

**INNE SPOSOBY CHARAKTERYZACJI CIĄGŁOŚCI** Dla  $f: X \rightarrow Y$  następujące warunki są równoważne

(1)  $f$  jest ciągła w  $x_0$

(2) dla każdego otoczenia  $U$  punktu  $f(x_0)$  istnieje otoczenie  $\mathcal{O}$  punktu  $x_0$  takie, że  $f(\mathcal{O}) \subset U$

(3) jeśli  $U$  jest otoczeniem  $f(x_0)$  to  $f^{-1}(U)$  jest otoczeniem  $x_0$

(4) jeśli  $(x_n)$  jest zbieżny do  $x_0$  to  $f(x_n)$  jest zbieżny do  $f(x_0)$

**DOWÓD:** (1)  $\Rightarrow$  (2) Weźmy otoczenie  $U$  punktu  $f(x_0)$ . Z definicji 52

otoczenie wynika, że  $f(x_0)$  jest punktem wewnętrznym  $U$ . Można więc znaleźć kulę o promieniu  $\varepsilon$  i środku w  $f(x_0)$  taką, że

$K(f(x_0), \varepsilon) \subset U$ . Z ciągłości  $f$  w  $x_0$  wiemy, że do  $\varepsilon$  możemy dobrać  $\delta$  taką, że jeśli  $d(x_0, x) < \delta$  to  $\rho(f(x_0), f(x)) < \varepsilon$ .

W języku kul oznacza to, że jeśli  $x \in K(x_0, \delta)$  to  $f(x) \in K(f(x_0), \varepsilon)$ . Jeszcze inaczej możemy zapisać, że

$$f(K(x_0, \delta)) \subset K(f(x_0), \varepsilon) \subset U$$

Szukanym otoczeniem  $\mathcal{O}$  punktu  $x_0$  jest więc  $K(x_0, \delta)$ .

(2)  $\Rightarrow$  (3) Weźmy otoczenie  $U$  punktu  $f(x_0)$  i odpowiednie  $\mathcal{O}$  takie, że  $f(\mathcal{O}) \subset U$  i  $\mathcal{O}$  jest otoczeniem  $x_0$ . Skoro  $f(\mathcal{O}) \subset U$  to  $\mathcal{O} \subset f^{-1}(U)$  zatem  $f^{-1}(U)$  także jest otoczeniem  $x_0$ .

(3)  $\Rightarrow$  (4) Weźmy ciąg  $(x_n)$  zbieżny do  $x_0$  oraz otoczenie  $U$  punktu  $f(x_0)$ . Z (3) wiemy, że  $f^{-1}(U)$  jest otoczeniem  $x_0$ , zatem  $f^{-1}(U)$  zawiera prawie wszystkie wyrazy ciągu  $(x_n)$ . W takim wypadku  $U$  zawiera prawie wszystkie wyrazy ciągu  $f(x_n)$ . Otoczenie  $U$  punktu  $f(x_0)$  może być wybrane dowolnie, co pokazuje, że  $f(x_n) \rightarrow f(x_0)$ .

(4)  $\Rightarrow$  (1) c.e. Załóżmy że nie zachodzi warunek ciągłości,

tzn  $\exists \varepsilon > 0 : \forall \delta > 0 \exists x$   $d(x, x_0) < \delta$  i  $\rho(f(x), f(x_0)) > \varepsilon$

Weźmy teraz  $\delta = \frac{1}{n}$  i niech  $x_n \in K(x_0, \delta)$ . Oczywiście  $x_n \rightarrow x_0$  ale  $\rho(f(x_n), f(x_0)) > \varepsilon$  zatem  $f(x_n) \not\rightarrow f(x_0)$  co jest sprzeczne z (4) ■

$$(1) \Rightarrow (2)$$



$$(4) \Leftarrow (3)$$

**UWAGA:** W dwóch spośród czterech równoważnych opisów ciągłości użyła się jedynie pojęć topologicznych (otoczenia) a nie metrycznych (odległości). Pojęcie ciągłości związane jest zatem z rodzajem zbiorów otwartych a nie z metryką od której pochodzi. W szczególności równoważne metryki prowadzą do tych samych zbiorów odwzorowań ciągłych.

53

Powiemy że odwzorowanie  $f: X \rightarrow Y$  jest ciągłe jeśli jest ciągłe w każdym punkcie przestrzeni  $X$ . Odwzorowanie ciągłe to **morfizm przestrzeni topologicznych**.

**TWIERDZENIE:** Odwzorowanie  $f: X \rightarrow Y$  jest ciągłe wtedy i tylko wtedy gdy przeciwobraz każdego zbioru otwartego w  $Y$  jest otwarty w  $X$ . Podobnie  $f$  jest ciągłe wtedy i tylko wtedy kiedy przeciwobraz każdego zbioru domkniętego w  $Y$  jest domknięty w  $X$ .

**DOWÓD** Udowodniliśmy wcześniej równoważność czterech sposobów opisywania ciągłości w punkcie - teraz możemy korzystać z któregośkolwiek z nich. Zaczynamy od zbiorów otwartych:

$\Rightarrow$  Niech  $f: X \rightarrow Y$  będzie odwzorowaniem ciągłym. Oznacza to, że jest ciągłe w każdym punkcie. Weźmy zbiór  $\emptyset$  otwarty w  $Y$ .  $\emptyset$  jest otoczeniem każdego swojego punktu. Jeśli  $f^{-1}(\emptyset) \neq \emptyset$  to z ciągłości  $f^{-1}(\emptyset)$  jest otoczeniem każdego swojego punktu, wobec tego  $f^{-1}(\emptyset)$  jest zbiorem otwartym. Jeśli  $f^{-1}(\emptyset) = \emptyset$  jest otwarty z definicji.

$\Leftarrow$  Załóżmy teraz, że  $f^{-1}(\emptyset)$  jest otwarty dla dowolnego  $\emptyset \subset Y$  otwartego. Weźmy  $x_0 \in X$  i  $\emptyset \subset Y$  taki, że  $f(x_0) \in \emptyset$ .  $\emptyset$  jest otwarty, więc jest otoczeniem  $f(x_0)$ .  $f^{-1}(\emptyset)$  zawiera  $x_0$  i jako otwarty jest otoczeniem  $x_0$ . Wobec tego  $f$  jest ciągłe w  $x_0$ . Wobec dowolności wyboru  $x_0$ ,  $f$  jest ciągłe wszędzie.

Teraz o zbiorach domkniętych:

$\Rightarrow$  Niech  $f$  będzie odwzorowaniem ciągłym. Weźmy  $D \subset Y$  zbiór domknięty. Załóżmy także, że  $f^{-1}(D) \neq \emptyset$ . Niech punkt  $x_0$  będzie punktem skupienia  $f^{-1}(D)$ . Możemy wobec tego znaleźć ciąg elementów zbioru  $f^{-1}(D)$  zbieżny do  $x_0$ . Niech  $(x_n)$  będzie takim ciągiem. Wartości  $f(x_n)$  leżą w  $D$ . Z ciągłości  $f \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0)$  a z domkniętością  $D$   $f(x_0) \in D$ . Wobec tego  $x_0 \in f^{-1}(D)$ . Wykazaliśmy, że punkty skupienia  $f^{-1}(D)$  należą do  $f^{-1}(D)$ , wobec tego  $f^{-1}(D)$  jest domknięty.

54

$\Leftarrow$  Weźmy dowolny zbiór  $A \subset Y$ . Rozważmy dwa zbiory:

$$f^{-1}(Y \setminus A) \quad \text{i} \quad X \setminus f^{-1}(A) = \{x \in X : f(x) \notin A\}$$

$$\{x \in X : f(x) \in Y \setminus A\}$$

$$f^{-1}(Y \setminus A) = X \setminus f^{-1}(A)$$

$$\{x \in X : f(x) \notin A\}$$

to samo!

Niech teraz  $\emptyset$  będzie otwartym,  $\emptyset \subset Y$ .  $Y \setminus \emptyset$  jest domknięty, wobec tego  $f^{-1}(Y \setminus \emptyset)$  jest domknięty. Ale  $f^{-1}(Y \setminus \emptyset) = X \setminus f^{-1}(\emptyset)$ . Jego domkniętość oznacza, że  $f^{-1}(\emptyset)$  jest otwarty. Z dowolnością  $\emptyset$  wynika ciągłość  $f$ .

Powyższe charakteryzacja odwzorowań ciągłych jest bardzo wygodna do udowodnienia następującego faktu:

**FAKT:** Niech  $f: X \rightarrow Y$ ,  $g: Y \rightarrow Z$  będą odwzorowaniami między przestrzeniami metrycznymi. Wówczas (1) jeśli  $f$  jest ciągłe w  $x_0$  i  $g$  jest ciągłe w  $f(x_0)$  to  $g \circ f$  jest ciągłe w  $x_0$ ; (2) jeśli  $f$  i  $g$  są ciągłe to  $f \circ g$  jest ciągłe.

Uzasadnienie każdy powinien być w stanie zapisać sam!

# PRZYKŁADY ODWZOROWAŃ CIĄGŁYCH I NIECIĄGŁYCH:

55

(a)  $(X, d)$  p. metryczna

$d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$  jest odwzorowaniem ciągłym  
 jaka metryka tu?  $d_1, d_\infty, d_2$ ?

Warunek ciągłości w punkcie  $(x_0, y_0) \in X \times X$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta : \forall (x, y) \quad d_2((x_0, y_0), (x, y)) < \delta \Rightarrow |d(x_0, y_0) - d(x, y)| < \varepsilon$$

umieć szacować to!

Rachunki poboczne:

$$d(a, b) \leq d(a, c) + d(c, b)$$

$$d(b, c) \leq d(b, a) + d(a, c)$$

$$d(a, b) - d(b, c) \leq d(a, c)$$

$$d(b, c) - d(a, b) \leq d(a, c)$$

$$|d(a, b) - d(b, c)| \leq d(a, c)$$

$$|d(x_0, y_0) - d(x, y)| \leq |d(x_0, y_0) - d(x_0, y) + d(x_0, y) - d(x, y)| \leq$$

$$|d(x_0, y_0) - d(x_0, y)| + |d(x_0, y) - d(x, y)| \leq d(y_0, y) + d(x_0, x) =$$

$$= d_1((x, y), (x_0, y_0))$$

z rachunków pobocznych.

w miejscu? należy wziąć 1

wystarczy użyć  $\delta = \varepsilon$ .



(2)  $X = \mathbb{R}^2$ ,  $Y = \mathbb{R}$ , zwykłe topologie



$$f(x,y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} \text{ dla } (x,y) \neq (0,0) \quad f(0,0) = 0$$

Niech  $x_n \rightarrow 0$ ,  $a \in \mathbb{R}$   $f(x_n, ax_n) = \frac{ax_n^3}{x_n^4 + a^2 x_n^2} = \frac{ax_n}{x_n^2 + a^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

$y_n \rightarrow 0$ ,  $a \in \mathbb{R}$   $f(ay_n, y_n) = \frac{a^2 y_n^3}{a^4 y_n^4 + y_n^2} = \frac{a^2 y_n}{a^4 y_n^2 + 1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

$x_n \rightarrow 0$   $y_n = ax_n^2$   $f(x_n, ax_n^2) = \frac{ax_n^4}{x_n^4 + a^2 x_n^4} = \frac{a}{1+a^2} \neq 0$   
 $a \neq 0$

$f$  jest stała na parabolach  $y = ax^2$  i różne od zera. Nie jest więc ciągła w  $(0,0)$ .



(3) Naturalne operacje związane z iloczynem kartezjańskim są ciągłe  $(x,d)$ ,  $(Y,\rho)$

$$\begin{array}{l} X \times Y \xrightarrow{pr_1} X \quad (x,y) \mapsto x \\ X \times Y \xrightarrow{pr_2} Y \quad (x,y) \mapsto y \end{array} \quad \text{dla } X=Y \quad \begin{array}{l} X \xrightarrow{\delta} X \times X \\ x \mapsto (x,x) \end{array}$$

Pokażemy ciągłość  $pr_2$ : Niech  $\varepsilon > 0$ , ustalmy  $(x_0, y_0) \in X \times Y$ . Warunek ciągłości:  
 $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall (x,y) \mathcal{D}_\infty((x,y), (x_0, y_0)) < \delta \Rightarrow d(x, x_0) < \varepsilon$

$$\mathcal{D}_\infty((x,y), (x_0, y_0)) = \max\{d(x, x_0), \rho(y, y_0)\}$$

ten  $d(x, x_0) \leq D((x, y), (x_0, y_0))$ . Wystarczy więc wziąć  $\delta = \varepsilon$ .

(4)  $X = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$   $Y = \mathbb{R}$ , normalna topologia, operacje arytmetyczne są ciągłe:  $(t, s) \mapsto t+s$ ,  $(t, s) \mapsto ts$

$$|t+s - t_0 - s_0| \leq |t - t_0| + |s - s_0| < \delta \rightarrow \text{metryka } d_1 \text{ i } \varepsilon - \delta$$

$$\begin{matrix} t_n \rightarrow t_0 \\ s_n \rightarrow s_0 \end{matrix} \quad |s_n t_n - s_0 t_0| = |s_n t_n - s_0 t_n + s_0 t_n - s_0 t_0| \leq |t_n| |s_n - s_0| + |s_0| |t_n - t_0|$$

$(t_n)$  zbieżny, więc ograniczony  $\leq |T| |s_n - s_0| + |s_0| |t_n - t_0| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

$$X = \mathbb{R} \setminus \{0\}, Y = \mathbb{R} \quad t \mapsto \frac{1}{t}$$

$$t_n \rightarrow t_0$$

$$\left| \frac{1}{t_n} - \frac{1}{t_0} \right| = \left| \frac{t_0 - t_n}{t_0 t_n} \right| = \frac{1}{t_0} \frac{|t_n - t_0|}{|t_n|} \leq \frac{1}{t_0} \frac{|t_n - t_0|}{\varepsilon} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

$t_0 \neq 0$  wobec tego istnieje  $\varepsilon: |t_n| > \varepsilon$  dla dużych  $n$

(5) Operacje „wektorowe” w  $\mathbb{R}^n$  są ciągłe

$$\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \ni (x, y) \mapsto x+y = (x_1+y_1, x_2+y_2, \dots, x_n+y_n)$$

$$\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \ni (\alpha, x) \mapsto \alpha \cdot x = (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n)$$

**WNIOSEK:** z (4) i (5) oraz z ciągłości złożenia odwzorowań ciągłych wynika, że funkcje wymierne są ciągłe tam gdzie określone. Funkcja z przykładem (2) jest więc ciągła wszędzie poza wrażliwym punktem  $(0,0)$ , który badaliśmy oddzielnie.

(6) Funkcja rzeczywista nieciągła nigdzie

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x \in \mathbb{Q} \\ 1 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

Funkcja rzeczywista ciągła w  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ , nieciągła w  $\mathbb{Q}$

$$\text{dla } x = \frac{p}{q}, f(x) = \frac{1}{q} \quad \text{dla } x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} f(x) = 0$$

### Ciągłość jednostajna

Oprócz pojęcia ciągłości w punkcie i ciągłości na zbiorze w przestrzeniach metrycznych mamy też pojęcie ciągłości jednostajnej. To pojęcie ma charakter metryczny:

**DEFINICJA**  $(X, d), (Y, \rho)$  p.m.  $f: X \rightarrow Y$ . Mówimy, że  $f$  jest **jednostajnie ciągła** jeśli zachodzi warunek:

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, x' \in X \quad d(x, x') < \delta \Rightarrow \rho(f(x), f(x')) < \epsilon$$

Warunek jednostajnej ciągłości jest mocniejszy niż warunek ciągłości na  $X$ . Porównajmy:

**zwykła ciągłość na  $X$ :**

$$\forall x_0 \in X \quad \forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \quad \forall x \quad d(x, x_0) < \delta \Rightarrow \rho(f(x), f(x_0)) < \epsilon$$

**jednostajna ciągłość na  $X$**

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 \quad \forall x, x_0 \quad d(x, x_0) < \delta \Rightarrow \rho(f(x), f(x_0)) < \epsilon$$

Warunki są podobne, różni je kolejność kwantyfikatorów. Każdy  $\epsilon, \delta$  musi być dla ciągłości jednostajnej wspólnie dla wszystkich punktów. Dla zwykłej ciągłości  $\delta$  może zależeć od  $\epsilon, x_0$ . Funkcja  $x \mapsto e(x)$  jest ciągła ale nie jednostajnie ciągła. Wśród wielomianów jednostajnie ciągłe są jedynie stałe i pierwszego rzędu.

Istnieje jeszcze jeden rodzaj „ciągłości” istotny przy równaniach różniczkowych: jeśli  $f$  spełnia

$\exists L \in \mathbb{R} : \forall x, x' \in X \quad \rho(f(x), f(x')) \leq L d(x, x')$  mówimy, że odwzorowanie jest **lipschitzowskie**, a sam warunek nazywamy warunkiem



Każde odwzorowanie lipschitzowskie jest jednostajnie ciągłe, każde odwzorowanie jednostajnie ciągłe jest ciągłe.

**ZE SŁOWNIKA:** Jeśli  $f: X \rightarrow Y$  jest bijekcją, jest ciągłe i jego odwrotność też jest ciągła, to takie odwzorowanie nazywamy **homeomorfizmem**. Homeomorfizm zachowuje wszelkie własności topologiczne (tzn. związane ze zbiorami otwartymi). Jeśli istnieje homeomorfizm między dwiema przestrzeniami to topologicznie nie biorąc tej przestrzeni są takie same. Dla przestrzeni metrycznych odpowiednim pojęciem jest **izometria**, czyli odwzorowanie zachowujące odległości między punktami.


Wkrótce przejdziemy do omawiania kolejnych pojęć natury topologicznej, mianowicie **zwartości**, **spójności**. Przyjdzie nam się do tego jeszcze jeden, dość abstrakcyjny koncept.

**TOPOLOGIA NA PODZBIORACH:** Niech  $(X, d)$  będzie przestrzenią metryczną a  $A \subset X$  pewnym podzbiorem. Oczywiście  $d$  można **obciąć** do  $A$ , tzn. używać jej tylko dla punktów z  $A$ .

$$d|_A: A \times A \rightarrow \mathbb{R}$$

Mozna więc  $(A, d_A)$  potraktować jako „oddzielną” przestrzeń metryczną ze wszystkimi własnymi zbiorami otwartymi. Zobaczymy co może się wydarzyć:  $X = \mathbb{R}$ , zwykła metryka,  $A = [1, 1]$ . Rozważmy kulę o środku w punkcie  $-\frac{1}{2}$  i promieniu 1 w przestrzeni  $A$ :

$$K^A(-\frac{1}{2}, 1) = \{t \in A: |t + \frac{1}{2}| < 1\} = [-1, \frac{1}{2}[$$



Odcinek  $[-1, \frac{1}{2}]$  jest kulą otwartą w  $A$ , a więc jest zbiorem otwartym w  $A$ .  
Traktowaliśmy jako podzbiór  $\mathbb{R}$  nie jest zbiorem otwartym. Potrzebujemy  
ogólnego sposobu rozpoznawania zbiorów otwartych i domkniętych  
w przestrzeni będącej podzbiorem przestrzeni metrycznej.

**FAKT:**  $(X, d)$  - p.m.  $A \subset X$ . (1) Zbiór  $\mathcal{O} \subset A$  jest otwarty w  $A$  wtedy i  
tylko wtedy, gdy istnieje  $U \subset X$  otwarty taki, że  $\mathcal{O} = U \cap A$ . (2)  
Zbiór  $\mathcal{D} \subset A$  jest domknięty w  $A$  wtedy i tylko wtedy gdy istnieje zbiór  
 $F \subset X$  domknięty taki, że  $F \cap A = \mathcal{D}$ .

**DOWÓD:** Zauważmy przede wszystkim, że kule w przestrzeni  $A$  powstają  
jako przecięcie kul w przestrzeni  $X$  ze zbiorem  $A$ :

$$K^A(a, r) = K^X(a, r) \cap A$$

(1)  $\Rightarrow$   $\mathcal{O}$  otwarty w  $A$  oznacza że  $\mathcal{O} = \bigcup_{i \in I} K^A(a_i, r_i)$  gdzie  $I$  jest jakimś  
zbiorem indeksów. W szczególności  $i \in I$  można wziąć  $I = \emptyset$ .  
Wtedy jako  $U$  można wziąć  $\bigcup_{i \in I} K^X(a_i, r_i)$ .  $U$  jest oczywiście otwarty w  $X$   
i  $U \cap A = \mathcal{O}$

$\Leftarrow$  Weźmy teraz  $U \subset X$  otwarty i  $\mathcal{O} = U \cap A$ . Z otwartości  $U$  wynika, że  
dla  $a \in U \cap A$  istnieje  $K^X(a, r) \subset U$ . Weźmy  $K^X(a, r) \cap A = K^A(a, r)$   
mamy oczywiście  $K^A(a, r) \subset U \cap A = \mathcal{O}$  zatem  $a$  jest punktem  
wewnętrznym  $\mathcal{O}$  względem  $A$ .

(2) Dla zbiorów domkniętych użyjemy związku między zbiorami otwar-  
tymi i domkniętymi:

$(\mathcal{D} \text{ domknięty w } A) \Leftrightarrow ((A \setminus \mathcal{D}) \text{ otwarty w } A) \Leftrightarrow A \setminus \mathcal{D} = U \cap A$   
dla pewnego zbioru  $U$  otwartego w  $X$ , ten w szczególności  
 $X \setminus U$  jest domknięty w  $X$

$$(X \setminus U) \cap A = A \setminus U = A \setminus (U \cap A) = A \setminus \mathcal{D}$$

$\{x : x \in A \text{ i } x \notin U\}$  jako  $F$  można wziąć  $X \setminus U$ .