

GR II W CZASACH ZARAZY
9. WYKŁAD ZDALNY

POWIĄZANIE GŁÓWNE NA WIĄZCE GŁÓWNEJ

Dotychczasowe nasze rozważania, umotywowane koniec końców fizykalnie, doprowadziły nas do studium powiązania na wiązce włóknistej jako – w gruncie rzeczy – konstruktywnej odpowiedzi na pytanie o naturalne/użyteczne różniczkowanie jej cięć. W kontekście omówionej przez nas uniwersalnej zasady cechowania na pierwszy plan w tak zorientowanym studium wysuwa się konstrukcja powiązania na wiązce głównej, przy czym naturalnym jawi się rozpatrzenie warunków, w których powiązanie to jest zgodne z działaniem grupy strukturalnej we włóknie wiązki. Tym właśnie zajmujemy się obecnie.

Definicja 1. Powiązanie włókien w wiązce głównej (P_G, B, G, π_{P_G}) nazywamy **zgodnym z działaniem grupy strukturalnej**, ilekroć dyfeomorfizmy

$$P_{t_1, t_2}^\gamma : P_{G \gamma(t_1)} \xrightarrow{\cong} P_{G \gamma(t_2)}, \quad t_1, t_2 \in [0, 1]$$

spełniają warunki

$$(1) \quad \forall_{g \in G} : P_{t_1, t_2}^\gamma \circ r_g \upharpoonright_{P_{G \gamma(t_1)}} = r_g \circ P_{t_1, t_2}^\gamma,$$

przy czym wtedy

$$(2) \quad \nabla_{\mathcal{V}}(r_g \circ \sigma)(x) = T_{\sigma(x)} r_g (\nabla_{\mathcal{V}} \sigma(x)).$$

Powiązanie takie określamy również mianem **powiązania głównego włókien w wiązce** P_G .

Równie naturalnego pojęcia uzgodnienia struktur dostarcza

Definicja 2. Powiązanie Ehresmanna na wiązce głównej (P_G, B, G, π_{P_G}) nazywamy **zgodnym z działaniem grupy strukturalnej**, ilekroć odwzorowania $r_g, g \in G$ spełniają warunek

$$(3) \quad \forall_{p \in P_G} : H_{r_g(p)} P_G = T_p r_g (H_p P_G).$$

Powiązanie takie określamy również mianem **Ehresmanna powiązania głównego** na P_G .

Ażeby móc postąpić dalej w enumeracji naturalnych warunków uzgodnienia powiązania z działaniem grupy strukturalnej, potrzebujemy

Stwierdzenie 1. Przyjmijmy dotychczasowy zapis i niechaj \mathfrak{g} będzie algebrą Liego grupy strukturalnej G wiązki głównej (P_G, B, G, π_{P_G}) . Podwiązka pionowa VP_G wiązki stycznej TP_G nad przestrzenią totalną P_G jest trywialna w rozumieniu Przykł. 5.1 i istnieje kanoniczny izomorfizm wiązek wektorowych (nad \mathbb{R})

$$(VP_G, P_G, \mathbb{K}^{\dim G}, \pi_{TP_G} \upharpoonright_{VP_G}) \cong (P_G \times \mathfrak{g}, P_G, \mathbb{K}^{\dim G}, \text{pr}_1).$$

Dowód: Rozważmy odwzorowanie (jawnie \mathbb{R} -liniowe i gładkie)

$$\widetilde{\text{Vert}} : P_G \times \mathfrak{g} \xrightarrow{(\mathbf{0}_{TP_G}, \text{id}_{\mathfrak{g}})} TP_G \times \mathfrak{g} \cong T_{(\cdot, e)}(P_G \times G) \xrightarrow{T_{(\cdot, e)} r} VP_G \subset TP_G$$

$$(5) \quad : (p, X) \longmapsto (\mathbf{0}_{TP_G}(p), X) \longmapsto T_{(p, e)} r \cdot (\mathbf{0}_{TP_G}(p), X) \cong \widetilde{\text{Vert}}_p(X),$$

w którego definicji wykorzystujemy zerowe cięcie $\mathbf{0}_{TP_G}$ wiązki wektorowej TP_G nad P_G . Przeciwdziedzina powyższego odwzorowania jest poprawnie określona, oto bowiem z uwagi na charakter działania definiującego r , mamy

$$T_p \pi_{P_G} (\widetilde{\text{Vert}}_p(X)) \cong T_p \pi_{P_G} \circ T_{(p, e)} r \cdot (\mathbf{0}_{TP_G}(p), X) = T_{(p, e)} (\pi_{P_G} \circ r) (\mathbf{0}_{TP_G}(p), X)$$

$$\begin{aligned}
&= \mathsf{T}_{(p,e)}(\pi_{\mathsf{P}_G} \circ \text{pr}_1)(\mathbf{0}_{\mathsf{TP}_G}(p), X) = \mathsf{T}_{(p,e)}(\pi_{\mathsf{P}_G} \circ \mathbf{0}_{\mathsf{TP}_G}(p)) \\
&= \mathbf{0}_{\mathsf{TB}} \circ \pi_{\mathsf{P}_G}(p),
\end{aligned}$$

czyli – w istocie – nad dowolnym punktem $p \in \mathsf{P}_G$ zachodzi inkluzja

$$\text{Im } \widetilde{\text{Vert}}_p \subset \mathsf{V}_p \mathsf{P}_G,$$

a przy tym odwzorowanie $\widetilde{\text{Vert}}$ pokrywa identyczność na wspólnej bazie obu wiązek,

$$\pi_{\mathsf{P}_G}(\widetilde{\text{Vert}}_p(X)) = p \equiv \text{pr}_1(p, X),$$

mamy przeto do czynienia z morfizmem wiązek wektorowych nad P_G , a ponieważ obrazem pola (stałego) (\cdot, X) jest pole fundamentalne na P_G stowarzyszone z $X \ni \mathfrak{g}$,

$$(6) \quad \mathsf{T}_{(\cdot,e)r}(\mathbf{0}_{\mathsf{TP}_G}(\cdot), X) = \mathcal{K}_X$$

co pokazuje poniższy rachunek, przeprowadzony dla dowolnej $f \in C^1(\mathsf{P}_G, \mathbb{R})$ w punkcie (dowolnym) $p \in \mathsf{P}_G$,

$$\begin{aligned}
&\mathsf{T}_{\cdot,e}r(\mathbf{0}_{\mathsf{TP}_G}(\cdot), X)(f)(p) = \mathsf{T}_{p,e}r(\mathbf{0}_{\mathsf{TP}_G}(p), X) \lrcorner df(p) \\
&= (\mathbf{0}_{\mathsf{TP}_G}(p), X) \lrcorner d(r^*f)(p, e) = \frac{d}{dt} \upharpoonright_{t=0} f(p \triangleleft \exp(t \triangleright X)),
\end{aligned}$$

więc też wobec swobodnego charakteru działania G na P_G otrzymujemy równoważność

$$\widetilde{\text{Vert}}_p(X) = \mathbf{0}_{\mathsf{T}_p \mathsf{P}_G} \iff X = 0_{\mathfrak{g}},$$

czyli $\widetilde{\text{Vert}}$ jest monomorfizmem. Na podstawie porównania rzędów obu wiązek,

$$\text{rk}(\mathsf{P}_G \times \mathfrak{g}) = \dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{g} = \dim G \equiv \dim \mathsf{P}_{\pi_{\mathsf{P}_G}(p)} = \dim_{\mathbb{R}} \mathsf{T}_p(\mathsf{P}_{\pi_{\mathsf{P}_G}(p)}) \equiv \text{rk } \mathsf{VP}_G,$$

wniosujemy, że $\widetilde{\text{Vert}}$ jest w istocie postulowanym izomorfizmem. \square

Powyższe przygotowuje nas do wysłowienia naturalnej adaptacji pojęcia formy powiązania z Def. 8.4 do obecnych okoliczności, jakie precyzuje

Definicja 3. Forma powiązania głównego na wiązce głównej $(\mathsf{P}_G, \mathcal{B}, G, \pi_{\mathsf{P}_G})$ to morfizm wiązek wektorowych nad \mathbb{R}

$$(\mathcal{A}, \text{id}_{\mathsf{P}_G}) : \mathsf{TP}_G \longrightarrow \mathsf{P}_G \times \mathfrak{g}$$

o własnościach

$$(7) \quad \mathcal{A} \circ \widetilde{\text{Vert}} = \text{id}_{\mathsf{P}_G \times \mathfrak{g}}.$$

oraz

$$(8) \quad \forall_{g \in G} : \mathcal{A} \circ \mathsf{T}r_g = (r_g \times \mathsf{T}_e \text{Ad}_{g^{-1}}) \circ \mathcal{A}.$$

Wyznacza ona w naturalny sposób **potencjał powiązania głównego**

$$\underline{\mathcal{A}} := \text{pr}_2 \circ \mathcal{A} \in \Omega^1(\mathsf{P}_G) \otimes_{\mathbb{R}} \mathfrak{g}.$$

Uwaga 1. Powyższe stwierdzenie pozwala przekonać się, że podwiązka pionowa jest automatycznie zachowywana przez $\mathsf{T}r_g$. Istotnie, dla dowolnego wektora $v \in \mathsf{V}_p \mathsf{P}_G$, $p \in \mathsf{P}_G$ będącego przeciwobrazem $X = \text{pr}_2 \circ \widetilde{\text{Vert}}_p^{-1}(v) \in \mathfrak{g}$ i dowolnego elementu $g \in G$ obliczamy

$$\begin{aligned}
\mathsf{T}_p r_g(v) &= \mathsf{T}_p r_g \circ \widetilde{\text{Vert}}_p(X) \equiv \mathsf{T}_p r_g \left(\frac{d}{dt} \upharpoonright_{t=0} p \triangleleft \exp(t \triangleright X) \right) \\
&= \frac{d}{dt} \upharpoonright_{t=0} r_g(p \triangleleft \exp(t \triangleright X)) \equiv \frac{d}{dt} \upharpoonright_{t=0} r_g(p) \triangleleft \text{Ad}_{g^{-1}}(\exp(t \triangleright X)),
\end{aligned}$$

ale też w świetle Stw. 3.11 zachodzi tożsamość

$$\text{Ad}_{g^{-1}}(\exp(t \triangleright X)) = \exp(t \triangleright \mathsf{T}_e \text{Ad}_{g^{-1}}(X)),$$

możemy zatem powyższą równość przepisać w postaci

$$\mathsf{T}_p r_g(v) = \frac{d}{dt} \upharpoonright_{t=0} r_g(p) \triangleleft \exp(t \triangleright \mathsf{T}_e \text{Ad}_{g^{-1}}(X))$$

$$\equiv \widetilde{\text{Vert.}} \circ (r_g \times \text{T}_e \text{Ad}_{g^{-1}}) \circ \widetilde{\text{Vert.}}^{-1}(v),$$

skąd wniosek, że

$$(9) \quad \text{T}_p r_g \upharpoonright_{\mathbb{V}_p \mathbb{P}_G} = \widetilde{\text{Vert.}} \circ (r_g \times \text{T}_e \text{Ad}_{g^{-1}}) \circ \widetilde{\text{Vert.}}^{-1},$$

ten zaś dowodzi izomorficznego charakteru odwzorowania

$$\text{T}_p r_g \upharpoonright_{\mathbb{V}_p \mathbb{P}_G} : \mathbb{V}_p \mathbb{P}_G \longrightarrow \mathbb{V}_{r_g(p)} \mathbb{P}_G.$$

Możemy już teraz sformułować i udowodnić

Twierdzenie 1. W dowolnej wiązce głównej Ehresmanna powiązanie główne wyznacza powiązanie główne włókien. Ponadto forma powiązania głównego na tejże wiązce określa na niej Ehresmanna powiązanie główne.

Dowód: Wybrawszy dowolną ścieżkę $\gamma : [0, 1] \longrightarrow B$ spełniającą warunki $\gamma(0) = x$ i $\dot{\gamma}(0) = X \in \text{T}_x B$, a następnie – punkty: $p \in \mathbb{P}_x$ i $g \in G$, podnosimy γ poziomo do \mathbb{P}_G tworząc ścieżkę

$$\tilde{\gamma}_p : [0, 1] \longrightarrow \mathbb{P}_G$$

całkującą zagalenie początkowe

$$\frac{d}{dt} \tilde{\gamma}_p(t) = \text{Hor}_{\tilde{\gamma}_p(t)}(\dot{\gamma}(t)), \quad \tilde{\gamma}_p(0) = p,$$

gdzie Hor_q jest podniesieniem poziomym wektorów indukowanym przez powiązanie Ehresmanna wedle schematu opisanego w konstruktywnym dowodzie Tw. 8.1. Niech też $\tilde{\gamma}_{r_g(p)}$ będzie podniesieniem poziomym γ do \mathbb{P}_G przez $\tilde{\gamma}_{r_g(p)}(0) = r_g(p)$. Obliczamy

$$\frac{d}{dt} r_g \circ \tilde{\gamma}_p(t) = \text{T}_{\tilde{\gamma}_p(t)} r_g \left(\frac{d}{dt} \tilde{\gamma}_p(t) \right) = \text{T}_{\tilde{\gamma}_p(t)} r_g \circ \text{Hor}_{\tilde{\gamma}_p(t)}(\dot{\gamma}(t)) = \text{Hor}_{r_g \circ \tilde{\gamma}_p(t)}(\dot{\gamma}(t)),$$

przy czym ostatnia równość, odzwierciedlająca założoną zgodność powiązania Ehresmanna z działaniem grupy, pokazuje, że pchnięcie podniesienia (do p w $t = 0$) pola stycznego do γ , czyli $\text{T}_{\tilde{\gamma}_p(t)} r_g \circ \text{Hor}_{\tilde{\gamma}_p(t)}(\dot{\gamma}(t))$, jest także polem poziomym, czyli pewnym podniesieniem poziomym $\dot{\gamma}(t)$ (do $r_g \circ \tilde{\gamma}_p(0) = r_g(p)$ w $t = 0$). Krzywą całkową (lokalnie jedyną) poziomego podniesienia $\dot{\gamma}$ do TP_G przez $r_g(p)$ jest jednak – wprost z definicji – ścieżka $\tilde{\gamma}_{r_g(p)}$, zatem nieodzownie

$$\tilde{\gamma}_{r_g(p)} = r_g \circ \tilde{\gamma}_p,$$

a to w świetle konstrukcji dyfeomorfizmu $\mathbb{P}_{t_1, t_2}^\gamma$ oznacza pożądaną jego G -ekwiwariantność, (1).

Przechodząc do drugiej części tezy dowodzonego twierdzenia, zauważamy, że forma powiązania głównego definiuje – w świetle Tw. 2.4 – podwiązkę wektorową

$$(10) \quad \text{HP}_G := \text{Ker } \mathcal{A} \subset \text{TP}_G.$$

Przy tym dla dowolnego $v \in \text{Ker}(\text{T}\pi_{\mathbb{P}_G} \upharpoonright_{\mathbb{H}_p \mathbb{P}_G}) \equiv \text{Ker}(\mathcal{A} \upharpoonright_{\mathbb{T}_p \mathbb{P}_G}) \cap \text{Ker}(\text{T}\pi_{\mathbb{P}_G} \upharpoonright_{\mathbb{T}_p \mathbb{P}_G})$ stwierdzamy, że

$$\begin{aligned} v &= \widetilde{\text{Vert.}} \circ \widetilde{\text{Vert.}}^{-1}(v) \equiv \widetilde{\text{Vert.}} \circ \text{id}_{\mathbb{P}_G \times \mathfrak{g}} \circ \widetilde{\text{Vert.}}^{-1}(v) = \widetilde{\text{Vert.}} \circ (\mathcal{A} \circ \widetilde{\text{Vert.}}) \circ \widetilde{\text{Vert.}}^{-1}(v) \\ &= \widetilde{\text{Vert.}} \circ \mathcal{A}(v) = 0_{\mathbb{T}_p \mathbb{P}_G}, \end{aligned}$$

co przesądza o iniektywności $\text{T}\pi_{\mathbb{P}_G} \upharpoonright_{\mathbb{H}_p \mathbb{P}_G}$ i (tym samym) dowodzi istnienia izomorfizmu

$$\text{Im}(\text{T}\pi_{\mathbb{P}_G} \upharpoonright_{\mathbb{H}_p \mathbb{P}_G}) \cong \mathbb{H}_p \mathbb{P}_G.$$

Zarazem dla $\mathcal{A} \upharpoonright_{\mathbb{T}_p \mathbb{P}_G} \in \text{Hom}_{\mathbb{R}}(\mathbb{T}_p \mathbb{P}_G, \mathfrak{g})$ jest spełniona równość

$$\begin{aligned} \dim_{\mathbb{R}} \text{Ker}(\mathcal{A} \upharpoonright_{\mathbb{T}_p \mathbb{P}_G}) &= \dim_{\mathbb{R}} \mathbb{T}_p \mathbb{P}_G - \dim_{\mathbb{R}} \text{Im}(\mathcal{A} \upharpoonright_{\mathbb{T}_p \mathbb{P}_G}) \\ &= \dim_{\mathbb{R}} \mathbb{V}_p \mathbb{P}_G + \dim_{\mathbb{R}} \text{T}_{\pi_{\mathbb{P}_G}(p)} B - \dim_{\mathbb{R}} \mathfrak{g} = \dim_{\mathbb{R}} \text{T}_{\pi_{\mathbb{P}_G}(p)} B, \end{aligned}$$

co oznacza, że $\text{T}\pi_{\mathbb{P}_G} \upharpoonright_{\mathbb{H}_p \mathbb{P}_G}$ jest w istocie izomorfizmem. Na koniec przekonamy się o G -niezmienności tak określonej podwiązki poziomej. Niech zatem $\xi \in \mathbb{H}_p \mathbb{P}_G \equiv \text{Ker}(\mathcal{A} \upharpoonright_{\mathbb{T}_p \mathbb{P}_G})$, a wtedy

$$\mathcal{A} \circ \text{T}_p r_g(\xi) = (r_g \times \text{T}_e \text{Ad}_{g^{-1}}) \circ \mathcal{A}(\xi) = (r_g(p), \text{T}_e \text{Ad}_{g^{-1}}(0_{\mathfrak{g}})) = (r_g(p), 0_{\mathfrak{g}}),$$

więc prawdziwą jest inkluzja

$$\mathbb{T}_p r_g(\mathbb{H}_p \mathbb{P}_G) \subset \mathbb{H}_{r_g(p)} \mathbb{P}_G,$$

ale też w takim razie – wobec odwracalności $\mathbb{T}_p r_g$ –

$$\mathbb{T}_{r_g(p)} r_{g^{-1}}(\mathbb{H}_{r_g(p)} \mathbb{P}_G) \subset \mathbb{H}_{r_g^{-1} \circ r_g(p)} \mathbb{P}_G = \mathbb{H}_p \mathbb{P}_G,$$

czyli

$$\mathbb{H}_{r_g(p)} \mathbb{P}_G \equiv \mathbb{T}_p r_g \circ \mathbb{T}_{r_g(p)} r_{g^{-1}}(\mathbb{H}_{r_g(p)} \mathbb{P}_G) \subset \mathbb{T}_p r_g(\mathbb{H}_p \mathbb{P}_G),$$

co koniec końców daje nam pożądaną równość

$$\mathbb{T}_p r_g(\mathbb{H}_p \mathbb{P}_G) = \mathbb{H}_{r_g(p)} \mathbb{P}_G.$$

□

Odpowiedzi na fundamentalne pytanie o istnienie powiązania uzgodnionego dostarcza

Twierdzenie 2. Na dowolnej wiązce głównej istnieje forma powiązania głównego.

Dowód: Niechaj $(\mathbb{P}_G, B, G, \pi_{\mathbb{P}_G})$ będzie wiązką główną o lokalnych trywializacjach $\tau_i : \pi_{\mathbb{P}_G}^{-1}(\mathcal{O}_i) \xrightarrow{\cong} \mathcal{O}_i \times G$, $i \in I$. Wykorzystując relacje

$$\mathbb{T}_{(x,g)}(\mathcal{O}_i \times G) \equiv \mathbb{T}_x \mathcal{O}_i \oplus \mathbb{T}_g G \equiv \mathbb{T}_x \mathcal{O}_i \oplus \mathbb{T}_e \ell_g(\mathfrak{g}),$$

nad każdym z elementów pokrycia trywializującego \mathcal{O}_i definiujemy odwzorowanie

$$\mathcal{A}_i : \mathbb{T}_{\pi_{\mathbb{P}_G}^{-1}(\mathcal{O}_i)} \longrightarrow \pi_{\mathbb{P}_G}^{-1}(\mathcal{O}_i) \times \mathfrak{g} : \mathbb{T}_{\tau_i^{-1}(x,g)} \tau_i^{-1}(v, V) \longmapsto (\tau_i^{-1}(x, g), \mathbb{T}_g \ell_{g^{-1}}(V)),$$

jawnie \mathbb{R} -liniowe i zachowujące włókna. Sprawdzamy, że odwzorowania te mają własności wymienione w Def. 3. Po pierwsze więc, korzystając z przemienności diagramu

$$\begin{array}{ccc} \pi_{\mathbb{P}_G}^{-1}(\mathcal{O}_i) \times G & \xrightarrow{r} & \pi_{\mathbb{P}_G}^{-1}(\mathcal{O}_i) \\ \tau_i \times \text{id}_G \downarrow & & \downarrow \tau_i \\ \mathcal{O}_i \times G \times G & \xrightarrow{\text{id}_B \times m} & \mathcal{O}_i \times G \end{array}$$

oraz Równ. (3.4), obliczamy – dla dowolnego wektora $X \in \mathfrak{g}$ –

$$\begin{aligned} & \mathcal{A}_i \circ \widetilde{\text{Vert}}_{\tau_i^{-1}(x,g)}(X) \equiv \mathcal{A}_i \circ \mathbb{T}_{(\tau_i^{-1}(x,g), e)} r \cdot (\mathbf{0}_{\mathbb{T}\mathbb{P}_G} \circ \tau_i^{-1}(x, g), X) \\ &= \mathcal{A}_i \circ \mathbb{T}_{\tau_i^{-1}(x,g)} \tau_i^{-1} \circ \mathbb{T}_{(\tau_i^{-1}(x,g), e)} (\tau_i \circ r) \cdot (\mathbf{0}_{\mathbb{T}\mathbb{P}_G} \circ \tau_i^{-1}(x, g), X) \\ &= \mathcal{A}_i \circ \mathbb{T}_{\tau_i^{-1}(x,g)} \tau_i^{-1} \circ \mathbb{T}_{(x,g,e)} (\text{id}_B \times m) \circ \mathbb{T}_{(\tau_i^{-1}(x,g), e)} (\tau_i \times \text{id}_G) (\mathbf{0}_{\mathbb{T}\mathbb{P}_G} \circ \tau_i^{-1}(x, g), X) \\ &= \mathcal{A}_i \circ \mathbb{T}_{\tau_i^{-1}(x,g)} \tau_i^{-1} \circ (\mathbb{T}_x \text{id}_B \oplus \mathbb{T}_{(g,e)} m) (\mathbb{T}_{\tau_i^{-1}(x,g)} \tau_i \circ \mathbf{0}_{\mathbb{T}\mathbb{P}_G} \circ \tau_i^{-1}(x, g), \mathbb{T}_e \text{id}_G(X)) \\ &= \mathcal{A}_i \circ \mathbb{T}_{\tau_i^{-1}(x,g)} \tau_i^{-1} \circ (\text{id}_{\mathbb{T}_x B} \oplus \mathbb{T}_{(g,e)} m) (0_{\mathbb{T}_x B}, 0_{\mathbb{T}_g G}, \text{id}_{\mathbb{T}_e G}(X)) \\ &\equiv (\tau_i^{-1}(x, g), \mathbb{T}_g \ell_{g^{-1}} \circ \mathbb{T}_{(g,e)} m(0_{\mathbb{T}_g G}, X)) = (\tau_i^{-1}(x, g), \mathbb{T}_g \ell_{g^{-1}} \circ \mathbb{T}_e \ell_g(X)) \\ &= (\tau_i^{-1}(x, g), X) \equiv \text{id}_{\mathbb{P}_G \times \mathfrak{g}}(\tau_i^{-1}(x, g), X). \end{aligned}$$

Po drugie w dotychczasowych oznaczeniach i dla dowolnego elementu $h \in G$, a w odwołaniu do diagramu przemiennego

$$\begin{array}{ccc} \pi_{\mathbb{P}_G}^{-1}(\mathcal{O}_i) & \xrightarrow{r_h} & \pi_{\mathbb{P}_G}^{-1}(\mathcal{O}_i) \\ \uparrow \tau_i^{-1} & & \uparrow \tau_i^{-1} \\ \mathcal{O}_i \times G & \xrightarrow{\text{id}_B \times \wp_h} & \mathcal{O}_i \times G \end{array}$$

sprawdzamy warunek G-ekwiwariantności \mathcal{A}_i ,

$$\begin{aligned} & \mathcal{A}_i \circ \mathbb{T}r_h \circ \mathbb{T}_{\tau_i^{-1}(x,g)}\tau_i^{-1}(v, V) = \mathcal{A}_i \circ \mathbb{T}_{\tau_i^{-1}(x,gh)}\tau_i^{-1} \circ \mathbb{T}_{(x,g)}(\text{id}_B \times \wp_h)(v, V) \\ &= \mathcal{A}_i \circ \mathbb{T}_{\tau_i^{-1}(x,gh)}\tau_i^{-1} \circ (\mathbb{T}_x \text{id}_B \oplus \mathbb{T}_g \wp_h)(v, V) \\ &= \mathcal{A}_i \circ \mathbb{T}_{\tau_i^{-1}(x,gh)}\tau_i^{-1}(\text{id}_{\mathbb{T}_x B}(v), \mathbb{T}_g \wp_h(V)) \equiv (\tau_i^{-1}(x, gh), \mathbb{T}_{gh} \ell_{(gh)^{-1}} \circ \mathbb{T}_g \wp_h(V)) \\ &= (r_h \circ \tau_i^{-1}(x, g), \mathbb{T}_e \text{Ad}_{h^{-1}} \circ \mathbb{T}_g \ell_{g^{-1}}(V)) \\ &\equiv (r_h \times \mathbb{T}_e \text{Ad}_{h^{-1}}) \circ \mathcal{A}_i \circ \mathbb{T}_{\tau_i^{-1}(x,g)}\tau_i^{-1}(v, V). \end{aligned}$$

W świetle powyższych wyników \mathcal{A}_i tworzą rodzinę lokalnych form powiązania głównego. Wykorzystując dowolny rozkład jedności $\{\lambda_i\}_{i \in I}$ (klasy C^∞) stowarzyszony z pokryciem trywializującym $\{\mathcal{O}_i\}_{i \in I}$ bazy B , tworzymy z nich formę określoną (i gładką) globalnie

$$\mathcal{A}(\cdot) := \sum_{i \in I} \lambda_i \circ \pi_{\mathbb{P}_G} \circ \pi_{\mathbb{T}\mathbb{P}_G}(\cdot) \triangleright \mathcal{A}_i(\cdot),$$

o pożądanych własnościach. □

Wysłowiwszy kilka powiązanych wzajemnie definicji uzgodnienia struktur na wiązce głównej i zbadawszy zagadnienie istnienia (formy) powiązania głównego, możemy uzupełnić dotychczasową dyskusję o wskazanie podklasy morfizmów zachowujących to ostatnie.

Definicja 4. Przyjmijmy zapis Def. 1, 2 oraz 3 i niechaj $(\mathbb{P}_G^\alpha, B_\alpha, G, \pi_{\mathbb{P}_G^\alpha})$, $\alpha \in \{1, 2\}$ będą wiązkami głównymi z powiązaniem włókien. **Morfizm wiązek głównych z powiązaniem głównym włókien** (Φ, f, id_G) (nad dyfeomorfizmem baz i identycznością na grupie strukturalnej) pomiędzy \mathbb{P}_G^1 i \mathbb{P}_G^2 to morfizm wiązek włóknistych opisany przez diagram przemienny (5.1) dodatkowo spełniający warunek (FCM1) z Def. 8.4. Ilekroć na obu wiązkach określone jest Ehresmanna powiązanie główne, mianem **morfizmu wiązek głównych z Ehresmanna powiązaniem głównym** określamy morfizm wiązek głównych (opisany, jak poprzednio, przez diagram przemienny (5.1)), który dodatkowo spełnia warunek (FCM2) z Def. 8.4. Wreszcie też w obecności form powiązania głównego na obu wiązkach mówimy o **morfizmie wiązek głównych z formą powiązania głównego** (lub **zachowującym formę powiązania głównego**), jeśli morfizm (Φ, f, id_G) jest opisany, jak poprzednio, przez diagram przemienny (5.1), a nadto spełniony jest warunek

(PFCM3') morfizm Φ zachowuje formę powiązania głównego w rozumieniu równości

$$\mathcal{A}_2 \circ \mathbb{T}\Phi = (\Phi \times \text{id}_g) \circ \mathcal{A}_1.$$

W następnej kolejności przechodzimy do nader istotnego z fizycznego punktu widzenia opisu lokalnego powiązania uzgodnionego. Zaczynamy od pomocniczego

Stwierdzenie 2. Przyjmijmy dotychczasowy zapis i niechaj ∇ będzie pochodną kowariantną na wiązce głównej $(\mathbb{P}_G, B, G, \pi_{\mathbb{P}_G})$ stowarzyszoną z formą powiązania głównego. Odwzorowania α_i , $i \in I$ o definicji (8.8) są $C^\infty(B, G)$ -ekwiwariantne w drugim argumencie, tj. dla dowolnych:

odwzorowania $g \in C^\infty(B, G)$ oraz cięcia $\sigma \in \Gamma_{\text{loc}}(\mathbb{P}_G)$ przyjmującego postać $\tau_i \circ \sigma(\cdot) = (\cdot, \sigma_i(\cdot))$ w obrazie trywializacji lokalnej $\tau_i : \pi_{\mathbb{P}_G}^{-1}(\mathcal{O}_i) \xrightarrow{\cong} \mathcal{O}_i \times G$ zachodzi

$$\forall_{x \in \mathcal{O}_i} : \alpha_i(x, r_{g(x)}(\sigma(x))) = (\text{id}_{T^*B} \otimes T_{\sigma_i(x)} \wp_{g(x)}) \circ \alpha_i(x, \sigma(x)).$$

Dowód: Kluczowym dla naszych rozważań okaże się związek między pochodną kowariantną a formą powiązania głównego. Biorąc pod uwagę to, że rzut na podprzestrzeń wertykalną wzdłuż przestrzeni horyzontalnej w wiązce z powiązaniem Ehresmanna jest dany wzorem

$$P_{\mathbb{V}_p \mathbb{P}_G}^{\text{H}_p \mathbb{P}_G} \equiv \text{id}_{T_p \mathbb{P}_G} - \text{Hor}_p \circ T_p \pi_{\mathbb{P}_G},$$

oraz Równ. (8.4), możemy ustalić – dla dowolnego cięcia σ jak w treści stwierdzenia oraz dowolnego pola wektorowego $\mathcal{V} \in \Gamma_{(\text{loc})}(TB)$ – związek

$$\begin{aligned} \nabla_{\mathcal{V}} \sigma(\cdot) &= T_{\cdot} \sigma(\mathcal{V}) - \text{Hor}_{\sigma(\cdot)}(\mathcal{V}) = T_{\cdot} \sigma(\mathcal{V}) - \text{Hor}_{\sigma(\cdot)} \circ T_{\cdot} \text{id}_B(\mathcal{V}) \\ &= T_{\cdot} \sigma(\mathcal{V}) - \text{Hor}_{\sigma(\cdot)} \circ T_{\cdot} (\pi_{\mathbb{P}_G} \circ \sigma)(\mathcal{V}) \equiv P_{\mathbb{V}_{\sigma(\cdot)} \mathbb{P}_G}^{\text{H}_{\sigma(\cdot)} \mathbb{P}_G} \circ T_{\cdot} \sigma(\mathcal{V}). \end{aligned}$$

W połączeniu z identyfikacją, z dowodu Tw. 8.3, podwiązki horyzontalnej indykowanej przez formę powiązania oraz Stw. 1 daje nam to przydatną równość

$$(11) \quad \nabla_{\mathcal{V}} \sigma(\cdot) = \widetilde{\text{Vert}}_{\sigma(\cdot)} \circ \mathcal{A} \circ T_{\cdot} \sigma(\mathcal{V}).$$

Ta pozwala zapisać – w odwołaniu do szczegółowego rachunku przedstawionego w treści Uwagi 8.3 –

$$\begin{aligned} &T_x(\wp_{g(\cdot)}(\sigma_i(\cdot)))(V) + V \lrcorner \alpha_i(x, r_{g(x)}(\sigma(x))) \\ &\equiv \varpi_i \circ T_{r_{g(x)}(\sigma(x))} \tau_i(\nabla_{\mathcal{V}} r_{(\cdot)}(\sigma(\cdot))(x)) \\ &= \varpi_i \circ T_{r_{g(x)}(\sigma(x))} \tau_i \circ \widetilde{\text{Vert}}_{r_{g(x)}(\sigma(x))} \circ \mathcal{A} \circ T_x(r_{(\cdot)}(\sigma(\cdot)))(V) \\ &= \varpi_i \circ T_{r_{g(x)}(\sigma(x))} \tau_i \circ \widetilde{\text{Vert}}_{r_{g(x)}(\sigma(x))} \circ \mathcal{A}(T_{\sigma(x)} r_{g(x)} \circ T_x \sigma(V) \\ &\quad + (\mathcal{V} \lrcorner g^* \theta_{\mathbb{R}}^A)(x) R_A(r_{(\cdot)}(\sigma(\cdot)))(g(x))), \end{aligned}$$

przy czym w ostatniej linijce mamy do czynienia z pochodną odwzorowania $r_{(\cdot)}(\sigma(\cdot)) : G \rightarrow \mathbb{P}_G$ w kierunku pola prawoniezmienniczego R_A . Pochodną tę obliczamy bezpośrednio,

$$\begin{aligned} R_A(r_{(\cdot)}(\sigma(\cdot)))(g(x)) &\equiv \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} r_{(\cdot)}(\sigma(\cdot))(\exp(t \triangleright t_A) \cdot g(x)) \\ &= \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} r_{g(x)} \circ r_{\exp(t \triangleright t_A)}(\sigma(x)) = T_{\sigma(x)} r_{g(x)} \left(\frac{d}{dt} \Big|_{t=0} r_{\exp(t \triangleright t_A)}(\sigma(x)) \right) \\ &\equiv T_{\sigma(x)} r_{g(x)}(\mathcal{K}_{t_A}(\sigma(x))), \end{aligned}$$

gdzie \mathcal{K}_{t_A} jest polem wektorowym fundamentalnym (prawostronnym) na \mathbb{P}_G stowarzyszonym z generatorem t_A algebry Liego \mathfrak{g} . Podstawiając powyższy wynik do naszego wcześniejszego rachunku, a następnie wykorzystując tożsamości (8) oraz (9), otrzymujemy

$$\begin{aligned} &T_x(\wp_{g(\cdot)}(\sigma_i(\cdot)))(V) + V \lrcorner \alpha_i(x, r_{g(x)}(\sigma(x))) \\ &\equiv \varpi_i \circ T_{r_{g(x)}(\sigma(x))} \tau_i(\nabla_{\mathcal{V}} r_{(\cdot)}(\sigma(\cdot))(x)) \\ &= \varpi_i \circ T_{r_{g(x)}(\sigma(x))} \tau_i \circ \widetilde{\text{Vert}}_{r_{g(x)}(\sigma(x))} \circ \mathcal{A}(T_{\sigma(x)} r_{g(x)} \circ T_x \sigma(V) \\ &\quad + (\mathcal{V} \lrcorner g^* \theta_{\mathbb{R}}^A)(x) T_{\sigma(x)} r_{g(x)}(\mathcal{K}_{t_A}(\sigma(x)))) \\ &= \varpi_i \circ T_{r_{g(x)}(\sigma(x))} \tau_i \circ \widetilde{\text{Vert}}_{r_{g(x)}(\sigma(x))} \circ \mathcal{A} \circ T_{\sigma(x)} r_{g(x)}(T_x \sigma(V) \\ &\quad + (\mathcal{V} \lrcorner g^* \theta_{\mathbb{R}}^A)(x) \triangleright \mathcal{K}_{t_A}(\sigma(x))) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \varpi_i \circ \mathbb{T}_{r_{g(x)}(\sigma(x))} \tau_i \circ \widetilde{\text{Vert}}_{r_{g(x)}(\sigma(x))} \circ (r_{g(x)} \times \mathbb{T}_e \text{Ad}_{g(x)^{-1}}) \circ \mathcal{A}(\mathbb{T}_x \sigma(V) \\
&\quad + (\mathcal{V} \lrcorner g^* \theta_{\mathbb{R}}^A)(x) \triangleright \mathcal{K}_{t_A}(\sigma(x))) \\
&= \varpi_i \circ \mathbb{T}_{r_{g(x)}(\sigma(x))} \tau_i \circ \mathbb{T}_{\sigma(x)} r_{g(x)} \circ \widetilde{\text{Vert}}_{\sigma(x)} \circ \mathcal{A}(\mathbb{T}_x \sigma(V) \\
&\quad + (\mathcal{V} \lrcorner g^* \theta_{\mathbb{R}}^A)(x) \triangleright \mathcal{K}_{t_A}(\sigma(x))) \\
&= \varpi_i \circ \mathbb{T}_{\tau_i \circ \sigma(x)}(\text{id}_B \times \wp_{g(x)}) \circ \mathbb{T}_{\sigma(x)} \tau_i \circ \widetilde{\text{Vert}}_{\sigma(x)} \circ \mathcal{A}(\mathbb{T}_x \sigma(V) \\
&\quad + (\mathcal{V} \lrcorner g^* \theta_{\mathbb{R}}^A)(x) \triangleright \mathcal{K}_{t_A}(\sigma(x))) \\
&= \mathbb{T}_{\sigma_i(x)} \wp_{g(x)} \circ \varpi_i \circ \mathbb{T}_{\sigma(x)} \tau_i \circ \widetilde{\text{Vert}}_{\sigma(x)} \circ \mathcal{A}(\mathbb{T}_x \sigma(V) \\
&\quad + (\mathcal{V} \lrcorner g^* \theta_{\mathbb{R}}^A)(x) \triangleright \mathcal{K}_{t_A}(\sigma(x))) \\
&\equiv \mathbb{T}_{\sigma_i(x)} \wp_{g(x)} (\mathbb{T}_x \sigma_i(V) + V \lrcorner \alpha_i(x, \sigma(x)) \\
&\quad + (\mathcal{V} \lrcorner g^* \theta_{\mathbb{R}}^A)(x) \triangleright \varpi_i \circ \mathbb{T}_{\sigma(x)} \tau_i \circ \widetilde{\text{Vert}}_{\sigma(x)} \circ \mathcal{A} \circ \mathcal{K}_{t_A}(\sigma(x))).
\end{aligned}$$

Jeśli teraz uwzględnić pionową naturę pól fundamentalnych \mathcal{K}_A (wynikającą z charakteru działania definiującego r), to można powyższe przepisać w postaci

$$\begin{aligned}
&\mathbb{T}_x(\wp_{g(\cdot)}(\sigma_i(\cdot)))(V) + V \lrcorner \alpha_i(x, r_{g(x)}(\sigma(x))) \\
&= \mathbb{T}_{\sigma_i(x)} \wp_{g(x)} (\mathbb{T}_x \sigma_i(V) + V \lrcorner \alpha_i(x, \sigma(x)) \\
&\quad + (\mathcal{V} \lrcorner g^* \theta_{\mathbb{R}}^A)(x) \triangleright \varpi_i \circ \mathbb{T}_{\sigma(x)} \tau_i \circ \widetilde{\text{Vert}}_{\sigma(x)} \circ (\mathcal{A} \circ \widetilde{\text{Vert}}_{\sigma(x)}) \circ \widetilde{\text{Vert}}_{\sigma(x)}^{-1}(\mathcal{K}_{t_A}(\sigma(x)))) \\
&= \mathbb{T}_{\sigma_i(x)} \wp_{g(x)} (\mathbb{T}_x \sigma_i(V) + V \lrcorner \alpha_i(x, \sigma(x)) \\
&\quad + (\mathcal{V} \lrcorner g^* \theta_{\mathbb{R}}^A)(x) \triangleright \varpi_i \circ \mathbb{T}_{\sigma(x)} \tau_i(\mathcal{K}_{t_A}(\sigma(x)))) ,
\end{aligned}$$

a stąd już wprost wynika pożądana równość

$$V \lrcorner \alpha_i(x, r_{g(x)}(\sigma(x))) = \mathbb{T}_{\sigma_i(x)} \wp_{g(x)} (V \lrcorner \alpha_i(x, \sigma(x))).$$

□

Powyższe prowadzi nas wprost do

Definicja 5. Przyjmijmy zapis Def. 3 i niechaj $\tau_i : \pi_{\mathbb{P}_G}^{-1}(\mathcal{O}_i) \xrightarrow{\cong} \mathcal{O}_i \times G$, $i \in I$ będą trywializacjami lokalnymi wiązki głównej $(\mathbb{P}_G, B, G, \pi_{\mathbb{P}_G})$. Zdefiniujmy

$$s_{(i)} : \mathcal{O}_i \longrightarrow \pi_{\mathbb{P}_G}^{-1}(\mathcal{O}_i) : x \longmapsto \tau_i^{-1}(x, e).$$

Potencjał lokalny powiązania głównego \mathcal{A} na wiązce głównej \mathbb{P}_G nad \mathcal{O}_i (stowarzyszony z cięciami $s_{(i)}$) to odwzorowanie (klasy C^∞)

$$A_i \in \Omega^1(\mathcal{O}_i) \otimes_{\mathbb{R}} \mathfrak{g}$$

przyjmujące w dowolnym punkcie $x \in \mathcal{O}_i$ postać¹

$$(12) \quad A_i(x) := (\text{id}_{\mathbb{T}^*B} \otimes \underline{\mathcal{A}}) \circ \mathbb{T}_x s_{(i)}.$$

¹Odwzorowanie $\mathbb{T}_x s_{(i)} : \mathbb{T}_x \mathcal{O}_i \longrightarrow \mathbb{T}_{s_{(i)}(x)} \pi_{\mathbb{P}_G}^{-1}(\mathcal{O}_i)$ traktujemy tu jako element przestrzeni $\mathbb{T}_x^* \mathcal{O}_i \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{T}_{s_{(i)}(x)} \pi_{\mathbb{P}_G}^{-1}(\mathcal{O}_i)$.

Uwaga 2. Na podstawie relacji (11) między pochodną kowariantną a formą powiązania głównego oraz treści Stw. 2, a w odwołaniu do tych samych obserwacji co w dowodzie Stw. 2 oraz do Równ. (6) wprowadzamy (w użytych wcześniej oznaczeniach) dla cięcia

$$\sigma(x) = \tau_i^{-1}(x, \sigma_i(x)) = r_{\sigma_i(x)}(\tau_i^{-1}(x, e)) \equiv r_{\sigma_i(x)}(s_{(i)}(x))$$

związek

$$\begin{aligned} & (\text{id}_{T^*B} \otimes \text{pr}_2 \circ \widetilde{\text{Vert}}_{\sigma(x)}^{-1})(\nabla \cdot \sigma(x)) = (\text{id}_{T^*B} \otimes \underline{\mathcal{A}}) \circ T_x \sigma \\ & \equiv (\text{id}_{T^*B} \otimes \underline{\mathcal{A}}) \circ T_x (r_{\sigma_i(\cdot)}(s_{(i)}(\cdot))) \\ & = (\text{id}_{T^*B} \otimes \underline{\mathcal{A}}) \circ (\text{id}_{T^*B} \otimes T_{s_{(i)}(x)} r_{\sigma_i(x)}) \circ (T_x s_{(i)} + \sigma_i^* \theta_R^A(x) \otimes_{\mathbb{R}} \mathcal{K}_{t_A}(s_{(i)}(x))) \\ & = (\text{id}_{T^*B} \otimes T_e \text{Ad}_{\sigma_i(x)^{-1}}) \circ (\text{id}_{T^*B} \otimes \underline{\mathcal{A}}) \circ (T_x s_{(i)} + \sigma_i^* \theta_R^A(x) \otimes_{\mathbb{R}} \mathcal{K}_{t_A}(s_{(i)}(x))) \\ & = (\text{id}_{T^*B} \otimes T_e \text{Ad}_{\sigma_i(x)^{-1}}) \circ (A_i(x) \\ & \quad + \sigma_i^* \theta_R^A(x) \otimes_{\mathbb{R}} \text{pr}_2 \circ (\underline{\mathcal{A}} \circ \widetilde{\text{Vert}}_{s_i(x)}^{-1}) \circ \widetilde{\text{Vert}}_{s_i(x)}^{-1}(\mathcal{K}_{t_A}(s_{(i)}(x)))) \\ & = (\text{id}_{T^*B} \otimes T_e \text{Ad}_{\sigma_i(x)^{-1}}) \circ (A_i(x) + \sigma_i^* \theta_R^A(x) \otimes_{\mathbb{R}} \text{pr}_2(s_{(i)}(x), t_A)) \\ & \equiv (\text{id}_{T^*B} \otimes T_e \text{Ad}_{\sigma_i(x)^{-1}}) \circ (A_i(x) + (\sigma_i^* \otimes \text{id}_{\mathfrak{g}}) \theta_R(x)) \\ & = (\text{id}_{T^*B} \otimes T_e \text{Ad}_{\sigma_i(x)^{-1}}) \circ A_i(x) + (\sigma_i^* \otimes \text{id}_{\mathfrak{g}}) \theta_L(x), \end{aligned}$$

przy czym w ostatnim przejściu skorzystaliśmy z tożsamości (3.9).

Relację pomiędzy potencjałami lokalnymi ustala

Stwierdzenie 3. Przyjmijmy dotychczasowy zapis. W dowolnym punkcie $x \in \mathcal{O}_{ij}$ należącym do przecięcia dziedzin trywializacji lokalnych τ_i i τ_j wiązki głównej (P_G, B, G, π_{P_G}) o odwzorowaniach przejścia $g_{ij} : \mathcal{O}_{ij} \rightarrow G$ zachodzi tożsamość

$$A_j(x) = (\text{id}_{T^*B} \otimes T_e \text{Ad}_{g_{ij}(x)}) A_i(x) + (g_{ij}^* \otimes \text{id}_{\mathfrak{g}}) \theta_L(x).$$

Dowód: Wystarczy zauważyć, że

$$s_{(j)}(x) \equiv \tau_j^{-1}(x, e) = \tau_i^{-1}(x, g_{ij}(x)) = r_{g_{ij}(x)}(\tau_i^{-1}(x, e)) \equiv r_{g_{ij}(x)}(s_{(i)}(x)),$$

a następnie przeprowadzić rachunek analogiczny do tego z Uwagi 2. \square

Tak przygotowani możemy wreszcie omówić szczegółowo strukturę formy powiązania głównego w obrazie trywializacji lokalnej.

Stwierdzenie 4. Przyjmijmy zapis Def. 5. W obrazie trywializacji lokalnej $\tau_i : \pi_{P_G}^{-1}(\mathcal{O}_i) \xrightarrow{\cong} \mathcal{O}_i \times G$ forma powiązania głównego wyraża się przez potencjał tegoż powiązania, jak następuje:

$$\underline{\mathcal{A}} \circ T_{\tau_i^{-1}(x,g)} \tau_i^{-1} = (\text{id}_{T^*B} \otimes T_e \text{Ad}_{g^{-1}}) \circ A_i(x) + \theta_L(g),$$

przy czym obiekt po prawej stronie znaku równości należy traktować jako wektor z przestrzeni $T_{(x,g)}^*(\mathcal{O}_i \times G) \otimes_{\mathbb{R}} \mathfrak{g} \equiv (T_x^*B \otimes T_g^*G) \otimes_{\mathbb{R}} \mathfrak{g}$ w dowolnym punkcie $(x, g) \in \mathcal{O}_i \times G$.

Dowód: Uwzględniając powyższy rozkład przestrzeni $T_{(x,g)}^*(\mathcal{O}_i \times G)$, możemy zawsze zapisać

$$(13) \quad \underline{\mathcal{A}} \circ T_{\tau_i^{-1}(x,g)} \tau_i^{-1} = a_i(x; g) + \vartheta_i(g; x),$$

gdzie $a_i(x; g) \in T_x^*B \otimes_{\mathbb{R}} \mathfrak{g}$ oraz $\vartheta_i(g; x) \in T_g^*G \otimes_{\mathbb{R}} \mathfrak{g}$ są 1-formami o własnościach

$$\forall (v, V) \in T_x B \oplus T_g G : V \lrcorner a_i(x; g) = 0_{\mathfrak{g}} = v \lrcorner \vartheta_i(g; x).$$

Rozłożywszy 1-formę $\vartheta_i(g; x)$ w bazie utworzonej przez formy lewo niezmiennicze,

$$\vartheta_i(g; x) =: \vartheta_{iA}^B(x, g) \triangleright \theta_L^A(g) \otimes_{\mathbb{R}} t_B,$$

obliczamy najpierw obie strony Równ. (13) na wektorze pionowym $(0_{\mathbb{T}_{xB}}, L_A(g))$, dostając – w odwołaniu do definicji (5) i Równ. (6), jak również Równ. (7) –

$$\begin{aligned} \vartheta_{iA}^B(x, g) \triangleright t_A &= L_A(g) \lrcorner \vartheta_i(g; x) = (0_{\mathbb{T}_{xB}}, L_A(g)) \lrcorner (a_i(x; g) + \vartheta_i(g; x)) \\ &= \underline{\mathcal{A}} \circ \mathbb{T}_{\tau_i^{-1}(x, g)} \tau_i^{-1}(0_{\mathbb{T}_{xB}}, L_A(g)) = \underline{\mathcal{A}}(\mathcal{K}_{t_A}(\tau_i^{-1}(x, g))) \\ &= \underline{\mathcal{A}} \circ \widetilde{\text{Vert}}_{\tau_i^{-1}(x, g)}(t_A) = \text{pr}_2(\tau_i^{-1}(x, g), t_A) = t_A. \end{aligned}$$

Wnioskujemy na tej podstawie, że

$$\vartheta_i(g; x) \equiv \theta_L(g).$$

W następnej kolejności w miejsce wektora pionowego wstawiamy $(v, 0_{\mathbb{T}_gG})$ i wykorzystujemy tożsamość

$$\begin{aligned} \mathbb{T}_{\tau_i^{-1}(x, g)} \tau_i^{-1}(v, 0_{\mathbb{T}_gG}) &= \mathbb{T}_{\tau_i^{-1}(x, g)} \tau_i^{-1} \circ \mathbb{T}_{(x, e)}(\text{id}_B \times \wp_g)(v, 0_{\mathbb{T}_eG}) \\ &= \mathbb{T}_{(x, e)}(\tau_i^{-1} \circ (\text{id}_B \times \wp_g))(v, 0_{\mathbb{T}_eG}) = \mathbb{T}_{(x, e)}(r_g \circ \tau_i^{-1})(v, 0_{\mathbb{T}_eG}) \\ &= \mathbb{T}_{\tau_i^{-1}(x, e)} r_g \circ \mathbb{T}_{\tau_i^{-1}(x, g)} \tau_i^{-1}(v, 0_{\mathbb{T}_eG}) \equiv \mathbb{T}_{\tau_i^{-1}(x, e)} r_g \circ \mathbb{T}_{\tau_i^{-1}(x, g)} \tau_i^{-1} \circ \mathbb{T}_x(\cdot, e)(v) \\ &= \mathbb{T}_{\tau_i^{-1}(x, e)} r_g \circ \mathbb{T}_x(\tau_i^{-1} \circ (\cdot, e))(v) = \mathbb{T}_{\tau_i^{-1}(x, e)} r_g \circ \mathbb{T}_x s(i)(v) \end{aligned}$$

która pozwala (dzięki Równ. (8)) zastosować bezpośrednio definicję (12) potencjału powiązania głównego i tym sposobem otrzymać

$$\begin{aligned} v \lrcorner a_i(x; g) &= (v, 0_{\mathbb{T}_gG}) \lrcorner (a_i(x; g) + \vartheta_i(g; x)) = \underline{\mathcal{A}} \circ \mathbb{T}_{\tau_i^{-1}(x, g)} \tau_i^{-1}(v, 0_{\mathbb{T}_gG}) \\ &= \underline{\mathcal{A}} \circ \mathbb{T}_{\tau_i^{-1}(x, e)} r_g \circ \mathbb{T}_x s(i)(v) = \text{pr}_2 \circ (r_g \times \mathbb{T}_e \text{Ad}_{g^{-1}}) \circ \underline{\mathcal{A}} \circ \mathbb{T}_x s(i)(v) \\ &= \mathbb{T}_e \text{Ad}_{g^{-1}} \circ \underline{\mathcal{A}} \circ \mathbb{T}_x s(i)(v) \equiv \mathbb{T}_e \text{Ad}_{g^{-1}} \circ (v \lrcorner A_i(x)), \end{aligned}$$

więc też – wobec dowolności v –

$$a_i(x; g) = (\text{id}_{\mathbb{T}^*B} \otimes \mathbb{T}_e \text{Ad}_{g^{-1}}) \circ A_i(x).$$

Ostatecznie zatem odtwarzamy postulowaną prezentację lokalną formy powiązania głównego. \square

Tym sposobem docieramy do podstawowego rezultatu naszej analizy, jakim jest uogólnienie twierdzenia o rekonstrukcji wiązki (główniej) na podstawie jej danych lokalnych na przypadek wiązki głównej z powiązaniem uzgodnionym.

Twierdzenie 3 (O rekonstrukcji wiązki głównej z powiązaniem). Przyjmijmy dotychczasowy zapis. Każda wiązka główna (P_G, B, G, π_{P_G}) z formą powiązania głównego wyznacza nad swym pokryciem trywializującym² $\{\mathcal{O}_i\}_{i \in I}$

- rodzinę $\{g_{ij}\}_{(i, j) \in (I \times 2)_\emptyset}$ odwzorowań lokalnie gładkich

$$g_{ij} : \mathcal{O}_{ij} \longrightarrow G$$

spełniających warunek 1-kocyklu (1.12);

- rodzinę $\{A_i\}_{i \in I}$ lokalnie gładkich 1-form o wartościach w algebrze Liego \mathfrak{g} grupy Liego G

$$A_i \in \Omega^1(\mathcal{O}_i) \otimes_{\mathbb{R}} \mathfrak{g}$$

spełniających warunki

$$\forall (i, j) \in (I \times 2)_\emptyset, x \in \mathcal{O}_{ij} : A_j(x) = (\text{id}_{\mathbb{T}^*B} \otimes \mathbb{T}_e \text{Ad}_{g_{ji}(x)}) \circ A_i(x) + (g_{ij}^* \otimes \text{id}_{\mathfrak{g}}) \theta_L(x).$$

²Nie zakładamy, że pokrycie to jest dobre.

I odwrotnie, niechaj $\mathcal{O} = \{\mathcal{O}_i\}_{i \in I}$ będzie pokryciem otwartym rozmaitości gładkiej B . Dowolna stowarzyszona z \mathcal{O} para rodzin odwzorowań lokalnie gładkich

$$\left(\{g_{ij}\}_{(i,j) \in (I \times 2)_{\mathcal{O}}}, \{A_k\}_{k \in I} \right)$$

spełniających powyższe warunki określa – zgodnie z (konstruktywnym dowodem) Tw. 1.4 – wiązkę główną $P_G = (\bigsqcup_{i \in I} (\mathcal{O}_i \times G)) / g_{\cdot}$ o grupie strukturalnej G i o odwzorowaniach przejścia stowarzyszonych z \mathcal{O}_{ij} tożsamy z g_{ij} , $(i, j) \in (I \times 2)_{\mathcal{O}}$ oraz formie powiązania głównego zadawanej formułą

$$(14) \quad \mathcal{A}(v, V) := (x, g, v \lrcorner (\text{id}_{T^*B} \otimes T_e \text{Ad}_{g^{-1}}) \circ A_i(x) + V \lrcorner \theta_L(g)), \quad (x, g) \in \mathcal{O}_i \times G,$$

zapisaną dla dowolnego wektora $(v, V) \in T_x \mathcal{O}_i \oplus T_g G \equiv T_{(x,g)}(\mathcal{O}_i \times G)$. Ilekroć odwzorowania te są danymi lokalnymi pewnej wiązki głównej nad B o włóknach typowym G , ta ostatnia wiązka jest izomorficzna z wiązką określaną przez g_{ij} i A_i .

Dowód: Pierwsza część tezy wynika wprost z wcześniejszej analizy oraz z Tw. 1.4. Trzeba jeszcze tylko określić stosowne działanie grupy strukturalnej G na włóknach wiązki zrekonstruowanej według schematu przedstawionego w dowodzie Tw. 1.4,

$$P_G = \left(\bigsqcup_{i \in I} (\mathcal{O}_i \times G) \right) / g_{\cdot}.$$

Definiujemy odwzorowanie

$$r. : P_G \times G \longrightarrow P_G : [(x, g, i), h] \longmapsto [(x, g \cdot h, i)],$$

którego gładkość jest konsekwencją surjektywnej submersywności odwzorowania π_{\cdot} zadanego analogicznie jak to z dowodu Tw. 1.3 oraz Stw. Niezb.10 – istotnie, $r.$ jest (jedynym) odwzorowaniem domykającym diagram przemienny

$$\begin{array}{ccc} & & P_G \\ & \nearrow \pi_{\cdot} \circ \tilde{R} & \uparrow r. \\ \bigsqcup_{i \in I} (\mathcal{O}_i \times G) \times G & \xrightarrow{\pi_{\cdot} \times \text{id}_G} & P_G \times G \end{array} \quad , ,$$

w którym

$$\tilde{R} : \bigsqcup_{i \in I} (\mathcal{O}_i \times G) \times G \longrightarrow \bigsqcup_{i \in I} (\mathcal{O}_i \times G) : ((x, g, i), h) \longmapsto (x, g \cdot h, i)$$

jest jawnie gładkie.

Na obecnym etapie pozostaje jedynie upewnić się, że zrekonstruowana z danych lokalnych forma powiązania jest obiektem globalnie gładkim (klasy C^∞) o własnościach opisanych w Def. 3. Zasadniczo wniosek taki daje się prosto wyprowadzić ze Stw. 4, niemniej jednak my moźolnie sprawdzimy wszystkie własności. Mamy zatem do porównania, w dowolnym punkcie $x \in \mathcal{O}_{ij}$, wynik ewaluacji na dowolnym wektorze $(v, V) \in T_x \mathcal{O}_i \oplus T_g G$ 1-formy \mathcal{A} wyrażonej w terminach potencjału lokalnego A_i z wynikiem ewaluacji na obrazie tegoż wektora względem odwzorowania stycznego do transformacji przejścia $(x, g) \longmapsto (x, g_{ji}(x) \cdot g)$ 1-formy \mathcal{A} wyrażonej w terminach potencjału lokalnego A_j . Przy tym zamiast pchać (v, V) wzdłuż odwzorowania przejścia, moglibyśmy równoważnie cofnąć wzdłuż tegoż odwzorowania 1-formę A_j , a następnie obliczyć ją na (v, V) . Wystarczy zatem porównać wynik cofnięcia 1-formy \mathcal{A} zapisanej przy użyciu potencjału A_j z tą samą 1-formą wyrażoną w terminach potencjału A_i , co czyniąc w odwołaniu do Stw. 3, 3.17 oraz 3.13, otrzymujemy pożądaną wynik:

$$\begin{aligned} & (\text{id}_{T^*B} \otimes T_e \text{Ad}_{(g_{ji}(x) \cdot g)^{-1}}) \circ A_j(x) + \theta_L(g_{ji}(x) \cdot g) \\ = & (\text{id}_{T^*B} \otimes T_e \text{Ad}_{g^{-1}}) \circ (\text{id}_{T^*B} \otimes T_e \text{Ad}_{g_{ji}(x)^{-1}}) \circ ((\text{id}_{T^*B} \otimes T_e \text{Ad}_{g_{ji}(x)}) \circ A_i(x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& +(g_{ij}^* \otimes \text{id}_{\mathfrak{g}})\theta_L(x)) + \theta_L(g) + (\text{id}_{\mathbb{T}^*G} \otimes \mathbb{T}_e \text{Ad}_{g^{-1}}) \circ (g_{ji}^* \otimes \text{id}_{\mathfrak{g}})\theta_L(x) \\
= & (\text{id}_{\mathbb{T}^*B} \otimes \mathbb{T}_e \text{Ad}_{g^{-1}}) \circ A_i(x) + \theta_L(g) + (\text{id}_{\mathbb{T}^*G} \otimes \mathbb{T}_e \text{Ad}_{g^{-1}}) \circ (g_{ji}^* \otimes \text{id}_{\mathfrak{g}})\theta_L(x) \\
& + (\text{id}_{\mathbb{T}^*B} \otimes \mathbb{T}_e \text{Ad}_{g^{-1}}) \circ (\text{id}_{\mathbb{T}^*B} \otimes \mathbb{T}_e \text{Ad}_{g_{ji}(x)^{-1}}) \circ (g_{ji}^* \otimes \text{id}_{\mathfrak{g}}) \circ (\text{Inv}^* \otimes \text{id}_{\mathfrak{g}})\theta_L(x) \\
= & (\text{id}_{\mathbb{T}^*B} \otimes \mathbb{T}_e \text{Ad}_{g^{-1}}) \circ A_i(x) + \theta_L(g) + (\text{id}_{\mathbb{T}^*G} \otimes \mathbb{T}_e \text{Ad}_{g^{-1}}) \circ (g_{ji}^* \otimes \text{id}_{\mathfrak{g}})\theta_L(x) \\
& - (\text{id}_{\mathbb{T}^*B} \otimes \mathbb{T}_e \text{Ad}_{g^{-1}}) \circ (\text{id}_{\mathbb{T}^*B} \otimes \mathbb{T}_e \text{Ad}_{g_{ji}(x)^{-1}}) \circ (g_{ji}^* \otimes \text{id}_{\mathfrak{g}})\theta_R(x) \\
= & (\text{id}_{\mathbb{T}^*B} \otimes \mathbb{T}_e \text{Ad}_{g^{-1}}) \circ A_i(x) + \theta_L(g) + (\text{id}_{\mathbb{T}^*G} \otimes \mathbb{T}_e \text{Ad}_{g^{-1}}) \circ (g_{ji}^* \otimes \text{id}_{\mathfrak{g}})\theta_L(x) \\
& - (\text{id}_{\mathbb{T}^*B} \otimes \mathbb{T}_e \text{Ad}_{g^{-1}}) \circ (\text{id}_{\mathbb{T}^*B} \otimes \mathbb{T}_e \text{Ad}_{g_{ji}(x)^{-1}}) \circ (\text{id}_{\mathbb{T}^*G} \otimes \mathbb{T}_e \text{Ad}_{g_{ji}(x)}) \\
& \circ (g_{ji}^* \otimes \text{id}_{\mathfrak{g}}) \circ \theta_L(x) = (\text{id}_{\mathbb{T}^*B} \otimes \mathbb{T}_e \text{Ad}_{g^{-1}}) \circ A_i(x) + \theta_L(g).
\end{aligned}$$

Drugą z oczekiwanych własności, Równ. (7), sprawdzamy w bezpośrednim odwołaniu do Równ. (6), zauważając na wstępie, że postać (włókna) wiązki odtworzonej z danych lokalnych w konstruktywnym dowodzie Tw.1.4 prowadzi do utożsamienia $\mathcal{K}_X(x, g) \equiv (0_{\mathbb{T}_x B}, L_X(g))$ w dziedzinie $\pi_{\mathbb{P}_G}^{-1}(\mathcal{O}_i) \ni (x, g)$ trywializacji lokalnej wiązki zrekonstruowanej \mathbb{P}_G . W obrazie tejże trywializacji otrzymujemy więc – dla dowolnego wektora $X \in \mathfrak{g}$ – równość

$$\mathcal{A} \circ \widetilde{\text{Vert}}_{(x, g)}(X) \equiv \mathcal{A}(0_{\mathbb{T}_x B}, L_X(g)) = (x, g, L_X \lrcorner \theta_L(g)) \equiv (x, g, X).$$

Na koniec wreszcie upewniamy się o G-ekwivariantności zapostulowanej formy powiązania głównego. W równości

$$\begin{aligned}
\mathcal{A} \circ \mathbb{T}_{(x, g)}(\text{id}_B \times \wp_h)(v, V) &= \mathcal{A} \circ (\text{id}_{\mathbb{T}B} \oplus \mathbb{T}_g \wp_h)(v, V) \\
&= (x, g \cdot h, v \lrcorner (\text{id}_{\mathbb{T}^*B} \otimes \mathbb{T}_e \text{Ad}_{(g \cdot h)^{-1}}) \circ A_i(x) + \mathbb{T}_g \wp_h(V) \lrcorner \theta_L(g \cdot h)),
\end{aligned}$$

uwzględniamy więc raz jeszcze Stw. 3.13, które pozwala przepisać

$$\mathbb{T}_g \wp_h(V) \lrcorner \theta_L(g \cdot h) = V \lrcorner (\wp_h^* \otimes \text{id}_{\mathfrak{g}})\theta_L(g) = V \lrcorner (\text{id}_{\mathbb{T}^*G} \otimes \mathbb{T}_e \text{Ad}_{h^{-1}}) \circ \theta_L(g),$$

a zatem także

$$\begin{aligned}
\mathcal{A} \circ \mathbb{T}_{(x, g)}(\text{id}_B \times \wp_h)(v, V) &= ((\text{id}_B \times \wp_h) \times (\text{id}_{\mathbb{T}^*B} \otimes \mathbb{T}_e \text{Ad}_{h^{-1}}))(x, g, \\
& v \lrcorner (\text{id}_{\mathbb{T}^*B} \otimes \mathbb{T}_e \text{Ad}_{g^{-1}}) \circ A_i(x) + V \lrcorner \theta_L(g)) \\
&\equiv ((\text{id}_B \times \wp_h) \times (\text{id}_{\mathbb{T}^*B} \otimes \mathbb{T}_e \text{Ad}_{h^{-1}})) \circ \mathcal{A}(v, V).
\end{aligned}$$

□

Ten sam schemat możemy następnie zrealizować w odniesieniu do stosownych morfizmów.

Twierdzenie 4. Przyjmijmy dotychczasowy zapis i niechaj $(\mathbb{P}_G^\alpha, B, G, \pi_{\mathbb{P}_G^\alpha})$, $\alpha \in \{1, 2\}$ będą dwiema wiązkami głównymi (o wspólnej grupie strukturalnej G) z formą powiązania głównego nad wspólną bazą B , o odnośnych trywializacjach lokalnych $\tau_i^\alpha : \pi_{\mathbb{P}_G^\alpha}^{-1}(\mathcal{O}_i) \xrightarrow{\cong} \mathcal{O}_i \times G$ stowarzyszonych ze wspólnym pokryciem trywializującym $\mathcal{O} = \{\mathcal{O}_i\}_{i \in I}$, przy czym wprowadzamy dwie rodziny cięć lokalnych:

$$s_{(i)}^\alpha := \tau_i^{\alpha-1}(\cdot, e) : \mathcal{O}_i \longrightarrow \mathbb{P}_G^\alpha, \quad \alpha \in \{1, 2\},$$

a wraz z nimi – odwzorowania przejścia $g_{ij}^\alpha : \mathcal{O}_{ij} \longrightarrow G$, $\alpha \in \{1, 2\}$ oraz 1-formy $A_i^\alpha \in \Omega^1(\mathcal{O}_i) \otimes_{\mathbb{R}} \mathfrak{g}$, $\alpha \in \{1, 2\}$ o wartościach w algebrze Liego \mathfrak{g} grupy Liego G . Dowolny morfizm wiązek głównych

zachowujący formę powiązania głównego,

$$\begin{array}{ccc} P_G^1 & \xrightarrow{\Phi} & P_G^2 \\ \pi_{P_G^1} \downarrow & & \downarrow \pi_{P_G^2} \\ B & \xlongequal{\text{id}_B} & B \end{array},$$

zadaje rodzinę $\{h_i\}_{i \in I}$ odwzorowań (lokalnie) klasy C^∞

$$h_i : \mathcal{O}_i \longrightarrow G, \quad i \in I$$

spełniających warunki: (5.3) oraz

$$(15) \quad \forall_{x \in \mathcal{O}_i} : A_i^2(x) = (\text{id}_{T^*B} \otimes T_e \text{Ad}_{h_i(x)}) \circ A_i^1(x) + ((\text{Inv} \circ h_i)^* \otimes \text{id}_{\mathfrak{g}}) \theta_L(x).$$

I odwrotnie, każda taka rodzina wyznacza jedyny morfizm opisanego typu.

Dowód: Po uwzględnieniu Tw. 5.1 pozostaje zweryfikować zapostulowaną formułę transformacyjną dla potencjału powiązania. W tym celu przywołujemy warunek (PFCM3') z Def. 4 i podstawiamy go do definicji (12) tegoż potencjału, wykorzystując prostą zależność

$$\tau_i^{2-1}(x, h_i(x)) = \Phi(\tau_i^{1-1}(x, e)),$$

którą przepisujemy w obecnej notacji jako

$$\Phi \circ s_{(i)}^1(x) = r_{h_i(x)}(s_{(i)}^2(x)).$$

Otrzymujemy tym sposobem z jednej strony równość

$$\begin{aligned} & (\text{id}_{T^*B} \otimes \underline{A}_2 \circ T_{s_{(i)}^1(x)} \Phi) \circ T_x s_{(i)}^1 = (\text{id}_{T^*B} \otimes \text{pr}_2 \circ (\Phi \times \text{id}_{\mathfrak{g}}) \circ \mathcal{A}_1) \circ T_x s_{(i)}^1 \\ & = (\text{id}_{T^*B} \otimes \underline{A}_1) \circ T_x s_{(i)}^1 \equiv A_i^1(x), \end{aligned}$$

z drugiej zaś – w świetle szczegółowych rachunków z Uwagi 2 –

$$\begin{aligned} & (\text{id}_{T^*B} \otimes \underline{A}_2 \circ T_{s_{(i)}^1(x)} \Phi) \circ T_x s_{(i)}^1 = (\text{id}_{T^*B} \otimes \underline{A}_2) \circ T_x (r_{h_i(\cdot)}(s_{(i)}^2(\cdot))) \\ & = (\text{id}_{T^*B} \otimes T_e \text{Ad}_{h_i(x)^{-1}}) \circ A_i^2(x) + (h_i^* \otimes \text{id}_{\mathfrak{g}}) \theta_L(x). \end{aligned}$$

Zestawiwszy powyższe wyniki, uzyskujemy – w odwołaniu do Stw. 3.13 – oczekiwaną tożsamość,

$$\begin{aligned} A_i^2(x) &= (\text{id}_{T^*B} \otimes T_e \text{Ad}_{h_i(x)}) \circ A_i^1(x) - (\text{id}_{T^*B} \otimes T_e \text{Ad}_{h_i(x)}) \circ (h_i^* \otimes \text{id}_{\mathfrak{g}}) \theta_L(x) \\ &= (\text{id}_{T^*B} \otimes T_e \text{Ad}_{h_i(x)}) \circ A_i^1(x) - (h_i^* \otimes \text{id}_{\mathfrak{g}}) \theta_R(x) \\ &= (\text{id}_{T^*B} \otimes T_e \text{Ad}_{h_i(x)}) \circ A_i^1(x) + ((\text{Inv} \circ h_i)^* \otimes \text{id}_{\mathfrak{g}}) \theta_R(x). \end{aligned}$$

I odwrotnie, mając rodzinę $h_i : \mathcal{O}_i \longrightarrow G$, $i \in I$ odwzorowań z treści dowodzonego stwierdzenia, określamy odwzorowania lokalne

$$\Phi_i : \pi_{P_G^1}^{-1}(\mathcal{O}_i) \longrightarrow \pi_{P_G^2}^{-1}(\mathcal{O}_i) : \tau_i^{1-1}(x, g) \longmapsto \tau_i^{2-1}(x, h_i(x) \cdot g), \quad i \in I.$$

Łatwo przekonujemy się, że są to w istocie ograniczenia odwzorowania globalnie gładkiego $\Phi : P_G^1 \longrightarrow P_G^2$ do poszczególnych elementów pokrycia trywializującego, $\Phi|_{\pi_{P_G^1}^{-1}(\mathcal{O}_i)} = \Phi_i$, oto bowiem

w dowolnym punkcie $x \in \mathcal{O}_{ij}$ zachodzi równość

$$\begin{aligned} \Phi_j \circ s_{(i)}^1(x) &= \Phi_j \circ \tau_j^{1-1}(x, g_{ji}^1(x)) = \tau_j^{2-1}(x, h_j(x) \cdot g_{ji}^1(x)) \\ &= \tau_j^{2-1}(x, g_{ji}^2(x) \cdot h_i(x)) = \tau_i^{1-1}(x, h_i(x)) \equiv \Phi_i \circ s_{(i)}^1(x), \end{aligned}$$

a nadto odwzorowania Φ_i są G-ekwiwariantne, co sprawdzamy dla dowolnych $x \in \mathcal{O}_i$ oraz $g, h \in G$,

$$\Phi_i \circ r_h^1 \circ \tau_i^{1-1}(x, g) = \Phi_i \circ \tau_i^{1-1}(x, g \cdot h) = \tau_i^{2-1}(x, h_i(x) \cdot g \cdot h)$$

$$= r_h^2(\tau_i^{2-1}(x, h_i(x) \cdot g)) \equiv r_h^2 \circ \Phi_i \circ \tau_i^{1-1}(x, g).$$

Na zakończenie dowodu sprawdzamy warunek (PFCM3') z Def. 4. Czynimy to w obrazie trywializacji lokalnej τ_i , posługując się przy tym Stw. 4. Oto więc stwierdzamy równość

$$\begin{aligned} & \underline{\mathcal{A}}_2 \circ \mathbb{T}\Phi \circ \mathbb{T}_{\tau_i^{1-1}(x,g)} \tau_i^{1-1} \\ & \equiv (\underline{\mathcal{A}}_2 \circ \mathbb{T}_{\tau_i^{2-1}(x,g)} \tau_i^{2-1}) \circ \mathbb{T}_{\tau_i^{1-1}(x,g)} (\tau_i^2 \circ \Phi \circ \tau_i^{1-1}) \\ & \equiv (\tau_i^2 \circ \Phi \circ \tau_i^{1-1})^* ((\text{id}_{\mathbb{T}^*B} \otimes \mathbb{T}_e \text{Ad}_{\text{Inv} \circ \text{pr}_2(\cdot)}) \circ \text{pr}_1^* \mathcal{A}_i^2 + \text{pr}_2^* \theta_L)(x, g) \\ & = ((\text{id}_{\mathbb{T}^*B} \otimes \mathbb{T}_e \text{Ad}_{\text{Inv} \circ \text{pr}_2(\cdot)}) \circ \text{pr}_1^* \mathcal{A}_i^2 + \text{pr}_2^* \theta_L)(x, h_i(x) \cdot g) \\ & = (\text{id}_{\mathbb{T}^*B} \otimes \mathbb{T}_e \text{Ad}_{(h_i(x) \cdot g)^{-1}}) \circ \mathcal{A}_i^2(x) + \theta_L(h_i(x) \cdot g) \\ & = (\text{id}_{\mathbb{T}^*B} \otimes \mathbb{T}_e \text{Ad}_{g^{-1}}) \circ (\text{id}_{\mathbb{T}^*B} \otimes \mathbb{T}_e \text{Ad}_{h_i(x)^{-1}}) \circ \mathcal{A}_i^2(x) + \theta_L(h_i(x) \cdot g), \end{aligned}$$

którą w świetle przyjętych założeń oraz Stw. 3.17 możemy przepisać w oczekiwanej postaci

$$\begin{aligned} & \underline{\mathcal{A}}_2 \circ \mathbb{T}\Phi \circ \mathbb{T}_{\tau_i^{1-1}(x,g)} \tau_i^{1-1} \\ & = (\text{id}_{\mathbb{T}^*B} \otimes \mathbb{T}_e \text{Ad}_{g^{-1}}) \circ (\mathcal{A}_i^1(x) - (h_i^* \otimes \text{id}_{\mathfrak{g}}) \theta_L(x)) \\ & \quad + \theta_L(g) + (\text{id}_{\mathbb{T}^*B} \otimes \mathbb{T}_e \text{Ad}_{g^{-1}}) \circ (h_i^* \otimes \text{id}_{\mathfrak{g}}) \theta_L(x) \\ & = (\text{id}_{\mathbb{T}^*B} \otimes \mathbb{T}_e \text{Ad}_{g^{-1}}) \circ \mathcal{A}_i^1(x) + \theta_L(g) \equiv \underline{\mathcal{A}}_1 \circ \mathbb{T}_{\tau_i^{1-1}(x,g)} \tau_i^{1-1} \\ & = \text{pr}_2 \circ (\Phi \times \text{id}_{\mathfrak{g}}) \circ \mathcal{A}_1 \circ \mathbb{T}_{\tau_i^{1-1}(x,g)} \tau_i^{1-1} \end{aligned}$$

□

Tytułem uzupełnienia dyskusji zasadniczej, istotnego z punktu widzenia zastosowań teoriopowych rozwijanego tu formalizmu, podamy jeszcze

Definicja 6. Przyjmijmy zapis Def. 5. Potencjały powiązania głównego \mathcal{A}_i na wiązce głównej P_G zadają rodzinę lokalnie gładkich 2-form na bazie o wartościach w algebrze Liego \mathfrak{g}

$$F_i := d\mathcal{A}_i + \mathcal{A}_i \wedge \mathcal{A}_i, \quad i \in I$$

spełniających warunki

$$\forall (i,j) \in (I \times 2)_{\emptyset}, x \in \mathcal{O}_{ij} : F_j(x) = (\text{id}_{\mathbb{T}^*B} \otimes \mathbb{T}_e \text{Ad}_{g_{ij}(x)^{-1}}) F_i(x).$$

Są one nazywane **lokalnymi 2-formami krzywizny powiązania głównego na wiązce P_G** . **Powiązanie główne płaskie** to takie, którego lokalne 2-formy krzywizny są równe zeru.

Zadanie domowe 1. Udowodnij powyższą relację.

Wykład zamyka elementarna konstatacja własności transformacyjnych krzywizny.

Stwierdzenie 5. Przyjmijmy zapis Def. 6 i niechaj $\{F_i^\alpha\}_{i \in I}$, $\alpha \in \{1, 2\}$ będą lokalnymi 2-formami krzywizny powiązania głównego na wiązce głównych nad ustaloną bazą B , stowarzyszonymi ze wspólnym pokryciem trywializującym $\{\mathcal{O}_i\}_{i \in I}$, przy czym zakładamy, że między wiązkami tymi istnieje izomorfizm wiązek głównych z powiązaniem pokrywający identyczność na bazie, o danych lokalnych $\{h_i\}_{i \in I}$ zdefiniowanych w treści Tw. 4. Wówczas zachodzą tożsamości

$$F_i^2 = (\text{id}_{\mathbb{T}^*B} \otimes \mathbb{T}_e \text{Ad}_{h_i}) F_i^1.$$

Dowód: Pozostawiamy Czytelnikowi.

□